






KARIN FIGALA

216






PRACTICA
MEDICINAE
GENERALIS

A

IO. IACOBO VVECKERO

Poliatro Colmariense

VII. libris ex-
plicata.



BASILEAE

Per HIERON. Frobenium, & eius affinem,

M. D. XXCV.

RPJCB

Summo
CHRISTIANI ORBIS
MODERATORI

CÆSARI RODOLPHO II.

AUGUSTO.



Tiam si Telemachi uerū il-
lud esse sciam, CÆSAR
inuidissime, magnos ma-
gna, paruos parua dece-
re: adeoq; si meā obscurita-

tem cum S. M. T. splendore cōponam, ab
instituto meo penitus discedere debuerim:
argumēti tamē suscepti, dignitas et ampli-
tudo non modo in sententia me confirma-
uit, uerumetiam Cephessia dictum disci-
pulum contentius tibi inflatē cedentis,
in memoriam reuocauit *ἐν τῷ μεγάλῳ*
τὸ εἶναι ἀλλ' ἐν τῷ εἶναι τὸ μέγα possum esse.

Nam cum id demum uerè magnum cense-
ri debeat, quod in suo genere perfectū exi-
stit: perfectio autem non aliunde, si Peripa-
tetitorū principi credimus, quàm ex uir-
tute pendeat: at uirtus sui possessorem bo-
num efficiat: consentaneum sanè uidetur,
id quod comparatione aliorum magnum
est, bonū itidē uerumq; existimari debere.

Qua quidem rationis inductione, Medici-
nam non modò inter utilissimas hominum
uitæ artes recipi, uerū etiā plerisque præ-
ferri, sapiens antiquitas meritò censuit, e-
iusdemq; inuentionem Dijs immortalibus
attribuit, usum & exercitationem sum-
mis regibus familiarem esse deprehendit.
Etenim si quod in œconomia Pater est, id
in politia Rex: non minus regi, pro salute
populi excubanti, salubritatis, quàm reli-
quorum ad uitam oportunorum præsi-
diorum

diorū cognitio, necessaria esse uidebitur.
Ut proinde minus miremur, Catonem pri-
scum in Re rustica pertractāda ea, quæ ad
familia morbos uel præcauēdos uel depel-
lendos facere possunt, curiosè describere
solutum: cūm Homerus, sapientiæ omnige-
næ Oceanus, Agamemnona illum *ῥοιμὲναι*
λατὼν, in peritentiæ, quæ Græcorum exer-
cium inuaserat, sedandæ ratione cessantē,
& oscitantem, ab Achille, non minus Chi-
ronijs quā Martijs artibus instructo he-
roe, pro concione reprehendi introducat.

Magna igitur Medicina est, propter au-
ctores magnos, Deos uidelicet, & qui,
uel sacrarum literarum testimonio, Deorū
terrestrium locum obtinent, Reges atque
Principes. Sed ut hæc nobilitatem Medici-
næ commendant, ab Artificibus desuntā:
ita est alia magis propria eiusdem commē-

datio ab Arte ipsa petita, quatenus habitus
uerus est methodicè traditus: per quem so-
lum Methodici seu Dogmatici medici ab
Empiricis differunt, & à quo solo Artifi-
ces non immeritò appellari debent. Hu-
ius uti primus inuenior & constitutor fu-
it Hippocrates, sic ampliatus & designa-
tor Galenus: cui fortassis operibus artis
multi, præceptionibus uerò nulli conferri
possunt, cum quicquid posteriores Græ-
ci Arabesue boni habent, hoc est methodi-
ci, id ex Galenicis fontibus hausisse, & quo-
tidiane tantum experientie exemplis locu-
pletasse uideantur. Sed quod summo illi ui-
ro, & à nemine præterquam docto satis
laudato, à nemine præterquam indocto pe-
tulanter contempto, uitiò datur, Methodi
uirtutem primam, ordinē scilicet & per-
spicuitatem, orationis prolixitate ab eo fu-
isse

isſe obſcuratam: id ut per ſe uerum ſit, at
neque ex conſeſſo neque ex profeſſo. Nam
que uirum illum uerè magnum non magis
patriæ uitio (nam plerique, ad Aſiaticum
dicēdi morem confugiendo, dum Galeniū
excuſare conantur, uitioſam illius institu-
tionem, per quam hoc ipſum, licet popula-
re uitium, emēdari debuerat, accuſare ui-
dentur) quā certo conſilio, ut Hippocra-
teæ breuitati lucem inferret clariffimam,
hoc ipſum factiſſe, uel ex eo liquet, quòd
in præclaris illis de Arte medicinali & de
Conſtitutione artis commentarijs, ſatis o-
ſtendit, quanta breuitate artem ipſam tra-
dere potuerit. Medicinam ab illo multis li-
bris ſuſſimè traditam, ſed & pro diuerſa
ſcribēdi occaſione non ſemper eo, què the-
orematum ab ipſo propoſitorum ſeries re-
quirebat, ordine explicatam, nos Galeni-

ca methodi terminis circumscriptam, in
locos communes retulimus, recisis super-
uacuis, alienis in suum locum relatis: Ne
quid in hoc genere deesset, posteriorum
quoq; Græcorum scripta, eadem methodo
in classes certas redeginus, ut hac ratione
integram Medicinam Græcorum, uno ue-
luti corpore comprehensam, magno cum
studiosorū fructu, et uerò etiam temporis
compendio, Asclepiadeis hominibus exhi-
beremus. Et iam profectò diligentiam &
laborem nostrum publicè spectandum pro-
posuissimus, nisi Typographica remora
hac in parte uota publica impediissent.
Intera dum Iouis Olympici gigantea sta-
tua expectatur integra, in finis parib.
periculum artis facere, methodiq; specimē
exhibere, non alienū nobis uisum est. Ade-
oq; ex quinque Medicinæ paribus, eam quæ
sibi

sibi eximie Therapeias nomen uedicauit,
hocce Enchiridio uniuersim delineare stu-
dimus: ut quemadmodum Geometra an-
ticipatissimā uniuersi machinam exili interdu-
globo comprehendunt, & minore quidē
cum labore, at non minore cum ingenio
Terrarum tractusq; maris cœ-

lumq; profundum
oculis hominum subiiciunt: ita quoq; nos
diuinos illos methodi Therapeutice li-
bros, à Galeno scriptos, in hanc formā con-
trahere, & heterogenea ab homogeneis se-
gregantes, puram putam curatiuam me-
thodum exhibere uoluimus. Ergo siue
propter authorum amplitudinē, siue prop-
ter methodum opusculum hoc, mole qui-
dem exiguum, sed uirtute magnum, tibi,
RODOLFE AVGVSTE, maximo
Christiani orbis moderatori, ea qua decet

* s. submisit

submissione, offero, ut quemadmodū hoc
ipsum maioris operis rudimentum erit,
Deo opt. max. benè fortunante: sic feli-
ciss. imperij tui initijs Rex ille regum, &
Dominus dominātium, ea addat pacis or-
namenta, belliq; decora, ut domus Au-
striaca, que constanti Electorū uoluntate
incomparabili inter Christianos principes
exēplo, tot iam cōtinuata serie Impatores,
non minus in rectè sapiēterq; gubernāda,
quā in fortiter defendenda Rep. clariss.
protulit, ea per te incrementa suscipiat, ut
ex Homerici Hectoris uoto, nō tantū pa-
trē tuū Maximilianū II. sapienti modera-
tione, Ferdinandum auum, sanctimonia
uitaq; innocentia, Carolū V patrūm
fortitudine, uerum etiam ut maiores tuos
nunquam satis laudatos, nec nisi heroico
stylō celebrandos, Maximilianum & Fre-
deri-

dericum III. Albertum II. atq; I. ip-
sumq; generis tui illustratorē Rodolphū
I. à quo nomen trahis, felicitate & pieta-
te, hac quidem Deo immortalī, illa morta-
lium generi conciliandus, adæques atq; su-
peres. Hanc uoti publici summam, is qui
solus potest, ratam faciat, ad Christiani or-
bis tranquillitatem, & priuatorum S. M.
T. deuotorum (inter quos occasione poti-
us quàm affectione me uel à deuinctissi-
mis uinci patiar) salutem & incolumita-
tem. Colmaria A. d. IV kal. Martij
AN. SAL. M D XXXV.

S. (M. T.

Humillimus cliens

Io. Iacobus Vaeckerus.



CL. V.

IO. IACOBO VVECKERO

Medico Aesclepiadeo

Ὀρχήμων

Clinico lauto, excellenti,
experienti

ob MEDICINAM multis iam
pridē vigilijs & monumē-
tis illustratam

nunc demum hoc paruo quidē
sed ingenioso opere

summam eiusdem *ὑπερωδία*
καὶ πράξις feliciter tentatam

ὑπερωδία

THEOREMATIS practicis
uerè, germanè, catholiceq;
constitutis

omni ἀμνηστία καὶ ἀλογισία
in morborum causis, in reme-
diorum δυνάμει, μίξει, δια-
κρίσει καὶ ἐφαρμοσεί

longissimè pro-
fligatis

Regia deniq; via ad medendū
citò, tutò iucundeq; a-
perta & compla-
nata

IAC. MOCCIUS MEDICVS

Ex

V. M. L. D. F. Q.

L. M.

P.

50



In Methodum Vniuersalē per-
ueniendi ad Praxin D. D. IO. VVECKERI,
D Agnati sui obseruandis. *Ὁὐκ
ἐστὶν ὁ πρῶτος ἀποφασιστικὸς ἐπὶ τῆς*

IONATHAE MEIERI

Basilienfis.

HVnc librum præclare tibi VECKE
RE remitto

Excusum prælo, te cupiente, meo.

Et te nunc doctitoto veneramur in orbe,

Pro medicis donis auxilijsq; tuis.

Hic Generalis enim Medicinæ praxis habet,

Ingenti quæ non vtilitate caret.

Nos etiam te nunc merito veneramur honore

Proq; tuo studio, proq; fauore tuo,

Hoc quod opus doctum nostro cōmiseris æri,

Illustrantq; typos quod tua scripta meos.

Nec cessis post hanc Praxin, foetusq; priores:

Pergis: & egregium nunc meditaris Opus.

Vtq;

Vtq; vigil legit hæc cupido modo pectore le-
Qui fruitur toties teq; tuisq; libris: [Flor]
Sic plures admiratur, speratq; futuros
Teq; petit libros pollicitante novos.
Perge is sic nobis Specialem absolvere Praxin,
Factaq; pollicitis adde petita tuis:
Atq; illam potius prælis suppone tuorum,
Vt videat lucem per mea præla diu.
Perge tuis medicas ornare laboribus artes,
Vtq; facis, prælis perge fauere meis.
Sic duce te crescunt cupidi bona publica mudi:
Commendat nomen sic tua fama meum.
Sic alacri vigiliq; fide, sic tempore lato
Te consanguineum magnificabo meum.
Sic ego, sic omnis medicis imbutus ephebus
Artibus, æterno tempore gratus erit.
Et nomen sine fine tuum super astra feretur,
Rem Medicam tali quod ratione iunas.



IDEAE HIPPOCRA.

TEAE AD

MEDICAM PRAXIN SIMVL
ET THEORIAM
facientes

APHORISMI.

MEDICVS Philosophus di
js æquiparandus, Doctus
esto, Bonus, & in arte Po-
tens: nempe ut Sciat, Velit atq;
Possit de genere humano in sani-
tate custodienda reuocandaque
benè mereri.

Proinde duo in eo requirūtur sum-
ma, *ἡνίκα* medicum, & *ὁ ἡγεμονικόν*
medica.

Ἐν ἡνίκα medicum in Dogmatica præ-
ceptorum cognitione, & Histori-
ca designatione exemplorum ad
artem pertinentium consistit.

Quarum

ATHORISMI.

Quarum utraq; & Naturæ rectâ cō-
formationem, & Doctrinæ fide-
lem institutionem, & Experiētiae
insuper diligentem confirmati-
onem requirit.

Εὐχρησίων uerò siue Elegantia me-
dica, à qua Gratioli Asclepiadæ o-
lim, hodie Excellentes appellan-
tur, tanquam externa persona ar-
tificem ornat secundum Animū,
Corpus & Fortunas.

Ad ANIMI ornatū faciunt Instru-
menta philosophiæ, eiusdemq;
Habitus.

Instrumentis nitatur oportet tum
Rationis, à Logica: tum Oratio-
nis puræ & elegantis, à Gram-
matica Rhetoricaa, & uerò etiam
à Poetica mutuaris.

* *

Habitus.

Habitus philosophici ad Cognitionem et Actionē pertinentes sunt uarij.

Cognitionis habitus ad Medicum ornatum faciunt, alij magis, alij minus. Theologia inprimis, tanquam basis. Physica deinde, amplissimas colonias ex se deducēs, Anatomiam, Rhizotomiam, Pharmacopœiā & sub hac Chymiam. Mathematicæ deniq;, vt nō necessaria, saltē pedissequa. Ex quibus Sapiens medicus iure denominatur.

Actionis verò habitus ad Probitatē eiusdem conferentes nobilissimas ex se actiones deducunt.

Sic Prudentiæ Medici conuenit Inloquendo & differendo argutum

&c

ATHORISMI,

& nervosū esse: In deprehenden-
dis ægrorum adstantiūmue erro-
ribus & decipulis sagacem.

Fortitudine sit ea animi, vt ne vel ter-
rorem vel confidentiam excitati-
bus supra quā decet moueatur.

Munditiem corporis amplectatur,
multo verò maximè eā quę ani-
mi est: quoad alimenta frugalis,
quoad venerē etiam suspicionis
expers.

Quæstum ex opera operæue medi-
co turpem fugiat.

De mercede nunquam paciscatur,
præterquā confidentiæ ægri ex-
citandę causa.

Præmia ne promissa quidem auarē
exigat ab ijs qui possunt, qui non
possunt, ne speret quidem.

* * 2 Hono-

Honoris contemptor esto, nisi quem artis peritia non emendicatum vltro offert. Parcus suiipsi⁹ laudator, nec nisi urgente necessitate recitator.

Seuerus in ijs, qui artis successū impedire possunt erroribus: benignus in cæteris, & miserix ægrorum serio condolens.

Ne quidem errores suos fateri, & alios suo exēplo cautiore reddere supersedeto.

Medicorum aliorū congressum & conuersationē vltro expetito.

Morbū leuē & salutarem verbis ne aggrauato.

Euentū morbi præscitū nūc prædicito, ad ægri obedientiam excitandam, artisue calumniam auertendam

APHORISMI.

tēdam: nūc dissimulato, ne morbus
corporis, animi morbo augeatur.

Remediorum præstantiam præ
ciūmve nunquam quæstus, sed au-
thoritatis interdum causa mentitor.

Quæ vel in arte vel extra artem
cælare præstat occultato.

In alienis obseruādis cēsēndisue,
nec curiosus nec acerbus esto.

Aliorum successibus nec inuide-
to, nec obtrectato.

Humanus & popularis erga om-
nes, minimè tamen garrulus.

Non morosus, & acerbus, non
scurrilis & ridiculus.

In familiaritate contrahenda fa-
cilis, in conseruanda officiosus, in
consilijs placidus.

Oratione breui, sed arguta & sen-

** 3 tentiosa

tentiosa vitior.

Vultu gravitatem simul & blanditiam præfero.

Ægrū sedatè & si morbus postulet, frequenter visitato.

Modestè assideto, interrogato, tangro, considerata perpendito.

Turpia dicta factaq; aueritor oīa.

Religionē & pietatem vt Dei & Naturæ minister non datè colito.

Numinis cōsulendo agendoq; gratiam atq; pacem exorato.

Ægrum ne quacūq; de causa suspendito.

Præceptores parentum loco colito, eorundem filios pro fratribus complectitor.

Medicos collegas tum aliās, tum præsertim in cōsultationib. absq; inuidia

APHORISMI.

uidia & fugillatione audito, doceto.

Aliena contrectare ne in animū
quidem inducito.

Atq; vt Animus Medici philoso-
phi benè quoq; habitet, CORPORIS
ornamenta accedant oportuna.

Ætas iuuenilis quidem toleran-
tia & officio, sed senilis sapientia &
iudicio præstat. Intermedia utroq;
participat.

Habitu Corporis bono sit, ne vul-
gatum illud obijciatur, cura teipsū.

Vestitu nec sordido, nec luxuri-
oso, nec peregrino, sed mūdo & fru-
gali, & ad peregrinationes actio-
nesq; medicas oportuno vitor.

Non sordidus, non contulus, sed
nitidus atq; lautus esto.

Ab odorib; & vnguētis abstinetō.

Hisce ex FORTVNIS quoq; pe-
titus ornatus adstipuletur.

Comitatum & pompam discipu-
lorum ægrorumue sanitati restitu-
torum, tabellarū item atq; diploma-
tū ostentionē agyrtis relinquo.

Testimonium prouectus in arte,
non sua sed ægrorum confidentiā
causa, à bonis atq; doctis accipito.

A ratione non à fortuna totus pē-
deto. Fortunam in Artem, nihil in
Artificem non nisi concedente Nu-
mine aliquid posse p̄suasū habeto.

Nobilitatem ex Asclepiadea pro-
fessione potius quàm ex maiorum
claritate, consecrator, tuetorq;.

Ex his fontibus porro *προσάγειν*
siue Præfectura medica, triplici or-
natu instructa, in mediā hominum
vitam

ATHORISMI.

vitā prodiens, varijs operibus sese
spectandam exhibebit, siue Officia
perpendantur, siue Personæ.

OFFICIO RVM generatim me-
thodi terminis circūscriberentur,
propè innumera censi possent.

Huius sunt loci, Locorū quo ad
aerem, aquam, cœlum, diligens in-
spectio.

Chirurgicarum operationū ob-
servatio: Remediorum exploratio:
Præceptorū methodica perceptio.

Diligens morbi mutationis atq;
eventus prædictio, Morbi præsetis
cognitio, inuestigatio, ab ægro, ab
astantibus.

Naturæ ante omnia imitatio.

Cōmunicatio præceptorū simul

& exemplorum artis fida erga discipulos.

Ægros & adulātes sui officij admonere, securos terrere, meticulosos erigere.

Non perfunctoriè, non temerè, nō nimis curiosè artis munia obire.

Occasionem præsentem apprehendere, futurā patiēter expectare.

Inexpectatis nec confidere, nec suprà modum terreri.

In suscipiēdis aggrediēdisq; morbis, nec temerarium, nec meticulosum esse.

Nullius operis operæue medicæ subpudere,

Præcipitantia in motu, incessu, administratione fugere.

Gravitate in sermone, sessione, incessu,

APHORISMA.

ineffu, vestitu amplecti.

Auctoritate velut heroica excellere, imperando necessaria, prohibendo noxia, reprehendēdo errata.

Ægro, dissimulato sordium fastidio, comiter assidere,

Pauperibus gratis mederi.

Peregrinos præ cæteris humanius complecti.

Ingratos & auaros, quantumvis dignos q̃ negligantur, in morbo præsertim accipiti, nō derelinquere.

In agendo promptum, expeditum, dextrum, elegantem esse.

Instrumentis medicis diligenter & oportunè paratis domi abūdarere foris necessaria tantum & expedita secum ferre.

Memoria remediorū formas tū
simplici

IDEA

simplicium tum compositorum tenere: ad eiusdē subsidium nihilominus aduersaria in promptu habere.

In ijs quæ offeruntur alimentis medicamentisq; elegantia; lautitiaq; studere.

Ægri cupiditati neq; adulatoriè blandiri, vnde morbus augeatur: neq; crudeliter reluctari, vnde animus ægri à cura absterreatur.

In chirurgicis operib9 administrandis, celeriter & expedite agere, iucundè & indolenter agere, securè atq; tutò agere.

Consuetudinis atq; virium ægri in primis rationem habere.

Quòd si nunc PERSONAS còsideremus, eadē ipsa officia in tres classes diuidi possunt: quorum alia

Ægrum,

ATHORISMI.

Ægrū, alia Adstātes, alia Medicos
ceteros respiciunt.

Ægri animo prius quā corpore
remedendum.

Ea quæ ægrum scire par est, docere:
quæ opinari, persuadere: nūc
confidentiam, nunc timorem
exprimere.

Ea quæ ægrum facere oportet,
dictatoriē imperato: interdum quo
que in parem gratiam aliquid re-
mittito, & indulgentia leui grauior
rem obedientiam mercator.

Quæ ægrum ignorare conuenit,
cælatō, dissimulatō, callidēne in-
terpretator.

Morbū modō difficilem, vt obe-
diat, modō facilem, vt ne desperet,
simulato.

Nihil

Nihil superbè promittito: ad Dei
potentiam & Naturæ obedientiam
artis opera omnia referto.

Remedijs nūc varijs, nūc paucis
utendum affirmato: illud ne festi-
net, hoc ne animum despondeat.

Medicum nec avarum, nec infi-
dū & desertorem fore fidem facito.

A quibus abstinere debet, partim
minis, sed, ut erga hominem liberū,
modestis, extorqueto, partim blan-
da admonitione abducito.

Adstantes ægro gratos & accep-
tos præstato: ingratos abigito.

Iisdem morbi naturam & causas
non multis ambagibus, sed apertis
similitudinibus explicato.

Euentū prædictione occupato.

Tumultus ex cōfidētia vel despe-
ratione

APHORISMI.

ratione ortos cohibeto, corrigo.

Ad imperata dextrè & fideliter
facienda nunc pollicitatione nunc in
terminatione cogito.

Fidei a distantium quorumvis ne
fidito, in eorū præsertim quæ ma-
ioris sunt momenti remediorum
subministratione.

Medicorum aliorū in morbo tū
periculoso, tum salubri, sed propter
ægri nobilitatem morositatemue
difficili, introductionem expetito,
nedum subterfugito.

Absque contentione & alterca-
tione & invidia, non privati, quæ-
stus, vel gloriæ, sed ægri salutis &
veritatis causa, consilium dato, ad
mittito.

Empiricorum consilia, propter
methodi


methodi ignorantia contemnito:
media vero; tãquam omniparentis
Naturæ dona, examinato, & nisi po-
tior ratio dissuadeat admittito.

Præceptorum ab doctrina & ex-
perientia instructiorũ, quicũq; eta-
te iuuenis es, cõsilia expetito, mo-
nita admittito.

Discipulis præcepta fideliter cõ-
municato, exẽpla cõmonstrato, ad-
ministrationis, quãdo licet atq; da-
tur, comites & inspectores & adsti-
tes et custodes adhibeto, sed iã eta-
te maturos, & præceptis artis eru-
ditos.

Contrarię sunt Medicorum im-
proborũ & sophistarũ, artis pulcer-
rimæ professione ad quæstũ & am-
itionẽ abutentiũ, notæ atq; noxæ.

^I
PRACTICAE GENERALIS
TYPVS.



Aa. Cō
sideratio
institu-
enda:

Finis, nepe actio
nis. Medicus ab
actione incipit.

Inde ad instrumē
ta progreditur.

Antequā.n. in-
strumētis uti incu-
piat. prius perspi-
cit, an agere possit

Deinde quid age
re debeat. Sic er-
go Medicus per-
pendit,

An mor-
bus cura-
ri possit.

Multi
namque

morbi so-
lis presā-
gijs relin-
quendi
sunt.

De his.
Lib. II.

Quid fie-
ri debeat.

Efficientiū, Cū
Medicus agat
p instrumēta ne-
cessē est, ut cogni-
tione habeat tū

Diatæ. Lib. III.

Pharma-
ceia: vide
licet me-
dicamen-
torū cum

Simpli-
ciū Lib.
IIII.

Compo-
sitorum
Lib. V.

Chirurgiæ. Lib. VI.

TACTI

PRACTICAE GENERALIS

LIBER I.

ARGVMENTVM.

De partium affectarum, affectuūq;
& caularum cognitione agit.

Eius autem capita
hæc sunt.

Quibus notis locus affectus deprehēdi pos-
sit, Cap. 1.

De locis affectis per se, et per cōsensum, et
quot modis pars aliqua corporis per
consensum afficiatur, Cap. 2.

De notis, quibus affectus dignoscantur,
Cap. 3.

De morborum generibus, Cap. 4.

De symptomatis in vniuersum, Cap. 5.

De notis, quib. causæ cognosci possint, C. 6.

De morborū causis in vniuersum, Cap. 7.



PRACTICAE GENERALIS

LIBER I.

Proœmium totius operis.

Mnis docendi via ac ratio præcipit, ut à generalibus ad particularia progrediamur. Itaq; efflagitantibus quibusdam medicæ artis studiosis, & candidatis, vt librū de curandis humani corporis malis conscriberem, generalem prius methodum describendam fore putavi, qua tandem facilius & promptius in particularibus sese exerceant, cum in vniuersalib. methodus, in particularibus exercitatio consistat. Methodus ergo est, in ægrotis primò perscrutari, quæ nam corporis pars affecta sit, & quomodo, primariòne, an per consensum alterius cuiusdam particulæ:

læ: deinde quis sit affectus præternaturam,
num morbus, vel symptoma: tertio quæ sit
eius causa: postremo an is affectus curari va
leat, & quomodo, & quibus iumentis.
His enim incognitis, fieri nequit, vt probè
curatio absoluator. Qua autem via, ac ratio
ne valeat quispiam affectam sedem omnem,
ac quemuis præternaturam affectum, eiusq;
causam dignoscere, ac demum affectum i
psum, si is curari possit, propugnare, & qui
bus instrumentis, iuxta Hippocratis & Ga
leni doctrinam, hoc opere scribere ag
grediar, initio à læsis particu
lis sumpto.

A 3 Quibus



*Quibus notis locus affectus deprehendi
possit, Cap. I.*

Itaque ante omnia Medicus in curandis singulis corporis malis, partium corporis, quas locos nominare consueuimus, notitiam habere debet. Huiusmodi namque plurimum confert, non solum ad curationem, quam pro locorum differentia variari contingit: verum etiam ad affectus dignotionem, & Prognosticum. Verum hic non de ijs, quæ in superficie constitutæ sunt, partibus, utpote quæ facillè sensibus deprehendi queant, neque etiam de earum natura seu essentia, neque actione, siue usu, neque compositione quicquam agemus, (cùm hæc ad artem secandi corpora pertineant. Scribimus enim hæc ijs, qui iam in corporis dissectionibus sunt versati) sed de ijs locis, qui intrinsecus latent, & in conspectum non veniunt, quibus scilicet notis deprehendantur.

Itaque locorum affectuum cognitio quinque potissimum rebus elucescit: nimirum actione læsa, excretis, positu, doloris proprietate, & proprijs accidentibus. Sanè actio læsa sola interdum affectam partem indicare potest: & quidem hoc modo. Si enim accidens aliquod circa cernendi officium euenerit, oculum affici constat. Sic quoque ratio, vel imaginatio, vel memoria læsa, cerebrum affectum esse demonstrat: pulsus verò præternatu-

ternaturam, cor laborare indicat: priuatio motus
 neruum, & muscolum: cibi fastidium, os ventri-
 culi: mala cibi concoctio, ventriculum: sanguifi-
 cationis frustratio, hepar, &c. Porro excretorum
 species affectam partem indicat, & per partium
 ipsius essentiam, & per contenta in ipsa. Per par-
tium ipsius essentiam, vt si bronchium tussiendo
 excernatur, pulmones agrotare indicat: ramentum
 per aluum eiectum, intestina affecta ostendit:
 caruncula per vrinam excreta, renes: excre-
 menta lamarum speciem referentia, per vrinam
 excreta, vesicam affectam esse portendunt. Sic etiam
 per contenta in ipsa parte. Nam vrina excreta
 per vulnus, vesicam, vel vrinarios meatus affectos
 ostendunt: stercus per vulnus excretum, intestino-
 rum aliquod: cibus per vulnus, ventriculum: efflatus
 spiritus inter respirandum, membranam costas suc-
 cingentem affectam esse indicat: lapis excretus,
 renes vel vesicam: sanguinis grumus per tussim
 eiectus, thoracem: lumbrici intestina laborare demon-
 strant. Caterum positus quoque affectam partem
 sufficienter commonstrare potest: quippe durus in
 dextra praecordiorum parte tumor, non lienis,
 sed iecoris affecti nota est: quemadmodum si fuerit
 in sinistra, non hepatis, sed splenis affectum
 portendit. Ac positus interdum, vbi similiter se
 habet excreta, affectam partem commonstrat.
 Si enim membranosa tu-

2.

3.

3 PRACTICÆ GENERALIS

nica frustulum excernatur, id vlcus esse alicubi ostendit: verum in qua sit particula, ex positu discere poteris. Nam si vomendo fuerit reiectum, aut gulæ, aut ventriculi: si tussiendo, gutturis, aut asperæ arteriæ: si screando, faucium: si cum vrina, eius fistulæ: si à sede, alicuius intestinorum: si per mulieris pudenda, vteri affectum portedit.

4. At verò constat, quod singuli dolores pro positis varietate, affectum locum ostendere possunt. Quippe apparentibus per vomitum vlceris notis, animaduertendum est, vtrum anteriores partes circa præcordia, aut posteriores circa dorsum, dolor aliquis infestet: dignoscemus autem id hac ratione. Etenim qui in anteriorib. percipitur, ventriculum: qui verò in posterioribus, gulam occupare censetur. Haud aliter os ventriculi à spacio ipsius, & à gula distinguendum est: si deuoratis quibusdam acribus, hoc quidem in ore ventriculi, aut parte inferiore mordicationem excitet: illud verò in transitu gulæ, quæ secundum thoracem est. Omnia enim hæc positu distinguuntur. Sed nunc exemplū aliquod afferre operæpretium videtur, quomodo scilicet locus affectus ex proprijs accidentibus innotescat. Ore quidem ventriculi affecto, fastidium infestat: per hepatis verò imbecillitatem, excrementa per aluum deiecta, aquæ, in qua carnes nuper mactatæ ablutæ fuerunt, simulantur: item maxillæ rubræ apparent in peri-

LIBER I.

9

in peripneumoniacis: suffusio oculos infestat: hamodia, dentium stupidorum est nota. Sed ex doloris specie locus affectus comode deprehendi potest. Siquidem dolor punctorius, membranas; dolor pulsatorius, arterias: dolor gravis, viscera, vel aliam partem sensus hebetioris affectam esse indicat. Hæc igitur sunt affectorum locorum nota.

De locis affectus per se, & per consensum,
& quot modis pars aliqua corporis
per consensum afficiatur,

Cap. 2.

Notitia partis affectæ habita, perquirendum venit, num proprie, seu primo, aut per consensum pars afficiatur. Nam huiusmodi speculatio non parum ad curationem conducit, cum ad curandi rationem non sine manifesta utilitate imprimis pertineat, cuiusnam parti remedia sint apta, cognovisse. Siquidem medicamenta non nisi ei, quæ proprio, & primario affectu laborat, applicanda sunt. Ea namque curata, nullus relinquitur in ea, quæ per consensum, afficitur, præternaturam affectus. Equidem parti proprius siue primogenius morbus est, cuius pars per essentiam & propria affectione laborat: vel

*Affectus
per se.*

A 5

tum

TO PRACTICÆ GENERALIS

tum affectus proprius esse putandus est, cum permanere in parte quapiam perspicitur. Vnde si in morbo laterali permanens eueniat delirium, caput proprium habere morbum perpendendum, ita, ut quamuis lateris morbus quiescat, possit tamen capitis morbus permanere. Quod si verò pars aliqua ob alteram afficitur sic, ut irritata quidem vna, altera vehementius molesteatur, remissa verò irritatione, quiescat, eam per sympathiam, seu per consensum affici putandum est. Verum pars corporis per consensum quinque modis afficitur: videlicet quando vel humor, uel vapor aliunde pertransit: quando facultas vel cum essentia, vel citra essentiam priuatur: vel quando materia aliunde preparata deficit. Siquidem aliter dolet caput ubi cōtēti in vētriculo humores eleuātur, qui simul et calefacere, et distēdere ea, quæ sunt in capite, possunt, atque aliter suffusorū apparent visa quedam, solo vapore per ipsos transeunte. Præterea aliter afficitur is, cui meat⁹ à cerebro descendens obstructus est: aliter ille, cui propter spinalis medullæ inflammationem resoluta sunt crura: atque aliter is, cui vox aut perijt, aut vitata est. Etenim ad crura facultas quadam citra essentiam, descendere prohibita est: ad oculos verò, cū essentia: verum ad guttur, quamuis materia perueniat, sufficiens tamen ipsius quantitas haudquaquam accedit. Qui verò ob intercostalium musculorum

perfo-

*Affectus
passiui
sensu.*

*Causa
sensu.*

perforationem obmutuit, is totam vocis materiam amisit. Porro quemadmodum crura per dictas spinalis medullæ dispositiones resoluuntur, ita etiam guttur vocalibus nervis vel incisis, vel laqueo interceptis. Sed hæc de primogenijs, & per consensum affectibus sufficiant, nunc tempestivum esse videtur, ut ad ipsius affectus notitiam accedamus.

De notis proprijs, quibus affectus dignoscantur, Cap. 3.

Parte affecta cognita, investigandum est, quis sit affectus præternaturam, an scilicet morbus, vel symptoma. Ad horum autem cognitionem prius tum morborum, tum symptomatum naturam, & differētiās scire convenit. Verum de his deinceps, tunc autem qua via, ac ratione affectus dignoscamus uniuersos, præfertim eos, qui circa partes corporis intimas conditi fuerint, agendum videtur. Nisi enim affectus fuerit cognitus, quomodo remedium qualitatem inuenietur? cum quilibet affectus suo contrario auferatur. Proinde horum cognitio apprime necessaria est. Eos autem dignoscēs: ab excretis, ab accideribus proprijs, seu symptomatis à loci natura, & doloris proprietate. *Ab excrementis* quidem, ut si vlcus sit, ex ramentis: ex sabulosa vrina lapidem deprehendimus.

Excre-

*1.
Affectuum
cognitio per
causam.*

12 PRACTICÆ GENERALIS

Excrementa verò cucurbitæ seminibus similia, la-
torum vermium indicia sunt: deiectio cibi non-
dum mutati, dyarrhæa: mictus potus non muta-
ti, diabeta indicium est.

2. Ab accidentium quoque
proprietas, affectuum indicia sumuntur. Nam
quibusdam per tabem vngues adunci euadūt: si-
ne ratione inuadens rigor cum febre, inflamma-
tionis ad suppurationem traseuntis, indicium est:
lingua nigricans, ardentem febrem portendit.
Sic etiam coloris in vniuerso corpore proprietas,
alia quidē per hepatis, alia verò per splenis affe-
ctus apparet: ita vt doctum medicum haudqua-
quam possit fallere, sicut nec color quidem, quē
hæmorrhoides iuduxerunt. Ab ipsorum quoq; la-

3. corum affectionum natura indicia morborum ori-
untur, eò quòd quibusdā solis partibus morbus
hic accadat, quibusdā verò solis nō eueniat: quip-
pe soli oculi, suffusione laborāt: lapis, in renibus,
& vesica nascitur: lūbrici in intestinis gignūtur.
Rursus impossibile est, vt abscessum cor sustine-
at: quemadmodum neq; pulmo, neq; ligamenta

4. dolorem. Quinetiam à doloris proprietate affe-
ctuum notæ deprehendūtur. Dolor enim puncto-
rius, pleuritidem: pulsatorius verò inflammatio-
nem ostendit. Porro ipsius quoq; morbi magni-
tudo, & mostempusq;, minimè negligēda sunt.

11.
*Affectus ma-
gnitudo.* Dignoscitur autem ipsius affectus magnitudo, ex
dispositionis, ac ipsam sequentium propriorum
sympto-

symptomatum magnitudine. Quòd si magnus
 propter præcellentiam partis fuerit morbus, ex
 præstantiæ, partisque affectæ natura cognoscitur.
 Morem vero seu malignitatē deprehendes, cum
 ex eorundem morborum differentia, tum ex sym-
 ptomatis quæ ipsam sequuntur. Pests enim ma-
 lignus, ephemera verò benignus affectus cēsen-
 dus est. Sic quoq; pulsus bonus, sputum coctum,
 mentis constantia, salutarem: è contra verò spu-
 tum nigrum, mētis turbatio, inquietudo, &c. læ-
 thatē morbum portendunt. Tempora præterea
 morborum dignoscuntur ex cruditate, ex antici-
 patione, vel tardatione accessionum, ab accessio-
 nis longitudine, à morborū & symptomatū ma-
 gnitudine, & intermissione. Siquidem cruditas
 principium morbi denorat: anticipatio verò ac-
 cessionis, longiorq; accessio, morbus & sympto-
 mata vehemētiora, & intermissionis tempus bre-
 uius, augmentum significant. In statu autem seu
 vigore, accessio neq; anticipat, neq; retardat, ne-
 que longior, neq; breuior, sed æqualis est: morbus
 & symptomata neq; vehementiora, neq; mitio-
 ra, sed in eodem statu permanent. In declinatio-
 ne accessiones tardiores, & breuiores, symptoma-
 taq; mitiora fiunt. Caterum pauca admodum
 sunt ipsorum affectuum noxa, quæ non simul lo-
 cum affectum ostendant. Et enim actionis noxa
 affectam duntaxat partem: earum verò differen-
 tia,

III.
 Maligni-
 tas affectu.

IV.
 Tempus
 ra.

Principi-
 Augmentu
 Status.

Declinatio.

V.
 Locus affectu
 ita.

14 PRACTICÆ GENERALIS

tia, ipsius affectum declarant: quæ solæ ipsorum affectuum sunt propria signa, per accidens tamē ipsos sequuntur. Vbi verò cōplicati duō vel tres, aut plures fuerint morbi, non aliter dignoscendi erunt, quā ab excretis, symptomatis proprijs, locorum natura, ac doloris proprietate, diuersis siquidem existentibus pro connexorum morborum numero ac natura. Cum his quoq; perpendenda sunt, quæ præcesserunt. Nam & ea non parum conferunt pro partis tum affectæ, tum ipsius affectus cognitione. Itaq; qualis præcesserit victus ratio, quæ consuetudo, ætas, anni tempus, regio, aeris constitutio, &c. consideranda sunt, totius corporis dispositione, non neglecta, vt valeamus, quod ad artificiosa coniectura permiserit, distinguere, quis affectus vrgeat. Porro cognitis morbis, distinguere oportet eo, qui per consensum fiunt, à proprijs affectibus. Siquidem cum proprijs accidentibus discernitur, ac semper eadem fuerint perpetua, neque alijs præcedentibus superueniunt, tunc eum propriū, ac primogenium appellamus. At cū proprijs accidentibus discerni nequit, neq; perpetuō permanent, & ad alias affectiones sequuntur, per consensum ipsum fieri dicimus. Quot autem modis affectus per consensum fiant, præcedenti diximus capite. Nunc ad reliqua transeamus.

VI.
Complexi
affectus.

VII.
Morbi per
se præcedentes.

per consensum
diximus.

De morborum generibus,

Cap. 4.

Quæquam morborum & symptomatum tractatio limites instituti nostri excedere videtur, & ad theoriam tantum spectet, nosq; ijs tantum qui se à theoria ad praxin conferunt, scribamus: tamen vt morborum, & symptomatum genera in promptu semper habeant studiosi, faciliusq; affectus à se inuicem distinguere possint, ea hic quoq; in memoriam ijs reuocanda fore putavi. Morbus itaq; affectus est præternaturam, actionem primò lædens. Eius genus triplex est: *Morbo gē.* *Gemma.* *Intelligis* intemperies: cōpositio vitiata: & vnitas soluta. Intemperies simplex, vel calida, vel frigida, vel humida, vel sicca. Composita, ea quidem immaterialis, vel calida & humida, vel calida & sicca: vel frigida & sicca: vel frigida & humida. Materialis verò, vel sanguinea, vt phlegmone: vel biliosa, vt erysipelas: vel pituitosa, vt oedema: vel melancholica, vt scirrhus: vel mixta, &c. Porro compositio *Compositio* *Intelligis* vitatur in qualitate: in quantitate & situ. In qualitate seu conformatione figuræ, consistit. Varietas, Vacitas, Curuitas, Simitas, &c. In qualitate cauitatum, sunt, Obstructio, Angustia, Cōpressio, Dilatio, Plenitudo, & Inanitas: in qualitate, superficiei, Asperitas, Læuitas. Morbi in quantitate, & quidem numero abundante, sunt, *sexus.*

16 PRACTICA GENERALIS

sextus digitus: varices: tubercula: lapis: lumbrici: vitiligo: suffusio: atheroma: meliceris: itea-
 toma, &c. in numero verò deficiente: vt amissio
 digitorum: dentium: ossium: narium: aurium:
 cruris, &c. In magnitudine aucta: vt lingua tu-
 mefacta: priapismus: auctio mām arū, testiculo-
 rum: caro supercrescens in vlceribus, &c. in ma-
 gnitudine imminuta: atrophia: tabes, &c. In situ
 autem morbi sunt: luxatio: articulorum com-
 motio: laxatio ligamenti, linguæ, pudendorum:
 coalitus digitorum, labiorum, sedis: epiplocele:
 enterocele, &c. Cæterum in vnitae soluta, & qui-
 dem in carne morbi sunt, Vlcus: vulnus: contu-
 sio: illisio: in osse, fractura: rima: caries: in ner-
 uis, punctio: scissio: σπάσμα: in venis, ruptio: in
cute, excoriatio, &c. Cōpositi verò morbi, ex iam
 dictis facillè apprehendi possunt. Hæc quidem
 sunt vniuersa morborum genera.

De symptomatis in vniuersum,

Cap. 5.

Sympt. g^d.
g^a.

Actiōnū
lesio.

Animaliū.

Symptoma est affectus morbū sequens. Horū
 duplex est genus: aut functionū noxa, aut af-
 fectus corporis nostri. Actionū noxa, sunt vel na-
 turaliū, vel animaliū. Rursus animaliū actionum
 noxa, sunt vel sensibiliū, vel motricū, vel princi-
 pum. In principe actione, & quidē imaginatione
 abolita

abolita consistit, Caros: catalepsis: in debili, coma: lethargus: in deprauata, delirium. Sic in ratione abolita, dementia, & stultitia comprehenditur: in debili, fatuitas: in deprauata, delirium: in memoria verò abolita, obliuio: debili, torpor: deprauata, delirium. Quod ad noxas functionum sensibiliū attinet, in visu abolito, cæcitas: in debili amblyopia: in deprauato hallucinatio existit. Sic in auditu abolito, surditas: in debili, grauis auditio: in deprauato, obauditio. Ad eundem modum in reliquis sensibilibus censendum. Cæterū in motu abolito, apoplexia, & paralyfis est: in debili, stupor: in deprauato, conuulsio: tremor: horror rigor: sternutamentū: tussis: pandiculatio, & oscitatio. Porro naturalium actionum noxæ sunt vel in retentione vel expulsionē, vel attractionē, vel alteratione seu coctione. In retentione quidem abolita, hæmorrhagia: vomitus: sudor immodicus: lienteria: diabetes: menstruorum fluxus immodicus, &c. In expulsionē verò abolita, colica passio, voluulus: ischuria: in debili, dysuria: in deprauata, dysenteria: stranguria, &c. In coctione abolita, cruditas existit: in debili, tarda concoctio: in deprauata, cum cibis in ventriculo in alienam qualitatem permutatur. Eadem ratione de attrahente facultate existimandum est. Atque hæc quidem symptomatum differentia à functionum offensis sumuntur. Symptomata au-

Naturæ.

B

tem

Actiones ut $\left\{ \begin{array}{l} \text{aboluntur.} \\ \text{debilitantur.} \\ \text{deprauantur.} \end{array} \right.$

18 PRACTICÆ GENERALIS

Sympt. af.
fol. 105. tem affectus corporis nostri, aut visibilia, aut odorabilia, aut gustatilia, aut tactilia sunt. Visibilia sunt colores præternaturam: vt Morbus regius: ictēritia nigra: aqua intercus: lingua decolorata: pars aliqua corporis, ob abscessum, vel nigra, vel liquida, vel rubra. Audibilia verò sunt, voces clangose, turbide, vel tremule: soni: strepitus: stridores: murmurilla in alijs animalis partib⁹. Odorabilia sunt, foetor auriū, nariū, axillarū, gutturi, totius corporis: itē ructus fumosus, acidus, virosus, piscium foetorem referens. Gustatilia sunt: vt sudor vel alia reiectio dulcis, vel amara, vel salsa. Tactilia verò, vt cutis arida, intēta, laxa, vel rugosa, &c. Ac tales quidem, & tot numero symptomatum differentia existunt.

De causarum indicijs, Cap. 6.

Causa quid.
Xcū Quenā pars corporis sit affecta, & quis præternaturam affectus, hætenus docuimus, nunc quæ sit ipsius affectus causa, qua via, qua ratione dignosci valeat, inquirendum est, cum nihil sine causa fiat, affectusq; curari nequeat, nisi prius eius causa tollatur. Est itaq; causa affectus quoque præternaturam, actionem lædens, non quidē primariò, sed secundariò. Ipsa namq; non per se, sed morbo interueniente, actionem lædit. Proinde quisq; affectus præternaturam morbos præcedunt,

dunt, causa rationem obtinebunt, ac morbifica
 causa nominabuntur. Harum autem, cum alia in
 ipso animalis corpore consistat, *π. ο. γ. ο. υ. α. λ. γ. α. υ.* seu
 antecedentes medicis dicta, alia verò extrinsecus
 adueniāt, quas procatarticas seu primitivas ap-
 pellant: prius qua via ac methodo internæ inue-
 stigandæ sint, docebimus, deinde ex quib. externæ
 quoq; dignosci possint. Internas ergo causas ex
 morbi specie potissimum ac symptomatibus, eo-
 rumq; diuersitateprehendimus. At morbi spe-
cies præcipue causam indicat, vt si Synochus non
 putrida fuerit, sanguinem: si tertiana, bilem: si
 quotidiana, pituitam: si quartana, atram bilem,
 causam esse denotat. Adẽ quoq; ratione, phleg-
 mone, sanguinem: erysipelas, bilem: œdema,
 pituitam: scirrhus, melancholiam demonstrat.
 Sic quoq; nō modò quæ causa sit, verum etiã vtrũ
 ea, quæ morbũ facit, in parte cõtineatur, tãquã in
 propria essentia, vel tanquam in instrumento, aut
 per ipsam trãseat, ex symptomatum inquam dif-
ferentia, vt ex diuersa noxa diuersarum functio-
 num, excrementorum varietate, ac corporis diuer-
 sis affectibus, colore præsertim, vel sapore, vel o-
 dore, vel calore, vel mollitie, vel duritie. Totius
 quoq; corporis dispositio, temperamentum, seu
 ægrotantis natura, ætas, regio, tẽpus anni, consue-
 tudo, ratio victus, & vt vno verbo perstringã, cun-
cta, quæ præcesserunt, morborũ causas ostendunt.

*Carmin-
ditio.*

*Interne
vnde de
hæmorrh.*

2.

20 PRACTICÆ GENERALIS

*Externa
quæ per se
signanda*
Nam præteritorum cognitio nihil aliud est, quàm
inuentio causarum, quæ affectus pariūt His quoq;
addenda erit tū ciborū potionūq; , tū medicamē-
torū quotidiana experiētia, vt exquisitè cū mor-
bos, tū eorū causas inuenire valeas. Simili quoq;
ratione causæ externæ, seu pcatarticæ inuestigan-
da erūt. Ex ipsa nanq; morbi specie, natura agro-
tātis, ætate, regione, anni tēpore, aeris cōstitutio-
ne, præcedēti victus ratione, affectib. præcedētib.
alijsq; prædictis inquirendę erunt. Quæ vt sum-
matim dicam, intueri oportet curatā, tam præ-
sentia, quam præterita symptōmata. Præsentia
quidem medicus ipse inspicere poterit. Præterita
verò non ab agrotante solum, sed ab assistenti-
bus, uel ipsius familiaribus haud difficulter per-
discere licebit, quò promptius, non modò locus
affectus, ipseq; morbus, verum etiam causa insa-
lubris, quæcunque ea sit, comprehēdatur. Quam-
uis præteritorum cognitio magis necessaria fue-
rit, pro causarum, quæ affectus inducunt, inuen-
tione: velut præsentium, pro affectuum, & par-
tium affectarum inuentione.

De morborū causis in vniuersum, Cap. 7.

Licet causarum tractatio præter nostrum insi-
latū esse videatur, alterius enim tractationis
est, tamen cū ad causarum inuentionem non
parum

parum conducatur, morborum etiam causas in memoriam saltem studiosis reuocandas esse duxi. Itaque similium morborum calidorum causas, & quidem interne sunt, putredo sanguinis, vel bilis: item constipatio maxima. ~~Ex~~terna vero, ignis: sol: alimenta calida, acris: potus calidus: medicamenta acris, & alexiteria, & amuleta: exercitium vehemens: animi affectus, ut ira, excandescencia, &c. Frigidorum morborum causas internae sunt, humores frigidi, qualis est pituita: rarefactio totius, vel partis: constipatio maxima. Externa, aeris frigiditas, aqua niuis, glaciis, &c. cibus & potus qualitate frigidus, vel quantitate nimia sumptus: item medicamenta frigida: motus immodicus: otium: timores, &c. Humidorum morborum internae sunt humores pituitosi. Externa vero aer humidus, imbres plurimi: aquarum dulcium crebrae balneae: cibus & potus copiosior, & natura humidior: medicamenta potestate humida: somnus longior: vita ociosa, & ignaua: mollis educatio: & animi tranquillitas. Siccorum vero morborum causas internae sunt, humores melancholici: transpiratio plurima. Externa, aeris constitutio sicca: aqua naturam habentes sulphuris, nitri, vel aluminis: cibus & potus parcius, & natura siccior: medicamenta exsiccantia: exercitia immodica: vigiliae: curae: tristitia, moeror, angor, &c. Compositorum vero similium mor-

*Causae
morb.
calidi.*

Frigidi.

Humidi.

Sicci.

*Inferius
causæ mor-
borum cæ.*
 1. borum causæ ex simplicium morborum causis fa-
 cilè inueniuntur. Porro instrumentalium morbo-
 rum causæ, & quidem figuræ vitiatæ: est malus
 conformator: plenitudo, vel defectus. Obstructio
 nis verò, humor lentus & crassus: callus: grumus,
 &c. Angustia, carūcula: vel tuberculum: vel phle-
 gmonē: vel scirrhus: vel abscessus, &c. Compressi-
 onis verò est omne id, quod extrinsecus compri-
 mere vehementius valet. Dilatationis, expultricis
 facultatis motus immodicus: retentricis imbecil-
 litas: medicamenta vim aperiendi habentia: mol-
 licies immodica instrumentorum: aer humidus,
 & calidus. Coalitus autem causa est exulceratio
 superficiē internæ, qua partes postea coalescunt.
Asperitatis causæ sūt, humores acres: medicamē-
 ta abstergentia: puluis: fumus. Leuitatis verò, hu-
 mor pinguis, & viscosus. Sic numeri deficientis
 2. causæ sunt, vstio: resectio: putrefactio: refrigeratio.
 Superflui verò, utilis, vel inutilis materiæ multi-
 tudo: caro supercrescens in vlcere. phterigium in
 3. oculis, &c. Ad eundem modum magnitudinis au-
 ctæ, utilis materiæ multitudo: virtus valida. Minu-
 tæ verò utilis materiæ defectus: virtus imbecillis.
 4. Luxationis præterea causæ sunt, subitarius, & ve-
 hemens motus: intemperies humida: fractio su-
 perciliorum ossium. Epiplocelis, &c. meatus à pe-
 ritonæo ad testiculos pertingens dilatarus, vel ru-
 ptus, &c. Cæterum solutæ vnitatis causæ & quidē
 extrinse-

LIBER I.

23


*Soluto
unitatis
ca.*

extrinsecæ sunt omnia ea, quæ erodere, tendere, rumperere, frangere, tundere, incidere, vel vulnerare, apta sunt. Intrinsecæ verò repentinè validiq; motus: humores acres, seu erodentes: plenitudo ad uasa, &c. Tales quidem sunt morborum causæ. Porro cum symptomatum causæ, morbi sint, atque de ijs superius tractauerimus, huic libro finem imponemus.

B 4

P R A





PRACTICAE GENERALIS

LIBER II.

ARGUMENTVM.

De prognosticis, et indicationibus
curatiuis potissimum tractat.

Eius capita hæc sunt:

An affectus curari valeat, Cap. 1.

Nunquid æger seruabitur, aut morietur,
Cap. 2.

De signis salutaribus, & lethalibus, Cap. 3.

Quo tempore æger sanabitur, vel morietur,
Cap. 4.

De notis quibus modus salutis, vel mortis
dignoscatur, Cap. 5.

Num crisi vel absq; crisi morbus termina-
turus sit, Cap. 6.

De præ-

De presentis crisis cognitione, & indicijis
ipsam præcedentibus, Cap. 7.

De futurae crisis præcognitione, Cap. 8.

De futurae crisis per fluxum sanguinis nari-
um præcognitione, Cap. 9.

De indicijis futurae crisis per vomitum,
Cap. 10.

De signis crisis per deiectionem alui futu-
ram, Cap. 11.

De præcognitione crisis per menstruorum
purgationem & hæmorrhoides, Ca. 12.

De crisis præcognitione p sudores, Cap. 13.

De præcognitione crisis per abscessum,
Cap. 14.

De diebus indicatorijs, & decretorijs,
Cap. 15.

Quid sit in corpore egro agendū, Cap. 16.

Quid sit agendum, si vnicus fuerit affectus,
B 5 seu

seu morbus,

Cap. 17.

Quid sit agendum in pluribus affectibus, siue morbi, siue symptomata fuerint, C. 18.

Quid sit agendum, si fuerit morbus cum symptomate,

Cap. 19.

Quid sit agendum, si fuerit morbus cū sua causa,

Cap. 20.


Quid sit agendum, si morbus, & morbi causa, & symptomata fuerint complicata,

Cap. 21.

De alijs indicationib. quæ indicationes improprie dicuntur,

Cap. 22.

P R A-



27
PRACTICAE GENERALIS.

LIBER II.

An affectus curari valeat. Cap. 1.

Qua via ac ratione Medicus debeat partem affectam, affectumq; & causā morbi inuestigare, libro primo, qua potuimus breuitate, ostendimus, nunc ad actionem ipsam accedentes, tempestiuum esse videtur, vt edoceamus vtrum affectus sanari queat: deinde si quidem is curari valeat, quomodo, & qua methodo id peragi possit. Scire aut prius conuenit an curari valeat affectus. Nisi. n. medicus futura prius præcognouerit, et quonam morbus terminaturus sit prædixerit, suā facile reputationem amittet. E contra verò, si futura prædixerit, & vsum auxiliorum dextrum adhibuerit, non solū se à mortis culpa immunem reddet, sed etiam ægrotos obtemperantes efficiet, & de longinquo ipsi morbo obuiā ibit, multo antè remediōrū tempus oportunū edocens. Quare huiusmodi artis pars minimè negligenda erit, vtpote quæ in dignoscendis morborum euentis cōsistit. Verū cū non omnia, quæ circa ægrotantē oriūtur, necessariā obtineāt generationem, non erit vtiq; *prædictio* *aut infer.* *me.* semper firma prædictio, vt si propter vicinorū tumultū, aut latrantes canes, aut iniucūdos quosdā nuncios.

28 PRACTICÆ GENERALIS

nuncios infomnis reddatur ager: nullo horum morbi ratione effecto. Quinimò nec eorum omnium, quæ morbi ratione efficiuntur, certam præcognitionem habere poterit. Nam si humor aliquis intra corpus abūdans, & superfluus, in partem quampiam nobilem, vel principem repente influat, aut ab ea in viliores transeat: quò fit, ut eum, qui in princeps membrum illatus est, summum periculum: eum verò, qui non in nobilem, sed in viliores partem transmigravit, subita, ac inexpectata salus laborantis necessario sequatur. In his autem statibus, quò terminatur sit morbus, non exactè comperit Medicus: sed tantū in his prænosce licet inconstantiam, ac lubricitatem. At si permanentiam habuerit morbus: in quò non amplius diffuunt excrementa, sed in locum vnum quendam grassata, illum occupant, præagire in his futurum poterit, præsertim si circa ægotantem omnia rectè gerantur. Quæ enim perperam à quoquam aguntur, eæ causæ existunt, ut aut morbi solutio prorogetur, aut mors antevortat. Methodus autem, qua Medicus præagiri valeat, num morbus curari possit necne, ex quinque potissimum rebus elucescit: natura videlicet & usu partis: specie morbi: viribus: more morbi, & quantitate. Si namque pars corporis spermatica fuerit concisa, vulnerata, vel fracta, ita ut suo simili colligari non possit: vel pars ali-

*An morbus
sit curabilis
non potest.*

1. Q. 2. 3. 4.

pars aliqua corporis tam longinqua, vt ad eam
 medicamenta pertingere non queant, quomodo
 sanitatem polliceberis? è contra verò, si carnosæ,
 vel huiusmodi, vt remedia ad eā pertingere facile
 possint, de sanitate quis dubitabit? Ad eūdē mo- *2. Ex spe*
 dū pars, quæ ad vitā necessaria est, si perierit, præ- *partis.*
 stari non posse id, quò tendimus, indicat: è contra
 si perierit hæc, quæ ad vitam necessaria non est,
 præstari posse id, quò tendimus insinuat. Morbi *3. Ex spe mor*
 verò species, quæ ex proprijs symptomatibus, vt *bi.*
 primo diximus libro, dignoscitur, vtrum curari af-
 fectus valeat, sic indicare potest. Nam pestis, ele-
 phantiasis, phthisis, & hydrops, non, aut vix cu-
 rari posse indicat: è contra febris diaria, tertiana,
 &c. curari posse insinuat. Porro virium robur, vel *4. Ex virib.*
 imbecillitas tum ex proprijs actionibus, tū ex cō-
 modo tēperamēto, vel intēperie partiū, ex quib.
 vires proueniūt, dignoscere licet, tā eius, quæ ex
 corde prodit, quàm quæ ex hepate oritur, quàm
 etiā, quæ ex cerebro originem ducit. Si quidē fue-
 rint validæ, optimè sperare licet: sin imbecillas
 omnes deprehenderis, malum, vel mortem præ-
 dicēs. Si alterā tantum, vt vitalem, periculum
 annūcies: si animale tantum, non omnino de-
 sperabis: si naturalem, diligenter considerabis.
 Quoniam et ipsa mactum suspecta est, tamen prius
 consideranda vitalis est, deinde naturalis, vlti-
 mō animalis. Porro morbi mos curationis facili- *5. Ex more*
 tatem *morbi.*

tatem, vel difficultatem ostendit. Siquidem maligni morbi, & lethales solis præfagijs relinquendi sunt: boni verò, quorum signa sunt salutaria, curandi. Ad eundem modum morbi lōgi, difficilius, ac tardius: breues verò facilius, & citius curantur. Parui præterea Medici ope non indigent: magni & quidem cum signis salutari-
6. Ex gntz morbi. bus, curandi cum signis verò lethalibus, solis præfagijs relinquendi sunt.

Nunquid æger seruabitur aut morietur,
 Cap. 2.

POrro in conualituris moriturisq; ægrotationis vis cum virtute, seu natura semper conferenda est: vtrum videlicet superet. Nam veluti in oblectatoribus, vel onus aliquod portantibus accidit: vtrum aliquis portādo oneri sufficiat, sciri minimè poterit, hominis robore, oneris magnitudine, et itineris longitudine antea non perspectis. Aegri namq; vires portanti onus, morbus verò oneri, tempus autem, quod vsq; ad statum extenditur, itineris longitudini respondet, euadendum ergo vel pereundum homini esse ex horum duorum altero robustiore cognito, morbo videlicet, vel natura, prædictio facienda erit. Nam si natura, seu vires adeò validæ fuerint, vt possint morbum

bum superare, necesse est egrotum euadere. Si verò contrà omnino morietur. Vires autem tum ex actione, tum proba temperie, vel intemperie, vt præcedēti capite diximus, cognoscendæ sunt. Aegrotationis verò vis, tum ex morbi specie, magnitudine, tum more, siue malitia, vel benignitate, tum morbi statu, potissimum si crisi terminatur morbus sit. Adiuncta insuper consideratione signorum salutarium, & lethalium, de quibus deinceps dicitur.

Vires unde cognoscantur.

Morbi vires unde cognoscantur.

De signis salutaribus, & lethalibus,

Cap. 3.

Sunt autem signa salutaria, mente constare, facili anhelitus, facilis tollerātia, pulsuum bonitas, virium robur, decubitus decēs, facies sanis similis, venter & hypochondria nō dura, alui excrementa æqualia, compacta, & coloris aurei: vrina subflaua cum hypostasi alba, æquali, continua: sputum album, non fœtens quod facile expuitur: sudor in febribus acutis critico die superueniens. Coctiones namq; omnes crifium celeritatem, securitatemq; salubrem portendunt. E contra verò signa mortalia sunt, viriū profternatio, pulsus malus, debilis inordinatus, & inæqualis, mētis incōstātia, anhelitus difficilis, difficilis tollerātia, in-

Signa salutaria.

Lethalia.

quies

quietudo, facies tornatilis, nasus acutus, oculi cō-
 caui, tempora collapſa, aures pendentes, cutis fa-
 ciei tenſa, oculi lumen eſugientes, lachrymæ in-
 uolūtariæ: colligere paleas, vel feſtucas: ſomnus
 in ſenibus ſuperfluus: iuuenib. vigilia ſuperflua:
 appetentia proſtrata: oculi rubri: vena nigra, aut
 obſcura: color faciei viridis, vel obſcurus: inferius
 labrum agitatū: digiti, & ungues obſcuri, vel vi-
 rides: frigiditys extremorū: ſudores frigidi: alui
 excrementa nigra, viridia, foetida: vel alba liquida:
 vrina nigra, vel liuida, vel aquoſa in pueris, &c. Et
 vt ex his ordinatū habeas epilogū, ſic collige & p-
 ſigna diſcurras, à capite faciēs initiū. Primo itaq;
 considera diſpoſitionem faciei, an ſcilicet ſimilis
 ſit ſano: quomodo circa ſomnum, vigiliam, co-
 gitationem, rationem, & motum ſe habeat. De-
 ſcende deinde ad pectus, conſiderando videlicet
 anhelitum, & pulſum. Item tangas pectus, num
 calor ſit acutus, igneus, pūgitius, vel ſuauiſ: num
 tuſſiat, vel non. Deinde ad ſtomachū deſcendens,
 de appetitu quæras, an conſtet necne: num dolo-
 rem vel tenſionem, vel tumorem patiatur: num
 eructuationem acidam, vel fumoſam, vel aceto-
 ſam, vel acrem, vel inſipidam, vel putridam ſen-
 tiat. Demum ad hypochondria, ſi in dextro, aut ſi-
 niſtro grauitatem, tenſionem, duritiem, dolorem,
 vel tumorem ſenſerint. Similiter de ventre, an tu-
 morem circa vmbilicū, an dolorem patiatur.

His

*Quo ordine
 colligenda
 ſunt ſigna*

His omnibus si adiunges signa ab egestionibus, & vrina sumpra, facile tum signa salutaria, tum mortalia, & per consequens morbi euentum iudicabis.

Quo tempore aeger sanabitur, vel morietur, Cap. 4.

Vtrum aeger euadet, necne ex præcedentibus duobus capitibus deprehendere licet, nunc etiam, quo tempore euadendū, vel pereundum homini sit, edocendum est. Hoc autem facile dignoscemus ex morbi, ac naturæ robore. Siquidem eo tempore morietur ægri, cum facultatem morbus adeo prosterneat, vt functio aliqua ad vitam necessaria, pereat. Euadent verò tunc temporis, cum morbū semel natura superatura est. In propinquo verò morbi solutio erit, cum benè ualuerit facultas, ac morbo fuerit validior, iſque imbecillior: quòd si natura fuerit imbecilla, morbus verò valētior, mors maturabit. Vter autem altero validior sit, ex coſtionib. & cruditatibus excrementorū percipitur. Quæ quidē in venis continentur, per urinas quæ in toto corpore, per sudores: quæ in thorace & pulmone, per sputa: quæ in ventriculo, & intestinis, per alui excrementa: quæ in vesica, & renibus, per ea, quæ in urinis deferuntur: quæ in stomacho, & ven-

C

tre su-

*Ex quibus Notū
dō quod pbe
sit indicandū*

34 PRACTICÆ GENERALIS

tre superiori, per ea, quæ euomuntur: quæ verò per palatum, nares, vel aures excernuntur, animalem facultatem declarabunt. Ita & de reliquis iudicandum excrementis. Commune namque in omnibus est, non prius morbum dissolui posse, nisi coctionis indicium apparuerit. Concoctiones enim omnes crisum celeritatem, securitatemque salubrem portendunt. Cruda verò & incocta, & quæ in malos conuertuntur abscessus, infestas iudicationes, vel labores, vel recidiuas, vel mortem significant. Præfinitum ergo tempus, quo vel pereundum, vel euadendum sit homini, ex eo intelliges, quanto videlicet alter altero validior sit: quantum inuicem superant, & superantur concoctionis, & cruditatis signa. Hæc igitur vniuersa in primis etiam morbi diebus, quos primus præfinit quaternarius, præsertim si acutus sit, exactè dignoscenda sunt, pro notitia temporis, quo potissimum salus, aut agri exitium expectetur. Vfus namque prædictionis est agnoscere diem, quo morbus iudicandus est. Verum cum nec scribi, neque sermone edoceri omnino singulorum quantitas possit, ex nulla tamen re possumus adeò ad exquisitam eius peruenire notitiam, quantum ex crebra exercitatione circa quantitatis coniecturam. Neque enim bene prænoscere valebimus, nisi horum

*Solutio
morbi in
dici.*

*Prædictio
v. 9.*

horum singulorum magnitudinem diligenter
pensitemus, eiusdem morbi motu, nunquid
videlicet acutè, aut tardè moueatur, non ne-
glecto.

*De notis quibus modus salutis, vel
mortis dignoscatur,
Cap. 5.*

Modus verò conualescendi, aut moriendi, ex
morbi natura, seu specie, ac loco affecto
parebit. Sunt namq; morborum quidam, quo-
rum natura est suffocare, cuiusmodi sunt morbi
thoracis, pulmonis, aut gutturis, qui vitale suf-
focant facultatem. Ex cerebri ventriculorum
obstructionibus, suffocationes eiusdem anima-
lis facultatis oriuntur. Sunt etiam morbo-
rum nonnulli, quorum natura est prosterne-
re, qui statim ipsum cor occupant, quemadmo-
dum longi, & vehementes dolores, stomachi af-
fectus quidam, aut hepatis morbi diuturni, vi-
talem facultatem prosterunt, ac hestice febres
omnes, & cordis intèperies magna. Pari ratione
de naturali facultate sentiendum erit; etsi ani-
mal omnino perire nequeat, nisi cor afficiatur.
Vnde mortè semper cordis immodicas intem-
perantias sequi necesse est. Porro quidem subito

36 PRACTICÆ GENERALIS

vnà cum turbatione, & agitatione, & quibusdam excretionibus, vel abscessibus moriuntur: nōnulli verò subito, sed sine excretionē, vel decubitu: quidam mortem non subeunt, sed multò deterius euadunt: nōnulli paulatim moriuntur, vt in marasmo fieri cōtingit. Conualeſcendi vero tres existunt modi: vnus qui fit per crisim perfectam: alter, per imperfectam crisim: tertius per solutionem tantum, & absq; crisi. Hæc autem omnia ex morbi specie, motu, coctionibus, cruditatibus, & viribus perdisces.

Modi conualeſcendi.

1. verò tres existunt modi: vnus qui fit per crisim perfectam: alter, per imperfectam crisim: tertius per solutionem tantum, & absq; crisi. Hæc autem omnia ex morbi specie, motu, coctionibus, cruditatibus, & viribus perdisces.

Num crisi, vel absq; crisi morbus terminaturus sit; Cap. 6.

Vtrum autem per crisim terminabitur morbus, aut non, ex magnitudine. & paruitate, distinguitur. Siquidem magni omnino per crisim iudicantur: qui autem parui, soluuntur solum. Per crisim verò subito ad sanitatem veniunt, & quidem per manifestas excretiones, aut effatu dignus abscessus. Per solutionem autem paulatim, decrescente videlicet morbo.

Crisis.

Solutio.

De præ-

De presentis crisis cognitione, &
indicijs ipsam antecedentibus,

Cap. 7.

Equidem presens crisis ex quinque potissimum rebus dignoscitur, coctionibus scilicet, indicatoria die praegressa, morbi specie, & more & excretionem, quæ morbi speciei correspondeat. Primum quidem & maximum instantis bonæ crisis indicium sunt coctiones vinarum, excrementorum alui, & sputaminum. In morbis quidem thoracis, atque pulmonis sputamina sunt animaduertenda: non tamen vinarum contemplatione negligenda, sed & alui excrementa sunt inspicienda. Si verò tantum febricitent, sine alicuius visceris passione, aut cum inflammatione hepatis, vel renum, vel vesicæ, vel splénis, maxime vrinis animum adhibere oportet: sicut, si circa ventriculum passio sit, primum excrementis alui: deinde neque vrinæ sunt negligendæ. Semper enim cum febris affuerit, vel ex sola humorum putredine accensa, vel ex membro inflammationem patiente, præcipue vrinæ inspiciendæ sunt, atque inde coctiones agnoscendæ. Secundum autem indicium, quod ab aliqua die indicatoria antea indicetur, cui annexa est diei iudicantis potentia. Deinceps autem inspicere

*hæc sunt
crisis
notæ.*

1. Coctio.

*2. Indica-
toria dies
praegressa.*

38 PRACTICÆ GENERALIS

3. Morbi
spec.4. Morbi
mor.

5. Excretio

oportet, & speciem morbi, & morem: speciem quidem, si tertiana, vel quotidiana, vel febris ardens, vel pleuritis, vel peripneumonia: morem autem, si moderatus, & mitis, vel pravius atque malignus. Deinde, si formæ morbi excretio respondeat: ut si in febris ardente, vel sanguis e naribus profluet, vel sudor multus emanabit; aut per vomitum, aut per aluum biliosa excernentur: in tertiana quidem, si vel sudor multus, vel biliosa per vomitum, vel aluum profluent: in quotidiana verò si plurimum pituita excernetur, & multi in toto corpore sudores: in quartana, si atra simul ac varia excernentur: & sic in cæteris affectibus indicandum. Porro huiusmodi excre-

Symptoma
ria Crises
pendentia.

tiones non mediocris in corpore agrotantis perturbatio antecedit. Nam & difficiles tolerantia, & vigilia, & deliria, & graues somni, & difficiles anhelitus, & vertigines tenebrosæ, & difficiles sensus, dolores capitis, colli, & stomachi, & multorum aliorum membrorum: nonnullis verò aurium sonitus, & vani ante oculos apparent splendores, & lachrymæ inuoluntariæ effluunt, & vrina retinetur, & labrum agitatur, obliuio, & præsentium ignorantia, & vehemens accedit rigor, & plurimum accessio consuetam anticipat horam, & multus æstus, sitisque intollerabilis sequitur: cla-

mant,

mant, & saliant, sicuti furentes, neque possunt in eodem situ recumbere: deinde repente multus sudor erumpit, aut vomitus aliquis non paucus insequitur, aut venter subito soluitur, aut abundans fit fluxus sanguinis, aut hæc omnia simul contingunt, unde non paruus inuadit timor inspicientes. Ac sic quidem præsentem crissim dingoscere oportet. Et ab horum sanè symptomatum apparitione sunt qui Criseos appellationem deducunt, quòd quales in ijs qui ad mortem damnantur perturbationū euripi deprehenduntur, tales quoq; in ægris conspiciantur.

De futura crisis præcognitione,

Cap. 8.

Quod ad futuram crissim attinet, eam hoc *Futura Crisis morbi* modo dignoscere oportet. Morbi natura consideranda est, an ad bilem flauam pertineat, vel atram, aut pituitam, vel mistas habeat significationes. Post hoc autem tempus anni, & laborantis ætas, & complexio, & quæcunque alia eius ordinis sunt. Post hæc autem accessio- *3* num circuitus sunt considerandi, si vel per tertium, vel per quartum, vel per singulos dies eueniât, vel nullo modo eueniât, sicuti in Synochis accidere solet. Si enim properauerint, ac semper *C 4* propor-

40 PRACTICÆ GENERALIS

proportionabiliter anticipauerint horam, & multò vehemētius infestauerint, & per terrium occurſauerint, citò crīſim ſubſecuturam denunciant. Si verò lentè moueantur, atque eadem inuaſerint hora & ſingulis diebus ſiant, poſt longius tempus crīſim futuram denunciant. Præterea coſtiones inſpicere oportet. Si enim in diebus indicatoribus ſiant, indicia ſunt, quod frequentes iudicatorij dies ægrum morbo liberabunt: veluti ſi ſtatim ab initio omnia ſigna integrè ſecura videantur, in primo quaternario crīſim futuram denunciant: ſi autem parum à maximè ſalubrib. diſceſſerint, ſeptimum diem transcendere nō cōtingit. Si verò ſeptima die aliquod coſtionis ſignum manifeſtè appareat, & morbus magnus extiterit, & celeriter moueatur, vndecimo potius, quàm decimoquarto, crīſis futura eſt. Quòd ſi minor fuerit, neque celeriter motum habeat, decimoquarto magis, quàm vndecimo. Simul verò cum alijs eſt diſtinguendum, ſi & iuuenis fuerit, & natura bilioſus, & tempus æſtium, & in loco calido ægrorauerit, & prior victus, & quæcunque præſenti attingent ſtatui, ad calorem declinauerint, omnino vndecimo crīſis ſubſequutura eſt, quemadmodum ſi omnia contraria ijs, quæ dicta ſunt, affuerint, in quartodecimo. Quòd ſi nonnulla quidem affuerint, nonnulla verò non, atque
interim

interim aliquis error inciderit, fieri non potest, ut crisis die vndecima subsequatur: sapius vero nec die decimoquarto, quando magis fuerit erratum. Sed, si nullus error acciderit, mista vero fuerint accidentia, hicopus erit Medico exercitatio, ac perspicaci, ut ea, quæ vim maiorem habent, signa distinguat, & illi, quæ ab ipsis ostenditur, crisi fidem adhibeat certiolem, in hisce adeo ambiguis præcognitionibus. Quod si autem in salubri morbo in primis diebus tardiolem febris motum habeat, neque cum nimis vehementi calore, & adsint cruditatis signa, hæc quidem intra quartumdecimum diem non finietur: an vero in illa ipsa die, vel postea, ex morbi temporibus, distinguendum est. Nam principij quidem signa, si diu permanserint, diuturnum fore morbum significant. Augmenti vero si in quarta vel septima die apparuerint, sperandum est aliquid in quartodecimo: sed in vndecimo determinabitur. Nam si hæc tria in eodem die coniuncta fuerint, & motus velocitas, & febris magnitudo, coctionisq; signum manifestum, fiet crisis in quartadecima: adhuc autem magis, si & anni tempus, & ætas, & ægrotantis natura, & quæcunque alia his sunt proportionalia, ad crisis celeritatem contulerint. Si vero solum manifestum coctionis signum die vndecima appareat, neque tamen morbi magnitudo,

42 PRACTICÆ GENERALIS

rudo, aut motus velocitas festinauerint, tunc ultra diem decimumquartum crisis differetur. Sed, si quidem anni tempus, & ætas ægrotantis & quæcunque alia his sunt proportionabilia, ad frigidius declinauerint, forte sperandum est morbi solutionem in vigesimo die secuturam. Quòd si mista quoquo modo signa affuerint, & dies decimusquartus coctionem insigniter auerit, die decimosextimo crisis occurret. Si vero neque die quartodecimo aliquid nouatum fuerit, tunc ad septimumdecimum diem est respiciendum. Si enim in eo aliquod signum apparuerit, id fidissimum erit, quamuis valde exiguum fuerit, vigesimoque die crisin præmonstrabit. Et hoc quidem sic se habere censendum, nisi Naturæ conatus ab externis quibusdam vel consilio vel casu superuenientibus impediatur.

De futuræ crisis per fluxum sanguinis narium præcognitione,

Cap. 9.

ERgo si acutus & calidus fuerit morbus, necesse est huiusmodi crisisbus excretionem aliquam subsequi. Vtrum verò per sanguinis fluxum, vel vomitum, vel sudores, vel per aliquod aliud futura sit crisis, deinceps dicemus

mus

mus initium à profluuij sanguinis indicijs, facientes. Itaque propria profluuij sanguinis è naribus signa sunt splendores vani ante oculos, quoniam humor flauus est: obtusiones, quoniam multus & totus simul elatus ad superiora spiritus meatus obserat: oculi lachrymosi ob fluxus multitudinem. Eodem modo rubicundi aliquando videntur, cum malis nonnunquam & naribus. Proprium verò signum est etiam præcordiorum tensio sine dolore: anhelitus difficilis. Sed & dolores capitis extendentes, pulsantesque, & calidi, sanguinis fluxum propriè significant. Sic etiam viscerum sub præcordijs existentium inflammationes, causæ sunt vnà, ac signa sanguinis fluxuum. Quòd si ad latus diuersum sanguinem fluere non est bonum, secundum directum verò est bonum, iam tibi facillimum est narem, ex qua fluxurus est sanguis, prædicere, vbi causam iam fluxuri sanguinis inueneris. Dextra enim præcordia, ex dextra nare bonam crism afferunt, sinistra verò ex sinistra. Præter hæc omnia, & ætas, & tempus anni, & regio, & ægrotantis natura, futurum sanguinis fluxum possunt manifestare. Porro per sanguinis narium fluxum iudicantur plerunq; febres ardentes, acutæ. Et omnes, quæ in præcordijs fiunt calidæ atque acutæ inflammationes, fluxu sanguinis iudicantur.

Soluít

44. PRACTICÆ GENERALIS

Soluit autem lienis, & hepatis inflammationes sanguis è naribus profluens, cum hæc viscera vnà cum acutis febribus habent inflammationes. Contingit autem aliquando, quod etiam per sanguinem è naribus fluentem phrenitis iudicatur, interdum etiam pleuritis, rarius tamen quàm phrenitis profluvio sanguinis soluitur.

De indicijs futuræ crisis per vomitum; Cap. 10.

Vomitum autem signa sunt oris ventriculi morsus, simul cum dolore capitis, & vertigines obortæ, cum ijs, quæ obijciuntur oculis, tenebrosis, & cum agitatione labri inferioris, & multo ac tenui sputo defluente. Hæc verò omnia accidunt, cum biliosus, & mordax humor in ventre ac stomacho collectus fuerit, & ventriculi os momorderit, & cum ipso totum stomachum intus atque infra distraxerit, vnde & labrum in ipsis agitur, & sputum tenue defluit, & tenebrosa quædam oculis obuersantur, & & hallucinantur, & vertiginem patiuntur, & caput dolent, euaporante re aliqua ex humore bilioso, & præterea facta ex nervis compassione. Item pulsus sunt inæquales omnino, cum stomachus iam grauatur, ac morderetur. Porro per vomitum magna ex parte indicantur, febres ardentes

*Signum V.
vomitum indicat
fistulam.*

*Cui morbi
p. vomitum
dicant.*

entes, tertiana, quotidiana, quartana, semiter-
tiana. Hepatis vero caua quidem partes inter-
 dum biliosis vomitibus finiuntur, &c.

De signis crisim per deiectionem alui
futuram, indicantibus,

Cap. 11.

SI verò per excretionē alui crisis sit subsequen-
 tura, manifestum quidem est nullū signum,
nec proprium: sed ex eo, quod adsunt quidem
 crisis signa, desunt autem vomituum, vel fluxus
 sanguinis, vel sudorum; colligere licet. Solent
 autem per alui deiectionem sapissime finiri ter-
 tiana, quartana, & quotidiana. Hepatis vero
caua quidem partes inflammationem patien-
 tes, excrementis alui biliosis interdum iudi-
 cantur.

De præcognitione crisis per menstruor-
um purgationem, & hemor-
rhoides, Cap. 12.

PORRò crisim per mulierum menses, indicabit
 magna lumborum grauitas, & tensio, & do-
 lor. Hæmorrhoides verò non omnibus consueta
 sunt.

46 PRACTICÆ GENERALIS

sunt. Quibus autem sunt consuetæ, in his solis non facile quis distinguet.

De crisis præcognitione per sudores,
Cap. 13.

*Qui morbi
existeret
in febribus*
QVOD si crism per sudores fieri contingat, partes corporis erunt calidæ rubræ, vaporosæ: pulsus erit vndosus & mollis: vrina & alui excrementa pauca: delirium: rigor: signa vomitus nulla. Per hunc potissimum finiuntur febres omnes, potissimum ardentes acutæ, tertianæ, quotidianæ, phrenitides, inflammationes calidæ & acutæ in præcordijs existentes, &c.

De præcognitione crisis per abscessum, Cap. 14.

*Morbi chronici
in abscessum
sua finem
signa coar.*
HActenus acutorum & calidorum affectuum crises enumerauimus, nunc ad diuturnorum ac tardorum accedamus, qui plerunque per abscessus quiescere consueuerunt. Horum quidem omnium communia indicia sunt, salutariter se habere ægro, quod neq; morbus soluatur, neque vrina multa & maltam habens subsidentiam, sed cruda & tenuis appareat. Propria verò, vbi morbus non fuerit valde diuturnus, si subita
difficul-

difficultas anhelitus laboranti superueniens, mox quiescat, eamque grauitas capitis, ac dolor subsequatur, & grauis somnus, ac surditas: huic in glandosis carnibus post aures necesse est abscessus fieri. Si verò morbus iam diu durauerit, neque vllum ex his signis affuerit, sed in aliquo ex locis inferioribus, vel grauitas, vel tensio, vel inflammatio, vel dolor apparuerit, huic abscessus ad partes inferiores est expectandus. Solent autem per parotides finiri lethargus frequenter, & capitis affectus omnes: per alios verò abscessus diuturnæ febres omnes, &c.

De diebus indicatorijs, & decretorijs,

Cap. 15.

CUM ad crisis nōtitiā indicatoriorū pariter & indicatoriorum dierum, quorum suprà mentionem fecimus, cognitio necessaria sit, operæ pretium esse videtur, vt de eorum quoque natura differamus. Primum itaque omnium dierum decretoriorum septimum dicimus, non numero videlicet, & ordine, sed potentia & dignitate: omnes enim summatim decretoriorum notas occupat. Etenim plurimos indicat, & absolute, item cum manifesta excretionē, vel abscessu, sine periculo vehementi: & vt plurimum quartus eum prænūciat. Nam si vrina in illo

7. decr.

4. indic.

48 PRACTICÆ GENERALIS

illo planè, vel spura vel deiectiones fuerint co-
ctæ, appetitusque vel mentis, vel sensus, vel al-
terius cuiusdam similis bona adfuerit muta-
tio, in septimo iudicatio bona comitabitur: si
verò mala, omnino contraria euenient. Septimi
naturam decimusquartus maximè imitatur:
hunc indicat vñdecimus. Sic decimus septimus
vigefimi: vigefimus quartus vigefimi septimi:
trigesimus primus trigesimi quarti: trigesimus-
septimus quadragesimi index est, & sic dein-
ceps vsque ad centesimum. Cæterum sunt quo-
que dies *intercidentes*, quod scilicet inter indi-
ces & decretorios dies intercitant: verum hi
minus perfecti sunt, & in eos nō nisi erratis qui-
busdam interuenientibus, crises transferuntur.
Multo igitur minorem, quàm priores vim obti-
nent, neque enim naturæ motu, sed morbi ma-
litia, aut extraneo aliquo impellente, in his cri-
sis accidit. Sunt autem intercidentes dies, se-
xtus, octauus, decimus, decimustertius, &c. de
quibus consule Galen. libr. primo, de dieb. de-
cretorijs.

Quid sit in corpore ægro agendum,

Cap. 16.

PArte affecta, ipsoque affectu & causa in-
uentis, selectoq; ex eorū notitia prognostico,
reliquum

*dec. 14.
ind. 11.
17. 20. dec.
24. 27.
31. 34.
37. 40.*

*Dies intercidentes
dantur
6.
8.
10.
13.*

reliquum erit, si curari affectus valeat, ad agendi modum accedere, atque indicare. Quid fieri debeat. Ergo generalis circa corpus ægrum operandi ratio ex natura corporis affecti procedit. *Operandi ratio generalis vide.*
 Æger namque sano contrarius est, ut immoderatum moderato, & praternaturale naturali. Moderatum in medio consistit: immoderatum vero tum in excessu, tum in defectu ad latera abscedit. Moderatum quidem suo simili conseruatur: immoderatum suo dissimili curatur. Ut ergo corpus ægrum ad sanitatem reducatur, contrario ægritudinis opus erit, iuxta communissimum Hypocratis axioma: quod omnium videlicet, quæ praternaturam sunt; ab ijs, quæ ipsis sunt contraria, curentur. Verum cum tria in corpore nostro praternaturam sint, Morbus, Causa, & Symptoma, quid in singulis, tum etiam complicatis agendum sit, deinceps dicere aggrediar, exordio à morbo sumpto.

Quid sit agendum, si vnicus fuerit affectus, seu morbus

Cap. 17.

Quod si morbus causam, quæ ipsum fouere potest, non amplius habeat, sed æger desierit, & solus morbus remanserit, huic soli incumben-

50 PRACTICÆ GENERALIS

*Similares
specificos
quos.*

cumbendum erit. Quid autem faciendum sit, indicat ipse morbus, sui videlicet curationē per contraria. Quare quot sunt morborum differentia, totidem quoq; erunt curationes particulares. Sunt autem morbi vel similes, vel instrumentales: vel similes & instrumentales simul. Similes verò morbi in intemperie vel simplici, vel composita consistunt. Sic in morbo calido, frigefaciendum est: in frigido, calefaciendum: in sicco, humectandum in humido verò, siccandū. Ad eundem modum in compositis videlicet calido & humido frigefaciendum & siccandum: in frigido & humido, calefaciendum & siccandum: in calido & sicco, frigefaciendum & humectandum: in frigido & sicco calefaciendū & humectandum est. Quod ad instrumentarios morbos attinet, contrarijs quoq; curandi sunt. Quod namq; in figura præternaturā curium est, in contrarium impellendum: quod verò rectum, reflectendum erit. Simili quoq; modo in cavitare procedendum est. Ea namq; obstructa, aperienda: plena, vacuanda: inanis replenda: dilatata restringenda: compressa dilatanda. In situ præterea, quod in anteriorem partē prominet, retrorsum pellendum: idem de reliquis oppositionib. in situ indicandum. Iam quoq; in superficie, partes quidem asperæ leuigandæ: leues verò exasperandæ. Ad eundem modum pars aliqua præter-

nat uram

LIBER II.

51

naturam nimium aucta, imminuenda: imminuta vero augenda. Sic quoq; numerus superabundans, auferendus: deficiens vero adijciendus. Porro vnio soluta reficienda est: reficitur autem per vnionem. Hæc quidem in vno præternaturam affectu, videlicet morbo, facienda sunt.

Quid sit agendum in pluribus affectibus, siue morbi, siue symptomata fuerint,

Cap. 18.

AT si non vnus tantum fuerit præternaturæ affectus, sed duo, vel plures, primum videre licebit, à quo maxime discrimen agro impedere videatur. Siquidem affectus, à quo primum maximeque impendet homini periculum, hic primum curari debet. Ad id verò quod magis vrget, dirigi primum curatis consiliū debet, non tamē alteri cura omnino posthabita: cum etiam aliquando omnibus pari studio auxiliemur, si æqualiter vrgeant. Vrget autem maxime affectus, vbi ipse magnus fuerit, aut malignus, aut pars, quæ afficitur nobis seu princeps. Hac igitur via curari debent complicati affectus, vbi alter magis vrgeat. At si ita se habeant, vt vnus sanari nequeat, nisi prius alter curatur, ad id, quod ordo dictat, est respiciendum.

D 2 eo sci.

32. PRACTICÆ GENERALIS
eo scilicet prius curato, quo non curato, reli-
quus affectus curari nō valet, veluti si vlcus vna
cum phlegmone cōsistat, quamuis phlegmone
ad vlcus consequatur, curari tamen non valet
vlcus, nisi prius phlegmone curetur.

*Quid sit agendum, si fuerit morbus cum
symptomate, Cap. 19.*

AT si vnus affectus causā rationem obrineat,
alter verò effect⁹, animaduertēdū erit, quif-
nam eorum augere, aut gignere reliquum possit
quīue rursus gignatur, vel incrementum ab eo
suscipiat, illud pro comperto habens, non posse
ad perfectionem vllum affectū sanari, manente
adhuc ipsa, vnde natus est, causa. Quanquam fie-
ri aliquando potest, vt tamen sit eius, qui se ha-
bet vt effectus, magnitudo, vt præsentem perni-
ciem, nisi occurras, afferat: quo casu oportebit
huic primò occurrere, deinde ad causam redire,
licet nō amplius complicati, tūc affectus à Me-
dico, vt causa, & effectus considerentur, sed vt
vnus magis vrgeat, quàm alter. Qua ratione in-
terim sit, vt quamuis symptoma nullum seorsū
curationem exigat, ex accidente tamē sympto-
mata quædam interdum curationem immut-
ta, causa scilicet locum eo tempore habentia, quā
do adeo.

*Symptō per
rationem causā
exigunt,*

LIBER II.

58

do adeò aucta sunt, vt lædant, aut virtutem,
aut affectionem. Quo fit, vt curandi ratione mu-
tata, symptomata primùm sum mouere cogi-
mur. Quod iterum non vt symptoma, sed tan-
quam magis urgens affectus a Medico considera-
tur. Quare cum non adeò urgent symptomata
à morbo ipso, à quo dicta symptomata gignun-
tur, & incrementum suscipiunt, prima sumen-
da erit indicatio, acis primò curandus, demum
ad symptomata accedendum erit.

*Symptoma
curabitur
tanquam
urgens*

Quid sit agendum, si fuerit morbus cum
sua causa, Cap. 20.

VBi verò qui generat affectum, morbi causa
fuerit, ipsa causa spectanda erit. Prima nāq;
indicatio ab ipsa sumitur causa, quoniā hæc pri-
mò sumenda erit. Fieri enim nequit vt morbus
curetur, nisi prius causa, quæ ipsum fouet remo-
ueatur. Quare prius antequam morbum aggre-
diaris, causa remouenda erit, alioqui morbus
inde recrudescet. Interim tamen nec eius morbi
qui per eam genitus est, ratio non habenda erit.
Quinimò si in idem consentiant, & quæ morbum
curant, & quæ causam oppugnant, sine cunctati-
one id peragendum erit. Animaduertendum ta-
men in huiusmodi implexibus, quod interdum

*Causa prius
est tollenda.*

Cautela.

D 3

à causa

54 PRACTICÆ GENERALIS

à causa quapiam oritur affectus, sed ita oritur, vt separata causa, haudquaquā affectus ipse perma-
nentē habeat dispositionē. Nonnunquam autē
partim iam factus, est, partim etiam dū fit, saepe-
numero, quāquam fieri desinat ablata causa, p-
seuerans tamen manet dispositio. Proinde si ta-
lis naturæ erit, qui à quapiam causa affectus ori-
tur, vt ea sublata permanere nō valeat, summo-
uenda tunc tantum causa erit, nulla demū ipsi-
us affectus habita ratione, cum propter eorū exi-
guitatē, separata causa, illico tales affectus finia-
tur, natura videlicet ipsos sanante, nullo adhibi-
to medicamento. Verū si non adeo exiguus sit
affectus, sed pars eius iam genita sit, pars in gi-
gnendo, & etiam dum fiat, vtriq; consulendum
erit. Primum quidē summouēdo, quæ ipsum effi-
cit, causam: deinde quod factū iam est ipsius au-
ferendo, vtpote natura propter eius magnitudi-
nem absq; medicamento externo ipsum vince-
re non potente. Quod si in idem consentiant, &
quæ causam rescindunt auxilia, & quæ affectum
oppugnant, sine cunctatione id peragendum e-
rit. Quāquā prima indicatio ppetuò ab ipsa sumi-
tur causa, eaq; nimirum prima sananda erit. Ete-
nim dum ipsa lædit, curādi morbi rationē inter-
pellat. Interim tamen nec ipsius morbi, vt dixi-
mus, ratio nō habēda erit, quinimò semper quo-
ad fieri possit, medicamentorum materia elige-
genda est,

*Si morbi
tunc fit
fieri.*

*Si morbi par-
tis & tunc
partis in
fieri.*

*Prima indi-
catio à ca-
distinguit.*

genda est, quæ cū hoc, quod causam rescindat, affectum saltem nō augeant. Si ex iisdem amborum sublatione provenire non poterit, necesse est, ut vnamquamq; prius, quæ efficit, causam rescindamus, deinde ita ad illam, quæ ab eadem causa facta est, agnitudinem accedamus. Ut verò *Pro Causa* prius efficientis causæ congrua fiat abscissio, *habetur.* prius alteranda seu concoquenda erit, præsertim si adhuc fuerit cruda: deinde euacuanda. Concoquitur autem, quod crassum est, attenuando: quod tenue, increassando: quod lentū, incidendo: quod tenax, ac viscosū, abstergēdo: quod obstrictū, aperiēdo: quod mordax diluēdo: quod putridū, exiccando, &c. Interim aut statim circa initia euacuam⁹, præsertim si materia turgat. Quantitas verò quæ auferri debet, tū ex eiusdem causæ quantitate mensuratur, tū ex viriū robore, vel imbecillitate. Naturæ aut robur ex ipso præsertim pulsu dignoscim⁹. Si verò admodū vires fuerint imbecilles, ut causæ ablationem phibeāt, ipsæ pri⁹ reficiendę sunt, causę ac morbi indicatione posthabita: ac demū ad causā, ipsūq; morbū redeūdū erit. Porro si morbi causā vehementer moueatur, et ad partē affectā impetu quodā fluat, tunc vel ad appositā partē reuellēda, vel ad vicinas partes deriuāda erit. Quod si partim fluat, ac partim influxerit, tūc partim q̄ influxit, euacuādū: partim q̄ fluit adhuc reuellēdū vel deriuādū est.

Concoquitur

Exiccō.

Si vires sint imbecilles.

Si morbi causa motu habetur.

Quid sit agendum, si morbus & mor-
bi causa, & symptoma
fuerint complicata,

Cap. 21.

Causa
Morbus
Sympt. **T**Ria in corpore nostro præternaturam sunt,
Morbus, Causa, & Symptoma: & morb⁹ qui-
dem sui curationem, causa sui ablationem: sym-
ptoma correctionem postulat. Causa ea est, quæ
morbum ipsum fouet. Quare primò & ante
morbum remouenda est. Morbus verò, ille est,
qui primò & per se actionē lædit: quare illi post
causæ abscissionem incumbendum. Symptoma
ta morbos sequi solent: ideo post morborum ex-
tirpationem corrigenda sunt. Quid autem in
quolibet affectu sit faciendum, superius dictum
est.

De alijs indicationibus, quæ indicati-
ones improprie dicuntur,


Cap. 22.

*Causa dicitur
sui leuor.
prior indicat
bonor.* **P**orro sunt & aliæ indicationes (quas impro-
prias appellant, propterea quòd proprias in-
dicationes, indefinitas alioqui, definiunt, & cir-
cumscribunt) minimè negligendæ: cuiusmodi
sunt,

sunt, virtus, temperatura, corporis habitus, ætas,
tempus anni, aeris constitutio, regio, consuetu-
do, & vitæ industria. Ostendi hoc potest in euacu-
atione. Siquidem virtus quantitatem actionis præ-
scribit: imbecillis enim minimè euacuationem
tolleat: Sic temperatura calida & humida euacu-
ationem facilius ferre, quàm reliqua compo-
sita temperamenta. Habitus corporis gracilis
pharmacum vehemens difficulter fert: rarus vi
pharmaci omnino dissoluitur. Ætas puerilis, &
senilis, neq; sanguinis missionem, neq; purgati-
onem tollent. Tempus anni calidius, aut frigi-
dius euacuationem impedit. Regio frigida & sicca
ad purgationes ineptiores reddit. Aeris consti-
tutio australis corpora humectat, & conspirabi-
lia efficit. Consuetudo indicat à quibus magis
vel minus lædi consueuerit. Nam consuetæ natu-
ræ sunt acceptiora. Vitæ industria in fabris, &
balneatoribus minus tutam euacuationem fo-
re monet, quandoquidem hæc corpora per sudo-
res subinde expurgantur. Sed pro indicationum
cognitione hæc nobis sufficiant, ad tertium acce-
damus librum.

D 5

PRA-





PRACTICAE GENERALIS

LIBER III.

ARGUMENTVM.

Quomodo & quib. instrumentis
agendum sit, docet item præcepta
de victus ratione instituenda,
secundum qualitatem, quanti-
tatem, locum, tempus et or-
dinem. Eius capita
hæc sunt.

Quomodo, & quibus instrumentis sit a- gendum,	Cap. 1.
De dieta,	Cap. 2.
De aere,	Cap. 3.
De ciborum qualitate,	Cap. 4.
De ci-	

De cibis temperatis,	Cap. 5.
De cibis calidis,	Cap. 6.
De cibis frigidis,	Cap. 7.
De cibis humidis,	Cap. 8.
De cibis siccantibus	Cap. 9.
De cibis boni succi,	Cap. 10.
De cibis mali succi,	Cap. 11.
De cibis lenibus, & acribus,	Cap. 12.
De cibis crassis & subtilibus,	Cap. 13.
De cibis medijs inter tenuantia, & increas-	
santia,	Cap. 14.
De cibis stomacho idoneis,	Cap. 15.
De cibis stomacho alienis,	Cap. 16.
De cibis capiti nocentibus,	Cap. 17.
De cibis inflatuiis, & flatu soluentibus,	
Cap. 18.	
De cibis facilis, & difficilis corruptionis,	
Cap. 19.	


De ci

- De cibarijs velocis concoctionis, Cap. 20.
 De cibarijs tardè digestionis, Cap. 21.
 De cibarijs multorum superfluitatum, &
 non habentibus superfluitates, Cap. 22.
 De cibis multi nutrimenti, Cap. 23.
 De cibis pauci nutrimenti, Cap. 24.
 De cibis laxantibus, Cap. 25.
 De cibis astringentibus, Cap. 26.
 De cibis vrinam mouentibus, Cap. 27.
 De ciborum quantitate, Cap. 28.
 De ciborum ordine, Cap. 29.
 De ciborum tempore, Cap. 30.
 De motu & quiete, Cap. 31.
 De somno & vigilia, Cap. 32.
 De abundantia, & inanitione, seu euacua
 tione, Cap. 33.
 De venæ sectione, Cap. 34.
 De scarificatione. Cap. 35.
 De pur

De purgatione,
De sudore,
De balneis,
De animi affectibus,

Cap. 36.
Cap. 37.
Cap. 38.
Cap. 39.

P R A-



82
PRACTICAE GENERALIS
LIBER III.

Quomodo, & quibus instrumentis
sit agendum, Cap. 1.

Transitio.

*Instrumenta
Medic. cura.
sunt.*

*An oib; sim
utendi sit
poterium
1. a morbi g.
libet.*

Q Va autē via, ac ratione valeat Medicus af-
fectam partem omnem, ac quemvis præ-
ternaturam affectum, eiusq; causam dignosce-
re, ac demum affectum ipsum, si quidem is cura-
ri possit, propugnare, duobus præcedentibus li-
bris ostendimus, nunc tempestivum esse vide-
tur, vt, quomodo, & quibus instrumentis sit agē-
dum, doceamus. Itaq; tria in vniuersum instru-
menta sunt, quibus Medicus in profigandis vi-
tetur morbis: Dixta scilicet, Pharmacia, & Chy-
rurgia. Vtrum vnico saltem, vel pluribus, vel om-
nibus simul vti debeat Medicus, indicabit mor-
bi qualitas, causarum varietas, corporis situs, &
locus affectus. Morbi quidem qualitas: vt intem-
peries totius corporis aliqua, commode tum Di-
xata, tum Pharmacia curabitur: situs, & figura vi-
tiata, & numerus superabundans, sola Chyrur-
gia curabuntur: sic quoq; meatuum obstructions,
& compressiones, & dilatationes, Dixta, & me-
dicamentis: plenitudo verò, tum medicamentis
cū phlebotomia: inanitas sola dixta: magnitudo
aucta,

aucta, pharmacia, & chyrurgia: vnitas soluta, chy-
 rurgia sola curatur. Eadē quoq; ratione causarū
2. Causarū
varietas, quo nimirū instrumento vtendum sit,
 indicat. Siquidem humorum qualitas, sui ablati-
 onem indicat, tum per commodā victus rationē
 tū per medicamenta contraria: quantitas verò vi-
 tiolorū humorū, solis pharmacis purgantibus eu-
 uacuati potest. Sic quoq; sanguis abundans, sola
 chyrurgia, phlebotomia scilicet, vel scarificatio-
 ne, vel sanguisugis: pituita, bilis melancholia, so-
 lis purgātibus. Eadē ratione partes corporis sup-
ficiaria, solis medicamētis sanari probē possunt.
 Quod ad locum affectū attinet, is pariter instru-
 mentorū varietatē demonstrare poterit. Nā totius
 corporis cōstipatio p frictiones, p balnea, p sudo-
 res curatur: enacuatio verò totius, per phleboto-
 miā, per frictiones, per exercitia, per balneū, per
 pharmaca, per inediam commodē perficitur. He-
 par euacuabitur sanguinis missione, diureticis,
 aluū ducentibus, aperietur verò cibo, & medica-
 mentis per os sumptis, atq; exterius applicatis.
 Ad eundem modū ex reliquis partibus affectis
 instrumentorū diuersitas inuestiganda erit. Ve-
 rū cū instrumentorū cognitio Medico quoq;
 necessaria sit, nūc ordine de eis agendū videtur
 ac præsenti quidē libro, de Dieta: de pharmacia
 verò, & Chyrurgia sequentibus.

3. Loco
 affecto.

34. PRACTICÆ GENERALIS

De Diata. Cap. 2.

*In Diata
q̄ observan-
da.*
1
2
3
t.
*Diata ingi-
confistat.*

IS curationis ductus contextusq; qui per con-
suetam materiam efficitur. Diata, id est victus
ratio nuncupatur, qua tanquam instrumento
Medicus utitur: debita qualitate, & quantitate
obseruata: sub quibus etiam tempus comprehe-
ditur. Siquidem pro temporis varietate, in quo
corpus hac vel illa affectione præditum est, eti-
am diatæ ipsius quantitas, & qualitas immutan-
da erit. Additur & ordo. Verum cum Diata sex
rebus, quas Medici res non naturales vocant, p-
ficiatur: videlicet aere, cibo, et potu: motu, &
quiete: somno, & vigilia: abundantia, & inaniti-
one: & animi affectibus, de his nunc ordine age-
mus, principium ab aere sumentes.

De Aere, Cap. 3.

*Cualis aër
unicuique
suummodo con-
ueniat.*

AEr medico maximè cōsiderandus venit, ut-
pote sine quo nec morbus tolli, nec tueri sa-
nitas possit. Quare diligenter perquirendum e-
rit quæ qualitas in eo dominetur. Siquidem tem-
peratis hominibus temperatus aer saluberrim⁹
est: intemperatis verò & ægris contrarius opti-
mus erit: calidis quidem frigidus: frigidis, cali-
d⁹: humidis, siccus: siccis, humidus: calidis, et hu-
midis. frigidus et siccus: calidis & siccis, frigidus.

& humidus: frigidis & siccis, calidus & humidus:
 frigidis, & humidis, calidus & siccus. Quòd si p
se talis non fuerit arte praprandus erit. Itaque
 si calidus & siccus fuerit morbus, cubiculum fri
 gidiorem & humidiorē parabimus, ex myrthis, *frigidis et huiusmodi, ut dicitur quo praprandis.*
 rosis, pomis, citrijs, salice, vitis folijs: atq; lactu
 ca, alijsq; floribus frigidis, & fructibus, aquaq;
 fontana, aut rosacea ex aceto, pauimenta eorum
 assidue aspergentes. E diuerso si frigidus & hu
 midus fuerit morbus, cubicula praprabimus *Calidis et siccis*
 ex calefacientibus, & siccantibus, videlicet igne
 ex iunipero, populo, salice, cupresso, thure, ligno
 aloës, oleis, rosmarino, &c. ita tamen ne ignis *Caute la.*
 plurimus sit, nec faciem versus, sed dorso ma
 gis insistens, ne vires agrotantium imminu
 at, visuiq; obsit. Porro obseruandum quoque
 venit, quod temporibus frigidis, calido, aut i
 gne: calidis, frigido: humidis sicco: & siccis hu
 mido aere maximè vti conueniat. In diuturnis
 etiam morbis nonnunquam solum mutare pro
 dest. Aeris enim & loci mutatione saepe sanitas
 amissa rec uperatur. Ceterum septentrionalis *Aeris muta
tio quā conueniat*
 ventus omnium optimus, & saluberrimus habe
 tur. Proximum locum sibi vendicat orientalis, et
 quicunq; ventus aerem modicè infrigidat, sic
 cat et serenat. Quare habitationes orientē versus *Ventus sa
luberrimus.*
 et septentrionē, meliores et salubriores habentur. *Habitationes
salubres.*

86 PRACTICA GENERALIS
De ciborum qualitate, Cap. 4.

E Quidem sani ad vitam saltem custodiam au-
mento opus habere videntur: agri verò non
solum ad virtutis conseruationem, verum etiã ad
morbi oppugnationem cibo & potu maximè
indigent. Proinde agrorum cibus, vt vim etiam
medicamentosam obtineat, necesse est, qui
protantium corpora maximè alterare possit.
Quare non solum ciborum qualitas, sed etiam
quantitas, tēpus, & ordo, Medico summopere
consideranda sunt. Verum de quantitate, tēpo-
re, & ordine deinceps, nunc de ciborum qualita-
te differendum videtur. Ciborum itaq; qualitas
ex ipsius morbi, eiusq; causæ notitia præstatur.
Etenim vniuersus victus, tū morbo, tū causæ cō-
trarius esse debet. Morbus enim calidus, victum
exposcit frigidum: frigidus, calidum: humidus
siccū: siccus, humidū: calidus & humidus, frigi-
dum & siccū: frigidus & humidus, calidum & sic-
cum: calidus & siccus, frigidum & humidum:
frigidus & siccus, calidum & humidum victum
exigit. Ad eundem modum obstructio aperien-
tibus cibis curatur: viarum plenitudo euacuan-
tibus, seu laxantibus & emolliētibus: dilatatio
verò constringentibus. Eadē quoq; ratione hu-
mor crassus, cibis attenuatibus: tenuis in crassā
ribus: lētus incidentibus: viscosus, detergentibus
corrigi-

*Ciborum glitas
se quid indicet.*

*Qualitas cibum
quolibet mor-
bi exoptat.*

*Humorosa
cibis non sunt
bona.*

corrigitur, & emédatur. Porro sanguis per victu *Hignovis*
 refrigerantē & exiccantē cōmodē cōtēperatur: *quali cibolo*
 pituita verò per exalfacientem & extenuantē *comparati.*
 bilis per refrigerantem & humectantē: melan-
 cholia, per exalfacientem & humectatē nō in-
 eptē pparari poterit. Verū vt Medicinā studiosi
 in medēdo vberiorē in prōptu habeāt materiam
 omnis generis ciborum qualitates describen-
 das fore putauī.

De cibis temperatis. Cap. 5.

Cibi temperati nulla vineēte qua litate sunt
 præditi, ij solum sunt alimenta, non etiam
 medicamenta, ventrem neq; soluunt, nec cohi-
 bent: stomacho neq; robur, nec imbecillitatem
 inducunt, sicuti sudores vrinamue nec prouo-
 cant, nec coercent: nec aliam quamuis disposi-
 tionem calidam, frigidam; humidam, aut sic-
 cam in animantis corpore ingenerant, sed quale
 animantis quod nutritur, corpus assumpserant,
 ale prorsus conseruant: cuiusmodi sunt triti-
 um, caro agnina annualis, hœdina, vitulina, ca-
 o gallinæ iuuenis, ius perdicum, phasiani, alau-
 a, lingua, oua mollia, & forbilia, poma dulcia,
 accharum, &c.

De cibis calidis, Cap. 6.

Cibaria calida sunt, quæcunq; sunt dulcia, vel acra, vel fassa, vel nitrosa, vel amara, &c. Eiusmodi est panis triticeus, caro agnina annuallis, cicera, poma dulcia, dactyli, vua dulcis, passulæ, apium, eruca, nasturtium, rapa, raphanus, alliū, sinapi, cæpa, porrum, pastinaca, caseus antiquus, vinum dulce antiquum, fuluum, rubeū. Calida verò & humida sunt, caro ouilla, hoc edina anatis, anseris, pullorum, perdicis, columbarū iuuenum, coturnicum, sanguis, hepar, testiculi, pinguedo, adeps, vitellus oui, butyrum, rapa, nappus, pastinaca, eruca, cicer, amygdalæ dulces, pistacia, dactyli, ficus recens, mulla, vua dulcis, zipha, saccharum, &c. Calida & sicca sunt, caro porcina syluestris, vaccina, caprina, leporina, anserina, turdorū, merularū, passerum: pisces saliti, caseus antiquus, beta, fœniculum, ruta, maiorana, rosmarinus, petroselinum, saluia, allium, cæpa, porrum, raphanus, oryza, capparis, amygdalæ amaræ, auellana, carica, pinea, mel, sapa, sal, anisum, cinnamomum, zingiber, crocus, caryophylli, galanga, nux moschata, piper, vinum dulce, rubrum, etc.

De cibis frigidis, Cap. 7.

Cibi refrigerantes sunt, quicunque sunt insipidi, vel
 racidi, vel austeri, vel acerbis: cuiusmodi sunt
 hordeum, milium, panicum, cucurbita, pepo,
 melopepo, cucumis, pruna, ficus, persica, cerasa,
 mora, pyra, mala austera, &c. Refrigerant autem
& humectant, caro elixa, caro porcina, cerebrum,
 pulmo, album ouis, lac, pisces recentes, lactuca,
 endiuia, portulaca, spinachia, atriplex, cucurbi-
 ta, anguria, faba recens, fungi, melopepones, ce-
 rafa, fructus recentes, oleum immaturum, persi-
 ca, pyra, pruna, poma insipida, uua acerba, vinum
 aquosum, &c. Porro frigidi ac sicci sunt, caro bu-
 buli, caro grui, aures, cutis, guttur, cor, stomach-
 us, intestina, matrix, acetosa, brassica, cichorium
 faba sicca, lentiscula, milium, panicum, oryza, hor-
 deum, zea, far hordei, far spelta, citonium, mala ci-
 tria, limonia, punica, melipila, oliua immatura,
 mala acetosa, acetum, agrestis, coriandrum, &c.

De cibis humidis, Cap. 8.

Cibaria humida sunt, omnia liquida, iurula,
 insipida, aquosa, pingua, mollia, & elixa: cu-
 iusmodi sunt, hordeum, prifana hodeacea, iuscu-
 la carniū, caro ouilla, hordiana, ranarum, pisces,
 pinguedo, adeps, oua sorbilia, anguria, cucurbi-
 ta, citrul-

70 PRACTICÆ GENERALIS

ta, citrulli, cucumeres, melopepones, nŕces virides, vua dulcis, ficus, pruna, mora, malua, lactuca, atriplex, blitum, spinachia, fabæ recentes, phaseoli recentes, &c.

De cibis ficcis, Cap. 9.

Porro cibaria ficca sunt omnia falsa, acerosa, nitrosa, amara, omnia asla: omne, in quo ponitur plurimũ vini, aut salis: omnis caro animalium vetustorum: cuiusmodi est caro omnis salita, leporina, hircina, caprina, assata, pisces sale conditi, lentes, caules, polenta, sinapi, acetum, maura, caseus vetus, salitus, vinum vetus, &c.

De cibis boni succi, Cap. 10.

Oni succi cibi sunt, qui bonum sanguinem procreare possunt: eiusmodi est, oryza, alica, triticum, siligo, prŕsana, amyllum, &c. Caro pullorum, caponum, gallinarum, perdicum, phasianorum, coturnicum, hœdina, vitulina, veruecina, capreolorum: aues parua: iecur omne: oua forbilia: caseus mollis. Ex piscibus sunt medj inter teneros, durosq;: cuiusmodi est mullus, perca, lupus, aurata, passerres, cochleæ, ostreae, cæcri, &c. Ex oleribus autem, lactuca, lupulus, malua, nitica, portulaca, &c. Ex fructibus cucurbita, oliua, po-

ut, poma, neque acerba, neque acida, mala citria,
vinum dulce, vel leue, &c.

De cibis mali succi, Cap. 11.

Cibi mali succi sunt, qui vitiosum sanguinem
generare consueuerunt: cuiusmodi sunt, mili-
um, panicum, legumina ferè omnia: caro domes-
tica permacra, falsa, antiqua: item caprina, cer-
tina, anserina, anatum: lienes, renes, intestina,
omne salsamentum, garum, caseus vetus, &c. Ex
piscibus, stagnatiles, lacustres: vt anguilla, tineæ
carpiones, &c. Ex oleribus, brassica, asparagus,
beta, porrum, eruca, nasturtium, thymum, nepe-
ta, satureia, hyssopum, ruta, anethum, foeniculū.
cuminum, anisum, lapathum, sinapi, allium, cæ-
pa. Ex radicibus, radícula, rapa, napi, bulbi. Ex
fructibus, cucumis, poma acida, & acerba: ace-
tum, omnia acria, & acerba: oleum, &c.

De cibis lenibus, & acribus,

Cap. 12.

Porro cibi lenes sunt perhumidi, lenti, glu-
tinosi, & pingues: cuiusmodi sunt sorbitio-
nes, pulticula, laganum, amyllum, ptisana,
caro pinguis, & quæcunque glutinosa est. Quod
ferè quidem in omni, quæ domestica sit, præ-
cipue tamen in vngulis, tranculisque suuat.

72 PRACTICÆ GENERALIS

in petiolis, capitulisq; hœdorum & vitulorum, & agnorum, omnibusq; cerebellis. Item si qui pprie bulbi nominantur, lac, defrutū, passū, nuclei pinei, malua, atriplex, blitū, cucurbita, mora, cerasa dulcia, pepones, melopepones, vinū dulce, &c. Acria verò sunt oīa nimis austera, omnia acida, omnia salsa. Item allium, cepa, ruta, eruca, nasturtium, beta, brassica, radícula, sinapi, &c.

De cibis *crassis & subtilibus,*

Cap. 13.

Cibaria crassi succi sunt, quibus cum visciditate vnà succorum bonitas, & crassities inest: suntq; omnia ferè glutinosa, quæ cum valentissimè alant, tum bonum procreare sanguinem cōfueuerint, si quidē ea vētriculus, ac iecur probè cōficiat: cuiusmodi est panis sine fermento, & sale, caseus omnis, lac, placenta, lagana, cochleæ, oua dura, cocta, & frixa: loligines, sepia, polypodes, pisces cetacei, ostrea, buccina, purpura, hiatalæ, lopades, pectines: item brassica, lentes, fungi, tubera, amyllum, iecur, renes, testes, glandulæ, cerebra, caro suilla, agnina: alica, oryza, prifana bulbi, glandes, palmulæ &c. Hæc inquam omnia crassiorem faciunt pituitam. Extenuat aut eandē omnia salsa, atq; acria, & acida. Horū nāq; officium est angustiores vias expedire, tū abstergere, si quid

si quid ex humoribus glutinosi vasis adhæserit, humorumq; crassitiē incidere, & extenuare. Eiusmodi sunt, cepa, porrum, raphanus, pastinaca, sinapi, nasturtium, allium, eruca, fœniculum, origanum, anethum, amygdalæ, mel, pisces salsi, muria, acetum, vinū, punicorū citrorū succus, &c.

De cibis medijs inter attenuantia & incrassantia, Cap. 14.

Cibaria inter attenuantia & incrassantia media sunt, quæ in excessuum meditullio, et at tēperantia quadam locantur: cuiusmodi sunt caro hœdina, gallinarū, gallorū gallinaceorū, tum phasianorū animum, perdicum, columbarū, attingenū, turturū, turdorū, merularum, & passerulorū oīum: oīa in aqua proiecta, hepata pullorū & anserū: pisces omnes nō duræ carnis, nec multū viscidæ, in aquis fluuiorū mundis nutriti: vix maturæ, caricæ, endiuiæ, lactuca, asparagus, vinū clarum, non nimium vetus, &c.

De cibis stomacho idoneis, Cap. 15.

Stomacho aptissima sunt, quæcūq; austera sunt, & acida, modiceq; salita. Item panis sine fermento, alica elota, vel oryza, vel prifana, oēs aues, omnis caro syluestris, vel assa, vel elixa: caro bubula, macra potius quam pinguis. Ex sue,

E s

vngu-

74 PRACTICÆ GENERALIS

ungulæ, rostra, aures, &c. Ex oleribus, endiuia, lactuca, pastinaca, siser, cucurbita, absynthium. Ex fructibus, cerasa, sorbū, morū, pyra, mala coto-nea, punica, palmulæ, nucleï pini, oliuæ. Ex piscibus, duri, vt ostrea, pectines, murices, purpuræ, cochleæ, vinum austerum, &c.

De cibis stomacho alienis, Cap. 16.

A Lienī cibi stomacho sunt, omnia repida, oīa pinguia, omnia inrulenta, prædulcia, panis hordeaceus, miliaceus, oleū, defrutū, pasum, lac, mel multū, oīs caseus, vua recens, ficus et viridis & arida, scēnū græcū, legumina omnia, quæcūq; inflare consueuerunt, beta, blitum, atriplex, thymum, satireia, nepeta, hyssopum, nasturtium, lapatum, lapsana, iuglandes, sesamum, batheca, cerebrum omne, medulla ossium, vinum nouū crassum, nigrum, ponticum, seu austerum, &c.

De cibis capiti nocentibus, Cap. 17.

C Apiti nocent lac, dactyli, vua in vinaceis cōseruata, scēnum græcū, ruta, sinapi, raphanus, nasturtium, vinum antiquum, præterea raspatium, &c.

*De cibis inflatiuis, et flatu sol-
uentibus, Cap. 18.*

Instant, faba, cicera, phaseoli non bene cocti, lentescens, hordeum non bene coctum, maza, ficius humida, lac, uua, nuges omnes, palmula, rapa cruda, milium, vinum dulce, passum, mel erudum, allium, cepa brassica, omnes radices, excepto sifere et pastinaca, bulbi, omnisque, caseus. Minime vero instant, omnis venatio, pisces, poma, oua forbilia, vel mollia, conchylia omnia, foeniculum, anethum, vinum vetus, anisum, cinnamomum, ruta, &c.

De cibis facilibus, et difficilibus corruptionis, Cap. 19.

Quocumque cibaria facile concoquuntur, facile item alterantur, & corrumpuntur. Facile autem corrumpuntur panis fermentatus, & quisquis alius, quam ex tritico est, chrysomela, pepones, persica, mora, pruna, praecocia, fructus omnes aestiuini, lac, lactoria omnia, pisces teneri, olea, caseus, caro tenera, vinum dulce, defrutum, passum, &c. At minime iatus viciatur panis sine fermento, aues, & ea potius duriores, aurati pisces: scarus, loligo, locusta, polypus. Item bubula omnisque, dura caro, & macra, & salsa, cochlea, purpura, murices, vinum austerum, &c.

De ci-

76 PRACTICÆ GENERALIS

De cibarijs velocis coctionis,

Cap. 20.

Concoctu facilia sunt, quæ facile alterantur, cuiusmodi sunt panis optimè præparatus, caro gallinarum, perdicū, phasianorū, attagenū, cornuicū, turdorū, merularū, columbarū: hepata pullorū, anserū, gallorū testes, bulbi bis elixi, alæ pulorum, anserum, & auium pinguium, caro auium montanarum, vitulina, hœdina, agnina, oua mollia, vinum dulce, &c.

De cibarijs tardæ digestionis,

Cap. 21.

Difficulter concoquuntur, quæ nō facile alterantur: vt caro bubula, hircina, ceruina, caprina, pecudū, pauonū, anserū, turturū, palumborū perfectorū animalium, animalium testa obrectorū, ventres auium, hepata animalium, caseus antiquus, oua dura, oryza, lupini, lentes, milium, castaneæ, glandes, palmulæ, ūliqua, bulbus, pisces duriores, cochleæ, intestina animalium, extrema animalium, cor, lac acetosū, triticū elixum, fabæ, sesamum, fructus immaturi, rapa, pastinaca, olera omnia, præter lactucam, radices olerum, vinum nouum, crassum, & immaturum, &c.

De cibarijs

De cibarijs multarum superfluitatum, et non habentibus superfluitates, Cap. 22.

Cibaria multarum superfluitatum sunt, caro pullorū, anserū præter alas, interiora omnium animalium, cerebra omnium animalium, aues palustres, lacustres, fabæ virides, ciceres recentes, caro animalis lactantis, omnis caro domestica, pisces sordidarum aquarum. E contra verò superfluitatibus carent, alæ auium, pedes quadrupedum, genua quadrupedum, caro animalium syluestrium, &c.

De cibis multi nutrimenti, Cap. 23.

Porrò cibi multi nutrimenti sunt. caro bubula, alæ pullorū anserum, cerebella, medullæ, interiora auium, ventriculi auium, pisces crassæ substantiæ, fabæ, ciceres, lentes, dactyli, glandes, castaneæ, rapa, panis similaceus, passulæ, ficus, lac recens, vinum rubrum, crassum, dulce, &c.

De cibis pauci nutrimenti, Cap. 24.

Parum autem nutriunt panis hordeaceus, caro antiqua, pedes, vêtres, intestina, aures, pinguedo, pulmo, milium, panicum, oliuæ, nuces, auella-

78 PRACTICA GENERALIS

auellana, caules, cappares, pisces, cucurbita, mora, poma, pruna, mala, punica, aurantia, olera omnia, beta, acetosa, portulaca, fabae recentes, raphanus, sinapi, nasturtium, pastinaca, cepa, allium, porrum, medulla, panis loti, amyllum, &c.

De cibis laxantibus, Cap. 25.

Cibaria laxantia sunt omnia aquosa, humida, iurulenta, viscida, lenta, falsa, & nitrosa: cuiusmodi sunt, panis fermentatus, & multi furfuris, decoctum caulium, lentium, galli antiqui, piscium testa insectorum, cochlearum, oliua, serum lactis, caro paruorum animalium, brassica, beta, atriplex, malua, lactuca, portulaca, asparagus, lapathum, ficus virides, cerasia, cucurbita, pepo, melopepo, vuae recentes, passulae dulces, nuxes humida, mora ante cibum, pruna malsa, oxymel, vinum dulce, mustum, &c.

De cibis astringentibus, Cap. 26.

Astringunt quaecumque austera & acerbata sunt edulia, & terrena et sicca: ut panis sine fermento, siligineus, simlaccus, bis coctus, oryza, panicum, milium, alica, grana myrthi, lenticula, concha, pyra, poma austera, mala punica, palmule austera, sorba, mora rubi, fructus spinæ albæ, castaneæ, glandes, brassica bis cocta, plantago, in-tybus,

tybus, oua dura, caro assata, caro leporis, bubula caprina, aues minutæ, merula, palūbus, grus, iecur, caseus antiquus, defrutum, passum, purpura, murices, vinum auferum, &c.

De cibis. vrinam mouentibus,

Cap. 27.

Cibaria vrinam mouētia sunt calida & tenui-
um partiū: vt apiū, petroselinū, anethū, ruta,
mentha, ocimū, anisum, hyssopū, coriandrū, eru-
ca, foeniculū, nasturtiū, asparag⁹, nepeta, thymū,
fatureia, lapsana, pastinaca, radícula, fiser, cæpa,
capparis, sinapi, piper, nuclei pini, caro leporina
vinum tenue, &c.

De ciborum quantitate, Cap. 28.

HActen⁹ de ciborū qualitate discernimus, re-
stat nūc vt de quātitate dic am⁹. Itaq; circa
ciborū quantitatē maximē obseruādę veniunt,
ægotantis vires, morbi natura, tēpus anni, regio
ætas, & cōsuetudo, &c. Aliā enim mēsurā imbe-
cilles, aliā robustiores exigūt. Imbecilliorib; nā-
que plenior, robustiorib; verō tenuior vict⁹ ad-
ministrād⁹ est. Aliā p̄terea morb⁹ acut⁹, ac celer,
aliā diuturn⁹ exposcit. Quātō. n. acutior est mor-
bus, tantō vigori vicinior, ideoq; minus cibi in
eo exhibēdū. Vnde Hipp. aphorif. i. Vbi morb⁹ p-
acutus

aph. 7.

80 PRACTICÆ GENERALIS

„ acutus est, statim extremos habet labores, & ex-
Vitæ tra. „ tremè tenuissimo victu vtendum est. Victū autē
tenuem vocat, qui fit per ptisanæ succum: simpli-
 citer tenuissimum verò, qui fit per mulsam, tum
 aquam: extreme tenuissimum, qui per solam in-
 ediam absoluitur. Porro morbus diurnus tenuē
 victum respuit: victus enim tenuis in morbis lō-
 gis semper periculosus. Quare in his pleniori vi-
 ctu vtendum, vt æger perdurare queat. Ceterum
 tempus quodq; anni aliquam mensuram præscri-
 bere videtur, præsertim in sanis. Siquidem hye-
 me & veris initio ventres natura calidissimi sunt
 „ & somni lōgissimi, quare per ea tempora alimē-
 „ ta copiosiora exhibēda. Etenim calor innatus tū
 copiosior est. Contrā verò æstate minus cibi offe-
 rēdum. Eadem quoq; ratione in regione calida,
 vel frigida, augendus, vel minuendus victus erit.
 „ 1. ap. 15. „ Quod ad ætatem attinet, & consuetudinem, pu-
 eri vberiores: adolescentes minorem: consistē-
 „ 1. ap. 13. „ tes adhuc minorem: senes minimum victum ex-
 poscunt. Consueti verò plurimum comedere v-
 beriores: cōtra in cōsueti pauciorē cibū exigunt.

De ciborum ordine, Cap. 29.

P Orro ægrotis simplex cibus conuenit, nihil
 enim deterius est, quā diuersa nutriētia simi-
 liter adiungere. Sanis verò ciborum diuersitatē
 deuiare,

deuitare, hac ætate penè impossibile est. Proinde ordinem in eis obseruare decet. Ea itaque alimenta primo loco assumenda sunt, quæ facilius concoquuntur, vt cocta descendant, & reliqua deinde coquantur. Nā si ea antecedant, quæ difficilius coquantur, ea, quæ facilius coquantur interim superata & cocta, non descendant, inferioribus nondum coctis: duæque inde sequentur noxæ: prima, quod coctum crudo miscebitur: secunda, quoniam retentum, quod iam coctum est, corrumpitur, non gubernatum à natura. Quare edulia, quæ facilioris concoctionis sunt, præcedere debent. Sunt autem facilioris concoctionis, cibaria liquida, lubrica, subtilia, humida, citò permeantia, corruptibilia, &c. Contra difficilioris concoctionis, crassa, astringentia, sicca aromatica, &c.

*Non seruant
ordinem in cibis
assumptis in
commoda.*

1.
2.

De tempore cibationis, Cap. 30.

Vo autem tempore cibandi sint ægri febrientes, indicabit nobis ipsa accessio. Aegri namque in morborum accessionibus cibandi non sunt, nisi totus paroxysmus remittatur. In continuis verò febribus, in declinatione cibandi sunt ægrotantes. Vtrum verò semel, vel saepius cibandi sint, vires id maxime ostendere possunt. Siquidem robustioribus rarius imbe-

In accessione.

In declinatione.

*Quoties sint
cibandi.*

Faciliori-

Quando.

calliorib. verò sapius cibis offerendus. Porro quā
nō febricitāt, sed diuturno aliquo morbo labo-
rāt, cōfucta hora, ac illiciēte appetitu sūt cibādi

De motu, & quiete, Cap. 31.

*Frictionum
vsg.**genera**Quando sunt ad-
hibende.*

HActenus de aēre, cibo & potu: nūc ad exer-
citiū perueniendū est. Quoniā verò agrotā-
tes ad exercitationes inepti sunt, earū loco fric-
tiones ex vsu sunt. Ha namq; terciē cōcoctionis
extremēta expellūt, membra roborant, meatus
aperiunt, calorē natiūū excitant, & ad membra
trahūt. Sunt aut frictionū varia genera, videlicet
mollis, aspera, multa, & modica. Mollis fit pal-
ma manus, aut pannis leuibus, quæ sanguinē cō-
iungit, & ipsum in membro cōtinet. Aspera verò
asperis pānis pficitur, quæ sanguinē ad exteriora
velociter trahit: vnde ad corporis nutritionē non
parū cōferre videtur. Sic modica, corpus implet,
multa verò minuit. Porro frictiones tibijs, bra-
chijs, anteriori, & posteriori parti corporis adhi-
bendæ sunt, in acutis quidē & recentib. morbis
leniter, & quidē in remissis æ, & ante cibū. Lōga
verò frictione vti, neq; in acutis morbis, neq; in-
ereseētib. cōuenit, præter quā cū phreniticis fo-
mn^o queritur. Sed vt lenata quoq; aduersa vale-
tudine rectē frictio adhibetur, sic nūq̃ adhibē-
da est febre increfcēte. Verū si fieri poterit, cū ex
toto corp^o ea vacabit, min^o certē cū ea remiserit.

Cæterum

Cæterum gestatio quoq; lōgis etiā, & inclinatis morbis aprissima est, utilisq; est & his corporib. quæ iā ex toto febre carēt, sed adhuc exerceri nō possunt, & his, quibus lentæ morborū reliquæ remanēt, neq; aliter elidūtur. Porro ex toto nūquam gestari corpus dolēs debet, siue id in toto siue in parte est, nisi tamē solis neruis dolētibus, neq; vnquā in recenti febre, sed in remissione eius. Genera aut gestationis plura sunt adhibēda, quæ sunt & pro viribus cuiusq;, & pro opibus, ne aut imbecillū hominē nimis digerant, aut hūmili obsint. Gestationum lenissima est naui, vel in portu, vel in flumine, vehementior in alto mari naui, vel lectica, aut scāno, acrior vehiculo. Atq; hæc ipsa, & intēdi, & leniri possunt. Et lenia quidem genera exercitationis infirmis cōueniunt. Valentiora verò his, qui grauiū morborū initia sic sentiunt, vt adhuc febre vacent. Quod & in tæbe, & in stomachi vitijs, & hydrope, & interdum morbo regio fit. Aut vbi quidā morbi, qualis cōmitialis, qualis insania est, sine febre, quāuis diu manent. Porro quies in sanis vbi immo dica fuerit, maximo detrimento existit. Cruditates. n. parit, & vitiosorū humorū in corpore copiam procreat. Est autem vbi & quietis conueniens esse possit vsus, tum videlicet vbi ex multa motione caput defatigatum fuerit.

Gestatio.
quib. morbis

Genera.

Quies.
incommoda.

vsus.

*Somni
Causa.**Causa finalis.**Somni
dormi-
tio.**Inmoderate
dormi-
tio.**Tempus.*

Somnus est reditus spiritus animalis ab instrumentis sensuum, & motus ad principium, unde sensus & motus priuatur. Fit autem somnus, quando vapores à cibis, & potionibus resoluti petunt cerebrum, & inuenientes ipsum frigidum, & densum, congelantur, & condensantur, veluti vapores ab aqua inferius eleuati ad partem superiorem, & graues facti descendunt, obstruuntq; meatus sensuum, vt spiritus ad cerebrum à suis instrumentis retrahantur. Quòd si fuerit moderatus, naturales facultates reficit omnes, corporis interna calefacit, unde ciborum perficitur concoctio, cordis vias humectat, & lassitudines inhihet: animali enim facultati affert augmentum, & humoribus obuians temperatis, calefacit & humectat, corpus impinguat, dolores excutit, & mentem exhilarat: Immoderatus verò, et quidem prolixior, virtutes animales concitat, & dissoluit, vias laxat, corpus refrigerat & humectat, phlegma auget, calorem debilitat, naturalem corporis calorem corrumpit, motus debilitat. Quòd si parcior fuerit iusto, confurgit imbecillitas, infirmitas digestionis, corporis siccitas, calor dissoluitur. Porro somnus conuenit post descensum cibi à ventriculo, & quidem nocturnus ob frigus, calorem ad

interna

interna propellens, & ob cessationem à muneribus. Diurnus enim, insuetis maximè, ad plures præparat morbos. Celebrandus autem est lecto suavi, ac molli, corpore, ut decet, contexto, ut membra æstate non æstuant, & hyeme non algeant, nec sudorem incurrant, & capite elato, non supinè, sed primò quidem in dextrum latus, deinde in sinistrum decubant. Ceterum vigilia corporis humiditatem exiccat, unde in catharris præcipitur, adurit humores, ægritudines facit acutas, spiritum resoluit, concoctionem impedit, & tum cibi, tum potionis cruditatem efficit.

*Long.**Scabily.**Vigilia.*

De repletione, & inanitione,

Cap. 33.

Absoluto somno, & vigilia, ad repletionem, & inanitionem siue euacuationem progrediendum erit. Est autem abundantia duplex, aut cibi, aut humorum. Cibi abundantia satietas appeletur: humorum verò omnium, plenitudo: unius verò humoris, cacoymia nominatur. Plenitudo rursus duplex existit, vel ad vasa, vel ad virtutem. Ad virtutem, ubi videlicet tanta est humorum multitudo, quæ virtutem grauat. Ad vasa verò, ubi tanta est sanguinis copia, ut vasa distendantur. Porro inanitionis varia genera sunt. Vacuamus enim interdum per venæ sectionem,

*Abundantia
cibi
humorum**Plenitudo
ad vasa.**Vacuatio
per venæ
sectionem.*

36 PRACTICÆ GENERALIS

nem, nunc per scarificationē, subinde per medicamentū purgans, & per sudores, &c. de quibus nunc ordine dicemus, à sanguinis missione orsi.

De venæ sectione, Cap. 34.

Cuius cor.
Veniat.
frangit.
Cuius obest.
gignit.
Cuius vena fit
secunda.

Venæ sectio conuenit plethoricis, sanguineis, ætate florētibus, temperaturis calidis & humidis, carnosis, robustis, consuetis, tempore veris, & autumnī, tēpore marutino, hora remissionis febris, dolore vehementi, inflammatione, febribus ardētibus. Nō conuenit autē inanitis, cholericis, frigidis, macillētis, pueris, senibus, debilibus, insuetis, tempore æstiuo, hyberno, nisi opus fuerit: itē crudis & ebrijs venæ incisio obest. Porro in sanguine mittēdo cōsiderandū est, quæ vena sit secanda. Interna autē brachij vena, quam multi basilicā nominant, ijs secanda erit, quibus partes collo inferiores patiuntur. Exterior verò, quam humeralē, & cephalicā appellant, ijs aperienda venit, quibus caput aliqua affectione laborat. Media, quā cōmunem, nigrā, & medianā nuncupāt, tū secanda erit, vbi dictarū venarum aliqua obscurior fuerit. Sic in manu vena pollicis, in capitis morbis: minimi verò digiti, quā sartarellā vocāt, in hepatis, vel lienis passionibus, secāda est. In pedibus interdū saphena, vel mallooli vena inciditur, præsertim in vteri, viscerūque affectibus, vel mensibus, & hæmorrhoidibus re-

tentis.

tentis. Caterum venæ sectio è directo partis la- *Loco.*
borantis semper faciēda est. Quantitas verò pro *Entas.*
ætatis, & virium ratione detrahenda.

De scarificatione, Cap. 35.

Scarificatio est incisio, quæ fit scalpello in lon- *In ab. affe:*
gū. Per scarificationem. n. euacuamus, quādo *th. sit ad:*
humores sunt cōpacti, & inuiscati in aliqua cor- *lib. m. d.*
poris parte, vel partes corporis phlegmone, aut *quo loco.*
dolore vexatæ, aut fluxione affectæ. Prodest autē
scarificatio, & oculis diuturna fluxione laboran-
tibus, tum capitis passionibus, quicq; thoraci dor-
soq; eneniūt, collo, vel dorso adhibita: Sub mē-
to verò facta, dentibus, faciei & gutturi cōuenit.
Eadē ratione super renes adhibere, apostematib:
coxarū, scabiei, podagræ, hæmorrhoidibus, ele-
phantiæ, vērositatib. matricis, profunt. Sic quoq;
crurū scarificatio, sanguinē mundificat, mēstrua
prouocat. Porro cuiq; parti corporis cucurbitulæ
fuerint affixæ, huius sanguinē eliciūt, exugūt, atq;
euacuāt. Estq; hæc cucurbitularū adhibitio, non
tam periculosa, quàm si venæ sectio tentetur.

De purgatione, Cap. 36.

Purgatio est humorum. qui sua qualitate mo- *Euac.*
lestant, euacuatio. Conuenit autē hæc ijs, qui *El. con.*
malis humorib. sunt referti, ijsq; nō crudis, sed *remiat.*

28 PRACTICÆ GENERALIS

concoctis: item robustis, & assuetis, tempore matutino, & hora remissionis morbi. E contra verò minimè ex usu est sanis, præsertim quibus cacochymia nulla adest: item imbecillis, macillētis, siccis, senibus, pueris, mulieribus gravidis, nō assuetis pinguib⁹, dysentericis, diarrhæa laborātibus, cōuulsis, inanitis, delinquētib⁹. sepe animo, mulieribus menstruatis, balneatoribus, & fossoribus, &c. Porro quibus ventriculus, aut caua hepatis pars laborat, aut materia ad superiora vergit, per vomitū purgādi sunt: quib⁹ verò intestina, aut caua hepatis pars afficitur, aut materia ad inferiora vergit, per secessum euacuandi sunt. Sic cerebrum per nares, palatum, & oculos commodè euacuatur: pulmo, per tussim: renes, per urinam: uterus, per pessos, & clysteres. Cauendę præterea purgationes in morborum principio sunt, nisi materia turgat: sic quoque in statu, siue vigore morbi à medicamētis purgantibus abstinēdum. Tempus autem conueniens in declinatione est. Cæterum quantitas pro ætatis & virium ratione facienda est. Qualitas verò ab ipsius humoris natura desumenda est. Si quidem si bilis, medicamentis purgantibus bilem: si pituita, pituitam purgantibus: si melancholia, atram bilem purgantibus, euacuanda erit, &c.

*Quib⁹ non
conueniat.*

Leuig.

Temp⁹.

Cæter.

Qualitas.

LIBER III.

De sudore, Cap. 37.

Sudor prouocatur ijs potissimum, quibus humor aliquis noxius circa interiora corporis versatur, vt in febribus, & praesertim pestilentia-
libus, hydropse, &c. Prouocatur autem varijs modis: aut balneo sicco, aut fomento aliquo calori-
fico, aut medicamentis sudorem euacuantibus.
Cauendus autem immodicus est, quoniam vi-
res deijcit.

*Quib. sit obli-
vis.*

*Quib. pro-
uocetur.*

De balneo, Cap. 38.

Balneorum usus non omnibus conuenit. Si-
quidem balnea nocent macilentis, gracili-
bus, debilibus, resolubilibus, sanis, febrienti-
bus biliosis, crudis, plenis, fatigatis, non purga-
tis, senibus valde siccis, pueris interdum. E con-
tra vero conueniunt pinguibus, phlegmaticis,
crassis, robustis, purgatis, consistentibus, & foe-
minis. Tempus vero aptum ver, & autumnus, &
principium aestatis est. maturinum, vel vesper-
tinum, concoctione transacta. Cauendus autem
usus immoderatus. Quoniam corpus debilitat,
resoluit, syncopen inducit, sitim excitat, febrem
inducit. Ingressuri alui prius & vesicae excremen-
ta deponant, pannisque se muniant. In ipso bal-
neo vero neque comedant, neque dormiant.
Egressuri autem pannis se cooperiant, in lecto

*Quib. no-
ceant.*

Quib. non.

Tempus.

*Qua sunt obli-
seruanda in
usu balnei.*

opisculantur, tibijs ulceratis, scabiei & pruriti conferunt. Cuprea podagricis, nephriticis, asthmaticis, articulorum doloribus, viceribusq; malignis auxiliatur. Ferrea deniq; in frigidat, excitant, astringunt, ventriculo, lieni, nec non fluxioni menstruum, & hemorrhoidum conferunt. Sic & composita pro cuiusq; vincetis qualitatis ratione agunt.

De animi affectibus, Cap. 39.

RELiquum est, ut ad animi affectus trāseamus, à quibus non parum ægrotantes læduntur. Multi enim ob animi passiones commoriuntur. Caueant itaq; sibi quàm maximè ab ira, furore, tristitia, timore, & solitudine: *Ira* namque corpus inflamat, calorem nativum ad exteriora effundit. *Mœstitia* verò parit melancholiam, corpus & ossa exiccat. In *timore* calor omnis & spiritus ad intima cordis penetralia cōfugiunt, quo fit, ut partes algeant, corpus palleſcat, nervi lædantur, viresq; omnes deiciantur. Præ nimio *gaudio* multos expirasse legimus pusillanimes; dilatato nimirum corde, forasque repentè effuso, dissipatoque spiritu. Sed hæc de animi affectibus sufficiant. *Mœstitia*
Timor.
Gaudium.

PRA-



PRACTICAE GENERALIS

LIBER IV.

ARGUMENTVM.

De remediorum simplicium qualitate, quantitate, loco, & tempore inueniendo, potissimum tractat. Eius capita hæc sunt.

- 97. De remediorum qualitate, Cap. 1.
- 98. De medicamentis temperatis, Cap. 2.
- 99. De medicamentis calidis in gradu primo, Cap. 3.
- 99. De medicamētis calidis in secūdo, Cap. 4.
- 100. De medicamētis calidis in tertio, Cap. 5.
- 102. De medicamētis calidis in quarto, Cap. 6.
- 103. De medicamētis frigidis in gradu primo, Cap. 7.
- 103. De medicamētis frigidis in secūdo, Cap. 8.

De medicamētis frigidis in tertio, Cap. 9.	104.
De medicamētis frigidis in quarto, Ca. 10.	104.
De medicamētis succis in primo, Cap. 11.	105.
De medicamētis siccis in secundo, Cap. 12.	105.
De medicamētis siccis in tertio, Cap. 13.	107.
De medicamētis siccis in quarto, Cap. 14.	109.
De medicamētis humidis in primo, Ca. 15.	110.
De medicamētis humidis in secūdo, Ca. 16.	110.
De medicamētis humidis in tertio, Ca. 17.	111.
De medicamētis tenuis essentiæ, Cap. 18.	111.
De medicamētis crassæ essentiæ, Cap. 19.	113.
De medicamētis dissimilariū partiū, Ca. 20.	115.
De medicamētis acribus, Cap. 21.	116.
De medicamētis adstringentibus, Cap. 22.	120.
De medicamētis cōstringentibus, Cap. 23.	125.
De medicamētis aperientibus, Cap. 24.	126.
De medicamētis discutientibus, Cap. 25.	128.
De medicamētis cōdensantibus, Cap. 26.	131.
De medicamētis rarefacientibus, Cap. 27.	132.

De:

132. De medicamentis emollientibus, Cap. 28.
 134. De medicamentis indurantibus, Cap. 29.
 134. De medicamentis laxantibus, Cap. 30.
 135. De medicamentis abstergentibus, Cap. 31.
 139. De medicamentis adurentibus, Cap. 32.
 140. De medicamentis attrahentibus, Cap. 33.
 141. De medicamentis cientibus, Cap. 34.
 145. De medicamentis deleterijs, Cap. 35.
 148. De alexiterijs, Cap. 36.
 151. De pus mouentibus, Cap. 37.
 152. De emplasticis, Cap. 38.
 153. De medicam. obstructione liberantib. Cap. 39.
 154. De epuloticis, Cap. 40.
 156. De exedentibus, Cap. 41.
 157. De expurgantibus, Cap. 42.
 161. De exterminantibus, Cap. 43.
 163. De incrassantibus, Cap. 44.
 163. De medicam. flatu discutientib. Cap. 45.
 164. De extrahentibus, Cap. 46.

De glutinantibus,	Cap. 47.	165.
De incidentibus,	Cap. 48.	167.
De repellentibus,	Cap. 49.	169.
De roborantibus,	Cap. 50.	170.
De sarcoticis,	Cap. 51.	172.
De sistendi vim habentibus,	Cap. 52.	163.
De vrimam cientibus,	Cap. 53.	176.
De menstrua prouocantibus,	Cap. 54.	179.
De sistentibus menstrua,	Cap. 55.	181.
De sudorem cientibus,	Cap. 56.	182.
De calculum frangentibus,	Cap. 57.	183.
De lac generantibus,	Cap. 58.	184.
De medicamentis expectorantib.	Cap. 59.	184.
De tuſſim sedantibus,	Cap. 60.	185.
De dolorem sedantibus,	Cap. 61.	186.
De soporiferis,	Cap. 62.	188.
De venereis,	Cap. 63.	189.
De spermaticis,	Cap. 64.	190.
De medicam. ambuſtis medētib.	Cap. 65.	191.

De

191. De medicamentis digestiuis, Cap. 66.
 192. De medicamentis bilem flauam coquen-
 tibus, Cap. 67.
 195. De medicamētis pituitā coquētib. Ca. 68.
 200. De medicamentis atram. bilem cōcoquen-
 tibus, Cap. 69.
 201. De seminibus calidis maioribus & mino-
 ribus, Cap. 70.
 201. De seminibus frigidis maioribus & mi-
 noribus, Cap. 71.
 202. De medicamentis purgantibus, Cap. 72.
 203. De medicamentis bilem flauam purganti-
 bus, Cap. 73.
 206. De medicamentis pituitam purgantibus,
 Cap. 74. (bus. Cap. 75.
 211. De medicamentis atram. bilem purganti-
 213. De remediorum quantitate, Cap. 76.
 215. De remediorum loco, Cap. 77.
 216. De remediorum tempore, Cap. 78.
 PRA-

PRACTICAE GENERALIS

LIBER IV.

De remediorum qualitate. Cap. 1.

Vistus ratione absoluta, ad medicamentorum tractationem perueniendum est: quæ quidem in eorum qualitate, quantitate, loco, & tempore consistit. Verum de medicamentorum qualitate prius agendum est. Equidem medicamentorum qualitas ab ipsius morbi natura, eiusque causa desumenda est. *Materia qd. huiusmodi potest fieri.* Auspicari enim perpetuo oportet ab indicatione, q̄ ab affectu, cui mederi paramus, accipitur, & demum examinare, ac discernere, an causa, quæ affectum excitauit, iam deserit, an ipsum quoque nunc tum augeat, tum faciat: his in quæ semper comparandum est remedium, quod eis sit contrarium. Sic ergo morbus calidus, postulat remedium frigidum: frigidus, calidum: humidus, siccum: siccus, humidum. Obstructio præterea requirit medicamentum, facultatem habens aperientem: plenitudo, euacuantem: raritas, densantem: densitas, rarefacientem: astrictio, dilatantem: dilatatio, astringentem. Ad eundem modum, magnitudo aucta efflagitat remedium, quod minuit: imminuta, quod augeat.

G , Nume-

98 PRACTICÆ GENERALIS

Numerus quoque abundans, desiderat remedium facultatem habens auferentem: deficientem verò adijcientem. Sic etiam vlcus sordidum postulat remedium facultatem habens detergentem: cauum replentem: planū, epuloticū, &c. Quod ad morborum causas attinet, humor quidem crassius poscit remedium, facultatem habens attenuantem: tenuis, in crassiantem: lentus, incidentem: viscosus, abstergentem. Sic quoque sanguis abundans phlebotomiam exigat: bilis, medicamentum, facultatem habens purgandi bilem: pituita, medicamentum, quod pituitam: atra bilis, quod in melancholiam purgat, &c. Verū vt Medicinæ studiosi vberiore materiam in promptu habeāt, omnis generis medicamentorū qualitates enumerandas quoque esse putauimus, initium à temperatis sumētes.

De medicamentis temperatis,

Cap. 2.

Temperatum medicamentum est, quod similem elementorum temperaturam, eucrato, hoc est temperato hominis corpori obinet, ita vt tale medicamentum temperatum, neque calefaciat, neque refrigeret, neque humectet, neque exiccet, sed quemadmodum ipsum accepit, conseruet: cuiusmodi sunt adianthū, asparagus, argenti:

*Causa mor-
bonum glori-
andis in regat.*

anti spuma, argenti recemētum, cadmia cera,
 ri cortex, eryngiū, faba, glycyrrhiza, graminis
 dix, lētiscus, lini semē, lotus fatiua, lyciū, lens,
 astiche, myxa, oleū dulce, pinei nuclei, sesamū
 tra chia, & samia, trichomanes, Zizipha, &c.

De medicamentis calidis in gradu primo.

Cap. 3.

Medicamentum primi ordinis calidum est,
quod nos excalefacit, non tamen euidenter,
 absynthiū, aloē, agaricum, althea, amygdala
 leia, beta, brassica, buglossum, cassuta, casta-
 a, chamamelum, eupatorium, flores populī
 grā, ladanum, lini semen, lithospermon, ma-
 bathrū, nuces virides, oryza, orob⁹, propolis,
 inquefoliū, saccharū, serum lactis, sesamum,
 canardi, viū maturā, vinū nouū seu mustum.

De medicamentis calidis in secundo,

Cap. 4.

Secundi à medio recessus medicamenta sunt,
 quæ manifeste & euidenter calefacere pos-
 sūt: vt sunt,

ambaium
 ethum viride
 ium

Arthemisia
 Balsamum. Bitumen
 Bupthalmus

G 2

Ca.

100 PRACTICÆ GENERALIS

Calamus odoratus	Melissa
Capparis. Carduus	Myrrha
Chamæpitys	Myrrhis
Crocus	Nux moschata
Elateriū. Elelisphacus	Nuces ficæ
Eruū. Elaphoboseum	Ocymum. Pancratium
Ficus	Peucedanum
Fœnumgræcum	Pistacia
Galbanum	Polium
Lotus sylvestris	Pix arida
Lychnis coronaria	Rapa. Radix rhodia
Marrubium	Sal. Scandix. Scilla
Mastix.	Sifer
Mali citri semen	Vinum
Manna thuris	Thus. Teucrium
Mel	Zedoaria.

De medicamentis calidis in tertio.

Cap. 5.

Tertia classi adscribuntur medicamenta calida, quæ in suo genere vehementer citra summum fâmen excalfaciunt: cuiusmodi sunt

Abrotanum	Acori radix
Amani. Anemum	Anisum. Apocynum
Anacardium	Asphodelus
Anebum vîsum	Agnus
Asarum. Arisarum	Arum

Amo


Amomum	Lolium
Careum	Mali citri cortex
Carthamus. Castoreū	Meunr
Cassia odorata	Moly
Calamintha. Cedrus	Mentha
Cinnamomum	Mentastrum
Conyza.	Moschus.
Chelidoniumma.	Nepeta. Nigella
Chamadrys.	Origanum. Ononis
Chamaena	Opopanax.
Cuminum	Paronychia
Carpesium	Petroselinum.
Carnabadium.	Periclymenum
Clinopodium	Piper, Porri capitatū
Colocynthis	Ptarmice.
Distānus. Daphnoides	Pseudodictamnus
Dracunculus	Pulegium
Elleborus vterque	Raphanus
Epithymum. Eruca	Ruta hortensis
Foeniculum. Folium	Sabina.
Galanga. Galbanum	Scorodoprasum
Gariophyllon	Sāpfuchū. Scorpioides
Helenium	Sisymbriū. Scolymos
Hyslopum	Serpillum. Sefeli
Iris	Smyrnium
Iuniperus	Trifolium
Leontopetalum	Thlaspi
Leucas	Thymbra

102 PRACTICÆ GENERALIS

Thymus	Triflago
Tragium	Veratrum album, &c
Tragoricanum	Virex (nigrum)
Tripolium	Vinum verus.

De medicamentis calidis in quarto gradu, Cap. 6.

Medicamenta calida in quarta sede sunt, quoad exalfacere possunt, vt escharam. mo-
liantur, & vrant, vt

Adarces	Lactaria
Ampeloprasen	Lanaria herba
Allium	Laureola
 Calx	Lepidium
Cedrinus liquor	Melanteria
Cepa	Misy
Chalcitis	Nasturtium
Chalcanthum	Ochra
Chelidonium	Pityusa
minus	Porru agreste
Clematis altera	Pforicum
Cinis sarmentitius	Pulegium
Cinis ficulneus	Pyrethrum
Costus	Ranunculus
Euphorbium	Ruta sylvestris
Fex vsta	Sandaracha
Granum cnidium	Sardonia herba

inapi
ory
strutium

Testæ marinæ cre-
mata
Tithymalus.

De medicamentis frigidis in primo,

Cap. 7.

Medicamēta primi ordinis frigida sunt, quæ
nos refrigerant, non tamen euidenter, ut

Atriplex	Myrtus
Acini vūæ	Orobanche
Cotonea	Oxyphoenica
Citrei caro	Pruna
Gramen	Pira
Hordeum	Rhamnus
Malua	Rosa
Milium	Viola.

De medicamentis frigidis in secūdo,

Cap. 8.

Medicamenta secundi recessus frigida sunt,
quæ manifeste & euidenter refrigerare va-
lent: cuiusmodi sunt

Acacia	Cucumis
Alga murina	Damascena pruna
Blitum	Endiuia
Condrylla	Galla. Gingidium
Cucurbita	Hyacinth ⁹ . Hypocistis

104 PRÆCTICÆ GENERALIS

Lactuca. Lens palu-	Plantago
fris*	Polygonum
Mala persica	Potamogeton
Mala armēniaca	Pulicaris herba
Mala granata	Pisillum
Pepon	Solanum hortense.

De medicamentis frigidis in tertio.

Cap. 9.

Medicamenta tertiæ classi frigida adscribuntur omnia ea, quæ vehementer citra summum tamen refrigerant, ut sunt

Caphura	Sedum maius
Papauer sativum	Sedum minus
Portulaca	Solanum hortenſe
Solanū somniferum	Sandali, &c.

De medicamentis frigidis in quarto.

Cap. 10.

In quarta sede frigida collocantur, quæ vehementer refrigerant, adeo ut extinguant, cuiusmodi sunt

Cicuta	Papauer erraticum
Dorycnium	Papaveris succus
Fungi	Hyoscyamus
Opium	Mandragora, &c.

De

*De medicamentis siccis in gradu primo.**Cap. 11.*

Porrò primi ordinis sicca medicamenta sunt, quæ nos exiccant, non tamen euidenter, sed cum aliqua rationali demonstratione: vt sunt

Alyflum	Lotus satiuæ
Anthemis	Lotus fyluestris
Arum	Manna thuris
Artemisia	Malabathrum
Beta	Myrrhis
Brassica	Myrtus
Castanea	Ocymum
Chamaeleuce	Orobanche
Crocus	Pseudodictamnus
Faba	Rhododaphnæ
Fœniculum	Saccharum
Fœnumgræcum	Solanum hortense
Hordeum	Sesamum
Hyacinthus	Thus.

*De medicamentis siccis in secundo.**Cap. 12.*

Medicamenta secundi ordinis sicca, manifestè iâ & euidenter desiccare possunt: vt sunt

Agaricus	Amomum
Alga marina	Amurca
G 5	Anethum

106 PRACTICÆ GENERALIS

Anethum	Lentes
Aphaca	Lolium
Apium montanum	Lychnis coronaria
Arthemisia	Lycium
Balsamum	Mali-citrei cortex
Balaustia	Mali-citrei semen
Bitumen	Malabathrum
Bupthalmus	Massix
Bursa pastoris	Mentha
Calamus odoratus	Mentastrum
Carduus	Mel
Capparis	Milium
Condrylla	Meum
Cotonea	Myrrha
Cassutha	Nardum Indicum
Cinnamomū	Nardum Celticum
Dictamnū	Nux moschata
creticum	Orobis
Elaphoboscū	Opopanax
Elaterium	Oryza
Elelisphacus	Petroselinum
Eruum	Phu
Folium	Pistacia
Gingidium	Pira
Galbanum	Pix liquida
Hypocisthis	Pix sicca
Iris	Plantago
Lepidium	Polygonumū

Radix

Radix rhodia	Scandix
Raphanus	Scorpioides
Rorismarinus	Scolymos
Salvia	Spica nardi, &c.

*De medicamentis siccis in tertio
gradu, Cap. 13.*

Medicamēta tertij ordinis sicca sunt ea omnia, quæ vehementer citra summum tamen resiccare possunt: ex quorum numero sunt

Abrotonum	Castoreum
Ablyanthium	Calamintha
Acorus	Carnabadium
Aloe	Caryophyllum
Alumen	Cedrus
Animi	Chamæleon niger
Anethum	Chamapitys
Anisum	Chamadrys
Acetum	Chelidonium
Acacia	maius
Apium	Clinopodium
Asarum	Cinis farnen-
Apocynum	titius
Asphodelus	Cinnamomum
Astragalus	Cuminum
Carum	Coriandrum
Cassia odorata	Cophura

Conyza

108 PRACTICÆ GENERALIS

Conyza	Petroselinum
Cucumis fyl.	Ptarmice
Epithymum	Porrum capitatum
Eruca	Pyrethrum
Galla	Quinquefo-
Galbanum	lium
Hyslopus	Ruta
Irio	Rhuobsoniorum
Iuniperus	Sal
Leontopeta-	Sabina
lum	Sanguis draco-
Leucacantha	nis
Leucas	Sampfuchum
Marrubium	Scorodoprasum
Moly	Serpyllum
Macer	Sesamoides ma.
Moschus	Sesamoides min.
Milium	Seseli
Myrtus	Sisymbrium
Nepeta	Smyrnum
Nigella	Sphondylium
Olus atrum	Stachys
Origanum	Teucrium
Paronychia	Thlaspi
Periclyntenu	Thymbra
Peucedanum	Thymus
Piper	Trifolium
Polium	Tragoriganum

Triflago

Triflago

Veratrum nigrum

Veratrum album

Vitex.

*De medicamentis siccis in quarto.**Cap. 14.*

IN quarta classe nec sicca, nec humida collocā-
tur medicamenta, quum patientes qualitates
sint: proinde ex se summum hoc opus non at-
tentant, neque aggrediuntur, nisi in igni calore,
aut frigore adiuvantur, alioqui sola patiendi fa-
cultate contentæ. Quapropter in tertia classe
siccum citra additum calorem vim suam exe-
quitur. Possunt tamen ad quartum ordinem sic-
ca referri

Adarces

Laureola

Allium

Melantheria

Calk

Misy

Cedrinus liquor

Nasturtium

Chalcitis

Ochra

Chalcanthum

Pityusa

Chelidonium

Pforicum

minus

Pulegium

Clematis altera

Ranunculus

Cinis ficulneus

Ruta sylvestris

Euphorbium

Sandaracha

Fæx vsta

Sardonias herba

Lanaria herba

Sinapi

Sory

110 PRACTICÆ GENERALIS

Sory

Tithi, malus, &c.

Testa marina cremata

De medicamentis humidis in primo,

Cap. 15.

CÆterum primi ordinis medicamenta humectantia sunt, quæ nos humectare, non tamen euidenter possunt: ut sunt

Buglossum	Rapa
Citricaro	Saccharum
Glycyrrhiza	Satyrion
Intybum	Sesamum
Malua	Helxine, &c.

De medicamentis humidis in secundo,

Cap. 16.

Secundi ordinis humida sunt, quæ manifestè & euidenter humectare possunt, ut

Attriplex	Pruna Damascena
Blitum	Pepones
Cucurbita	Perfica
Cucumis	Portulaca
Lactuca	Potamogetum
Lens palustris	Tamarindi
Melones	Viola
Mala armenica	Vua matura, &c.

De

De medicamentis humidis in tertio,

Cap. 17.

Tertio ordine humectât ea omnia, quæ vehementer humectare possunt: cuiusmodi sunt, cucumis, cucurbita, lactuca succus, fungi, papaver sativum, solanum somniferum, &c.

De medicamentis tenuis essentia.

Cap. 18.

Medicamēta, quæ celeriter in tenuia solvuntur, tenuium appellantur partium. Sunt autem tenuis essentia medicamenta

Acanthus	Ascyrum
Acetum. Acorus	Asplenium
Adiantum	Bæcharis
Agaricus.	Botrys
Ammi	Calamus odoratus
Anethum	Capros
Anthemis.	Carpesium
Arctium	Casia
Argemone	Castoreum
Aparine	Cinnamomū
Apium	Circea
Aristolochia rotunda	Clynopodium
Arthemisia	Crocus
Asarum	Cyminum

Daucus

112 PRACTICÆ GENERALIS

Daucus	Myrrhis
Dictamnū	Myrtus
Ebenus	Napum
Elaterium	Nepeta
Epithymum	Nasturtium
Erica	Nigella
Eryngium	Ocymum
Eupatorium	Onobrychis
Euphorbium	Origanum
Ficus	Paronychia
Geranium	Parthenium
Gramen	Petroselinum
Harundo	Peucedanum
Hypericum	Pæonia
Hysſopus	Phalangium
Iasminum	Phalaris
Iris	Piper
Iuniperus	Pistacia
Iuncus odoratus	Polemonium
Ladanum	Populus nigra
Leucoium	Propolis
Ligusticum	Pseudodicta-
Macer	minum
Mala citria	Præmna
Malabathrum	Pulegium
Mentha	Pyrethrum
Milium	Quinquefoliū
Moly	Rhaponticum

Rhodia radix	Tamarix
Rhabarbarum	Teucrium
Sabina	Thapsia
Sagapenum	Thlapsi
Samoluchum	Thymbra
Schoefanthos	Thymus
Seseli	Tordylium
Sisymbrium	Tragium
Sium	Tragoriganum
Spartium	Veratrum
Spina alba	Vitex
Sphondylium	Vrtica
Stachys	Xyris, &c.
Sulphur	

*De medicamentis crassæ essen-
tiæ. Cap. 19.*

Medicamenta quæ in tenuia solui nequeunt,
crassarum sunt partiû: cuiusmodi sunt du-
a & viscosa: vt

Acacia	Atramentû metallicû
Alga	Auri pigmentum
Alumen	Batus
Amurca	Buccina
Arbutus	Cacalia
Argentispuma	Cafeus
Arum	Centaurium maius

H

Ca-

Cepea	Phyllitis
Cera	Picea
Cerussa	Plantago
Chalcitis	Plumbago
Chryfocolla	Plumbarius lapis
Conchula Indica	Plumbum elotum
Cucumis	Plumbum vftum
Ephemerum	Pompholyx
Fax	Populus alba
Galla	Potamogetum
Glaucium	Pforicum
Hypecoon	Radix Idea
Hypociftis	Rhaponticum
Lentiscus	Recrementum ferri
Ligusticum	Rubrica Synopica
Lycium	Rubrica fabrilis
Lyfimachia	Sal
Macer	Sefamum
Melanteria	Sori
Mefpila	Sonchus
Mify	Spina Arabica
Myagrūm	Squama æris
Myrtus	Storchis
Nitrum	Terra lemnia
Ochra	Terra erethria
Paliurus	Terra Samia
Palma	Terra Selinuffia
Papaueris liquor	Testa marina

Tubera

Tubera
Thuris fuligo

Thuris cortex
Viscum.

*De medicamentis dissimilariū par-
tium, Cap. 20.*

Dissimilarem essentiā habent,

Absynthium	Cinis farment. vitis
Acacia	Cinnabaris
Acerum	Coriandrum
Æs crematum	Cratægogonos
Agaricum	Cupressus
Aloe	Cyperus
Anchusa	Cytisus
Aspalathus	Diphryges
Aster Atticus	Dracunculus maior
Alga	Dryopteris
Atramentum futuriū	Ephemerum
Batus	Fax
Brassica	Filix
Bulbus	Folium
Calamus odoratus	Fumaria
Capnos	Gingidium
Capparis	Glaucium
Centaurium maius	Glans vnguentaria
Centaurium minus	Granum tinctorum
Chalcitis	Halimos
Chysoconse	Hedera

H 2 Isatis

116 PRACTICÆ GENERALIS

Ifatis fatiua	Pforicum
Ifopyron	Rha
Lapis phrygius	Rosa
Lapis gagates	Rubia
Lapis ostracites	Rumex
Ligustrum	Ruscus
Lycium	Scordium
Macer	Senecio
Mala citria	Sertula campana
Malabathrum	Sideritis
Melilotum	Sonchus
Morus	Stęchas
Myrtus	Symphytum petrę-
Mastix	um
Nardus	Terra cimolia
Oxyfchenus iuncus	Terra pignitis
Paliurus	Tribulus
Pæonia	Tubera
Phu	Umbilicus Veneris
Pira	Viscum
Plantago	Vitis alba
Polygonaton	Vitis nigra
Populus alba	Vlmus, &c.

De medicamētis acribus. Cap. 21.

Acria sunt, quæ mordicant roduntq; cum valida quadam caliditate. Sunt enim omnia acria

acria calida, prout magis vel minus acria sunt.
Itaq; tum incidunt, tum excalfaciunt, tum à vi-
cinis partibus ad sese sanguinem attrahunt: vt

Abſinthium	Capnos
Acerum	Capparis
Acorus	Cardamomum
Adarces	Caros
Aegilops	Cafia
Aerugo	Caucalis
Aēs vſtum	Centaurium maius
Allium	Chalcitis
Alypon	Chamæleon albus
Ammi	Chamepitys
Amomum	Chamædaphne
Anagyris	Chameſyce
Anchuſa	Chelidonium maius
Anemone	Chelidoinum minus
Aniſum	Chryſocome
Aqua maris	Chryſocolla
Argemone	Cinis ſarment. vitis
Aniſarum	Cinnabaris
Ariſtolochia rotunda	Coagulum
Aſarum	Conyza
Aſpalathus	Coris
Aſphodelus	Coſtus
Atramentum ſutoriū	Crocodilion
Bdellium	Cupreſſus
Calamus odoratus	Cyclaminus

118 PRACTICÆ GENERALIS

Cuminum	Iuniperus
Daphnoides	Lactaria herba
Dictamnus Cretenſis	Lanaria
Dictamnus	Lapis Phrygi ⁹
Diphryges	Lapis oſtracites
Dracunculus maior	Lapis thyites
Dracunculus minor	Lapis ſmiris
Dryopteris	Laſerpitium
Fax	Laureola
Ficus	Laurus Alexandrina
Flos æris	Leontopetalum
Fœniculum	Leucas
Folium	Lolium
Fumaria	Macer
Galion	Malacitria
Glycifiſ	Malabathron
Gramen	Mel
Granum cnidium	Melanteria
Halcyonium	Mentha
Halimos	Meon
Hauena	Moly
Hedera	Nardus
Hiberis	Nardus Gallica
Hirundinaria	Nardus montana
Hydropiper	Naſturtium
Irion	Nepeta
Iris	Oculus bouis
Iſatis ſylueſtris	Oleum Sinapinum
	Oleum

Oleum Laurinum	Radicula
Oluſatrum	Ranūculus
Ononis	Rha
Onofma	Raphanus
Onyx Indicus	Ruta
Orminum	Sabina
Pancratium	Sagapenum
Prætonia	Salis flos
Peplis	Sardonias herba
Peplos	Scandix
Periclymenum	Scilla
Petroſelinum	Scordium
Phu. Piper	Scorodopraso
Piryuſa	Serpyllum
Pix liquida	Sefeli
Pix ſicca	Sinapi
Polium	Smilax aſpera
Polygonatum	Smilax lenis
Porrum capitatum	Smyrnium
Porrum agreſte	Spongiæ
Pſeudobuniam	Sphondylion
Pſeudodiſtamnus	Spuma argenti
Pſoricum	Stachys
Ptarmice	Staphylinus
Pulegium	Staphis ſylueſtris
Pycnocomon	Teſtæ marinæ viſcæ
Pyrethrum	Thlaſpi
Quinquefolium	Thapſia
	H 4 Thyme.

120 PRACTICÆ GENERALIS

Thymelæa	Veratrum album
Thymbra	Veratrum nigrum
Thymus	Veronica
Tithymalus	Viscum
Tordylion	Vitex
Tragoriganum	Vitis alba
Tripolium	Vitis nigra
Triffago	Zingiber, &c.
Tussilago	

De medicamētis adstringentibus,

Cap. 22.

Adstringens sapor tum austeri, tum acerbi est genus: inestq; medicamentis adstringentibus facultas, & qualitas cum acris pugnatisima. Nam contrahunt, constipantq; atq; condensant substantiam nostram adstringentia, ac proinde in quamvis corporis nostri partem extrinsecus imposita fuerint, cōtinuò illam rugosam & contractam efficiunt, contrā, quam acria, quæ imposita cuti perspicuo eam exalfaciunt, atq; in molem attollunt, rubente colore, & si diutius immorentur, etiam vlcerant. Porrò adstringentia refrigerando, contrahendo, constringendoq; in illis etiam contentum repellere, ex quo liquet facultatem aduersissimam esse adstringentibus, cum acris. Sunt autem adstringentia,

Ablyn-

Adstringentia

Acria

bsinthium	Bulbus esculentus
brotonum	Bolus Armenus
cacia	Bursa pastoris
cerum	Calamus odoratus
chillea	Capnos
cinus	Capparis
es vitum	Centaurium maius
gnus	Centunculus
erugo	Ceratia
garicum	Chalcanthum
loe	Chalcitis
lumen	Chrysocome
mbrosia	Chrysocolla
nchusa	Cichorium
phace	Cinnabaris
ibutus	Cistus
argenti recrementum	Clymenum
argenti spuma	Colymbades
apalathus	Condrylla
astragalus	Corallium
alga marina	Coriandrum
atramentum futorium	Cornus
accharis	Coronopus
alaustium	Crocus modicè
eta nigra	Cupressus
raffica	Cynosbatus
britannica	Cyperus
romos	Diphryges

122 PRACTICÆ GENERALIS

Dracūculus maior	Intybus
Dryopteris	Isatis
Ebur	Isopyrum
Elatine	Iuglans
Ephemerum alterum	Iuniperi bacca
Equisetum	Ilex
Eupatorium	Labrusca
Fax vini	Ladanum
Ferula	Lapis Armenius
Filix	Lapis phrygius
Fumaria	Lapis hamatites
Galla	Lapis scissilis
Gingidium	Lapis ostracites
Glandes	Lapis magnes
Glans vnguentaria	Lapis Geodes
Glycyrrhiza	Lens
Gnaphalium	Lentiscus
Granum infectorium	Leporinus pes
Gypsum	Ligustrum
Halimos	Limonium
Hedera	Lotus arbor
Hedysarum	Lycopsis
Helxine	Lycium
Hemerocallis	Lyfimachia
Hemionitis	Malū punicū
Hieracium	Macer
Hyacinthus	Malicorium
Hypocisthis	Malū Cotoneum

ala sylvestria
 ala persica
 alabathrum
 anna thuris
 alium
 astiche
 edium
 elilotum
 elantheria
 entha
 espila
 ify
 iorus
 iuscus
 iuscus marinus
 Myrrus
 Nardus omnis
 Nymphæa
 Ochra
 Olea sylvestris
 Oleum acerbū
 Olostium
 Omphacium
 Oryza
 Oxyacantha
 Paliurus
 Palma
 Pæonia

Persea
 Personata
 Phoenix
 Phu
 Phyllitis
 Picea
 Pinus
 Pirus sylvestris
 Plantago
 Plumbarius lapis
 Plumbum elotum
 Polygonatum
 Polygonum
 Polypodium
 Portulaca
 Potamogeton
 Pruna sylvestria
 Psoricum
 Punica mala
 Quercus
 Radix Idea
 Radix Rhodia
 Recremētum plumbi
 Recrementum argen-
 ti
 Rhaponticum
 Rhus, Rosæ
 Rubia

Rubri-

124 PRACTICÆ GENERALIS

Rubrica Sinopica	Symphytum petræ
Rubrica fabrilis	Symphytum magnu
Rubus	Tamarix
Rubus Idæus	Terebinthus
Rumex	Terra lemnia
Sal	Terra erethria
Salis spuma	Terra cimolia
Salvia	Terra pinguis
Salix	Terra melia
Scordium	Tilia
Sedum maius	Tomentum
Sedum minus	Tragium alterum
Sentis canina	Tragoriganum
Sideritis	Tragos
Sifer	Tribulus
Solanum	Thuris cortex
Solanum vesicarium	Thus
Sori	Veneris ymbilicus
Sonchus	Verbascum
Spina alba	Vifex
Spina arabica	Vitis alba
Spodium	Vitis nigra
Squama aris	Vitis vinifera
Stibium	Vlmus
Stœchas	Vinacei
Stœbe	Vua acerba, &c.
Stratiotes	

De medicamētis cōstringentibus.

Cap. 3.

Constringentia seu contrahentia seu obstruentia medicamēta crassa sunt esētia, hiaria fororum ora concludunt, exiguoſq; meatus non abeunt, sed foris incumbunt: frigida sunt temperie, & substantiam habent terrestrem crassam partium: cuiusmodi sunt

Acacia	Mespila
Arbutus	Melantheria
Cesvstium	Misy
Agrestis olea	Myrtus
Alumen	Myrtidanum
Tramentum futuriū	Nitrum
Alaustium	Palma
Chalcitis	Pinus
Impetron	Pinaster
Los æris	Querc ^o
Los salis	Rubus
Galla	Sorbus
Ilantes	Sori
Ilans vnguentaria	Spina alba
Apis gagates	Spina Arabica
Apis Thracius	Squama æris
Apis Morochth ^o	Strutia cydonia
Simachia	Spongia, &c.
Calicorium	

Deme-

Aperientia seu Anastomotica medicamēta: vasorum oscula aperiunt. Itaq; cōtraria sunt medicamentis constringentibus aperientia, quæ natura sunt calida, acri, atq; mordaci, tum crassum in super partium. vt

Abſynthium	Calamintha
Abrotonum	Cancamum
Acorus	Capparis
Adiantum	Capa
Agaricus	Carduus
Aloe	Carpesium
Allium	Centaurium maius
Amaracus	Centaurium minus
Amni	Chamædrys
Anthemis	Chamæpitys
Apium	Cicer rubrum
Aristolochia	Cichorium
Artemisia	Cinnamomum
Asarum	Costus
Asparagus	Crithmum
Asplenum	Cuscuta
Asphodelus	Cyclaminus
Amygdalæ amara	Daucus
Betonica	Eupatorium
Brassica	Eryngium

Œniculum	Peucedanum
Fel taurinum	Pistacia
Gentiana	Polium
Hyslopum	Pulegium
Iris	Raphanus
Juniperus	Rhaponticum
Laurus	Rhabarbarum
Libanotis	Rosarum succ ⁹
Lichen	Rosmarinum
Ligusticum	Rubia
Marrubium	Ruscus
Melissa	Sabina
Melopeponum semen	Scilla
Mentastrium	Scordium
Meum	Sphondilium
Myrica	Sinapi
Nyrrha	Sium
Napi semen	Smyrniun
Nardus utraq;	Squinanthum
Nigella	Sulphur
Ononis radix	Thymus
Oleum irinum	Thymbra
Oleum amaracinum	Trichomanes
Origanum	Verbenaca
Oxylapathum	Vrtica, &c.
Pastinaca sylvestris	
Petroselinum	

Deme=

Medicamenta discutientia calidasunt cum
substantiâ tenuitate: vt sunt

Abrotonum	Brassica
Acanthus	Bromus
Adiantum	Bupththalmum
Althea	Butyrum
Ammi	Bryoniæ radix
Anagyris	Cânabis
Androsaces	Capparis
Anethum	Chamæmelum
Anisum	Carum
Anthemum	Casia
Aparine	Cassus vetus
Apium	Castoreum
Apiastrum	Caucalis
Apocynum	Cedrus
Argemone	Cera
Aristolochia	Chamæleō alb. & nig.
Asclepias	Chamæpitys
Asphodelus	Chamælyce
Aster Atticus	Chelidonium maius
Atriplex	Chrysanthemum
Beta	Cicer
Bdellium	Cytisus
Bitumen	Clinopodium
	Coagulum

Coagulum	Isatis sativa
Colus rustica	Juglandes
Coriandrum	Lacca
Crocodilium	Ladanum
Cucumis sylvestris	Lampfana
Cyclaminus	Lanaria herba
Cyminum	Lapis Phrygius
Daucus	Lapis pyrites
Dictamnus Creticus	Lapis gagates
Ebulus	Lapis Thracius
Elaterium	Lapis alabastrites
Erbi farina	Leontopetalum
Fax	Leucas
Furfur	Libanotis
Foenumgræcum	Ligusticum
Galbanum	Ligustrum
Galiopsis	Lilij folia
Geranium	Lini semen
Gladiolus	Lolium
Gutta ammoniaca	Lupinorum farina
Halcyonium	Lycium
Harundo	Malua
Hauena	Marrubium
Hemerocallis	Melilotum
Hordei farina	Mentha
Hydropiper	Meum
Iasminum	Mercurialis
Iris	Moly

Muscus	Piper
Nasturtium	Pix liquida
Nepeta	Pix sicca
Nerium	Pix zopissa
Nigella	Pinguedo ouis
Nitrum	Pseudobunium
Nitri spuma	Ptrmica
Ocymum	Pycnocomum
Oculus bouis	Quinquefolium
Oleum vetus	Radicula
Oleum ricinum	Radix Rhodia
Oleum raphaninum	Rhamnus
Oleum melanthinum	Raphanus agrestis
Oleum picinum	Resina
Oleum anethinum	Ricinus
Oleum chamameli-	Rotundus iuncus
num	Rumex
Oleum rutaceum	Ruta
Olusatrum	Ruta sylvestris
Onobrychis	Sabina
Origanum	Sagapenum
Paliurus	Sal
Panax	Salis spuma
Pancratium	Salis flos
Paronychia	Sambucus
Personata	Sampsuchum
Petroselinum	Sandaracha
Peucedanum	Scammonium

Senecio	Tragium
Sesamum	Terebinthina
Sisymbrium	Tragoriganum
Sium	Trichomanes
Smyrnium	Veneris vmbilicus
Spongia	Verbascum
Syrax	Viscum.
Stachas	Vitis
Stercus omne.	Vrtica
Terra cimolia	Vua
Terra pinguis	Xyris
Terra ampelitis	Xanthium.
Testa marina lotæ	Zingiber,&c.
Thapsia	

*De medicamentis condensanti-
bus, Cap. 26.*

Condensantia medicamenta frigida planè sunt, non tamen terrestris essentia, neq; æreæ, sed potius aquæ, cuiusmodi sunt

Aqua frigida	Tribulus viridis
Semperuium	Psyllium
Portulaca	Lenticula palustris
Mandragora	Altercum
Cicuta	Papauer, &c.

De medicamentis rarefacien-
tibus, Cap. 27.

R Arefacientia medicamenta condensantibus planè contraria sunt: calida enim sunt modicè & minimè sicca, tenuiumq; partium. Proinde diffundunt, laxant, & cutis meatus dilatant: vt sunt

Adiantum	Lini semen
Althea	Mercurialis
Anethum	Melilotum
Abrotonum	Oleum Chamæmelinū
Chamæmelum	Oleum vetus
Fœnumgræcum	Oleum ciciñinum
Farina hordei	Oleum raphaninum
Farina erui	Oleum ex cucum. syl.
Farina tritici	Oleum ex althea, &c.

De medicamentis emollienti-
bus, Cap. 28.

E Mollientia siue Malactica medicamēta modicè tum calida tū sicca esse conuenit: sed satis est, vt secundi, aut tertij ordinis sint excalfacientium, prīmi exiccantium. Sed & his nō secus ac pus mouentibus, emplastica vis, hoc est, poros illinendi inesse conuenit. Ceterū quanto maiorem euacuandi facultatem habere debent, tantō vtrique minus etiam meatus illitu obstruere:

frungere, ne actio impediatur: vt sunt

Acanthus	Iris
Adeps omnis	Lac
Althea	Ladanum
Ammoniacum	Iana succida
Amurca	Laurus
Anthemis	Lilium
Aqua tepida	Lini semen
Attriplex	Lithargyrum
Bdellium	Loti syl. semen
Beta alba	Malua
Bitumen	Mastyche
Brassica	Medulla ceruina
Buglossum	Medulla vitulina
Buphtalmus	Mel
Butyrum	Melilotum
Cera	Nigella
Capa cocta	Oesippus
Cerussa	Oleum oliuarum
Cucumis syluestris	Oleum amygdulcium
Colophonia	Opopanax
Cydoniorum semen	Pancratium
Crocus. Cupressus	Phaselus
Ficus sicca	Pix arida
Foenumgræcum	Plumbum vstura
Galbanum	Psyllij semen
Hemerocallis	Resinz omnes
Hippoglossum	Sapa

134 PRACTICÆ GENERALIS

Scilla	Viola purpurea
Sesamum	Ulmī radix
Stercus bubulum	Vux passæ
Styrax	Viseum, &c.

De medicamentis induranti- bus, Cap. 29.

Indurantia ipsis emollientibus planè sunt cō-
traria, Sunt enim frigida & humida, veluti sem-
peruium, portulaca, psylliū, lēticula palustris,
folanum, &c. Similiter si quid simul refrigeret,
& deficiet, & ipsum planè indurabit, at non pro-
priè. Nam congelatione potius quàm euacuati-
one durum efficitur corpus. Sin quid q̄ innaram
humiditatem non continet, induratū est, id sic-
cum aptius quàm durū dicemus: constatq; eius
sanatio rigatione, & humectatione, non emolli-
tione: Sicuti tensio, laxatione curatur, laxatio tē-
sione. Duritiem verò sequitur tensio, mollitiem
laxatio.

De medicamentis laxantibus, Cap. 30.

Medicamētorū laxantiū nō vna est species,
sed tot, quot tensionū. Tensionē autē experi-
untur, q̄ p̄frictionū iniurijs patuerūt, aut aridi-
tate rigent, aut inflammationibus obsidētur, aut
duritia tumentes occalescunt, aut carnis copia
partes

partes quibusdā, nō sec^o, ac in phlegmonis, extu-
berāt. Idcirco nō etiā simpliciter vna est species
laxantiū remediōrū, scilicet, cū alia humectādo,
alia calfacien do, alia verò emolliēdo, quēdā va-
cuādo, nōnulla tumores prænaturā purgādo, a-
lia p horū cōiugationē quāpiā agēdo laxare cō-
sueuerint. Porro laxitatē sentiūt ligamēta, tēdo-
nes, cutis ipsa, eiq; subditi muscoli, cū copioso
humore imbuuntur.

*De medicamentis abstergentibus,
& detergentibus, Cap. 31.*

A bstergentia medicamēta calida crassarūq;
partiū esse debēt, cuiusmodi sunt omnia a-
marā, vel nitrosa, quæ crassos viscososq; humo-
res abstergere valent: ex quorum numero sunt,

Abſinthium	Arction
Abrotannm	Argemone
Acorus	Argenti spuma
Aeris squama	Aristolochia rotunda
Ærugo. Agaricus	& longa
Alyſſina. Aloe	Arum. Aſarum
Amygdalæ amaræ	Aſparagus
Anthyllis	Aſphodelus
Antirrhinum	Atramentum futuriæ
Aparine	Atriplicis ſemen
Apiſtrum	Batis

136 PRACTICÆ GENERALIS;

Beta	Costus
Bdellium	Crocomagma
Brassica	Cucumis sativus
Buccina	Cucumis sylvestris
Bulbus esculentus	Cyclaminus
Cadmia	Diphyges
Canchamum	Dracunculus maior
Capparis	Dulcis radix
Capnos	Dryopteris
Cardamomum	Ebenus
Centaurium minus	Elaterium
Capa	Eliotropium
Chamædrys	Equisetum
Chamædaphne	Eruum
Chamæleon	Eupatorium
Chamælea	Euphorbium
Chamæpitys	Faba
Chamæfyce	Fel
Chelidonium maius	Fax
Chondrylla	Ficus
Chrysocolle	Filix
Cicer	Flos æris
Cinis sarmentitius	Fœniculum sylvestre
Cinnamomum	Fœnumgræcum
Clinopodium	Fumaria
Colocynthis	Gentiana
Conyza	Glans vnguentaria
Conchula Indica	Glandes

Granum infectorium	Libanotis
Halcyonium	Lichen
Harundo	Lilium
Hedera terrestris	Lithospermion
Hedysarum	Lithargyrum
Helxine	Lotus sylvestris
Hemerocallis	Lupini
Hirundinaria maior	Lycium
Hordeum	Marum
Hyacinthus	Marrubium
Iasminum	Mel
Isopyron	Misy
Labrum Veneris	Myrrha
Labrusca	Narcissus
Lactaria herba	Nasturtium
Lactuca sylvestris	Nepeta
Lanaria herba	Nigella
Lampfana	Nitrum
Lapis Armenius	Nitri spuma
Lapis chalcitis	Nymphæa
Lapis pyrites	Oleastellus herba
Lapis Asius	Oleum amygd. amar.
Lapis ostracites	Oleum balaninum
Lapis ophites	Ononis
Lapis thyites	Onosma
Lapis Arabicus	Orminum sativum
Leucacantha	Orobis
Leucoion	Osyris
	I s
	Panacis

138 PRACTICÆ GENERALIS

Panacis radix	Sifer
Pancratium	Sisymbrium
Papauer corni.	Sisymbrium alterum
Parthenium	Solaris maior
Phu	Spuma argenti
Pistacia	Stachas
Pityusa	Sulphur
Pix vtraque	Tamarix
Plantago	Telephion
Populus alba	Terra Samia
Poterium	Terra Chia
Pulicaris herba	Terra Selinussa
Purpura	Terra melia
Pycnocomum	Tithymalus
Quinquefolium	Trissago
Radicula	Veneris umbilicus
Ricinus	Veratrum album
Rubia	Veratrum nigrum
Sagapenum	Verbascum
Salis spuma	Veronica
Scamonium	Viola alba
Scandix	Viscum
Scilla	Vitis alba
Scordium	Vitis sylvestris
Sepiæ testa	Vitis nigra
Sesamoides maius & minus	Vitis vinifera
Sideritis	Vlmus, &c.

Cæterum

Cæterum detergentia medicamenta non potius purgāt, sed tantū cutis vel vlcerū sordes. Huius generis sunt amara, & dulcia quædam, q̄ tenuium sunt partium: vt fabæ, eruui, lupini, iris, mel, hordeum, scilla, vrticæ semen, &c.

De medicamentis adurantibus,

Cap. 32.

Adurentia medicamenta quædam, crustam moliantur, Græcis Escharotica dicta sunt, quodd escharas, hoc est crustas, cauterij ritū efficiant, sunt consistentia, crassa, & vehementer calida, & caustica, hoc est vrentia, & non secus atque ignis corpus colliquant, & cuiusq; sensibili corporis parti inhaerint, pungentis stipitis ritū cruciant, vt

Adarces. Ærugo
Æs vstum. Allium
Alius lapis
Atramentum sutorii
Auripigmentum
Buprestis
Calx viua. Chalchantū
Cinis ficulneus
Calamintha
Cantharides
Chalcitis

Chelidonium minus
Clematidis altera
Chrysocolla
Dracunculus
Dryopteris
Ericæ pinorum
Euphorbium
Fax vsta
Hydropiper. Iberis
Lanaria herba
Melâteria. Misy. Ochra
Pan-

140 PRACTICÆ GENERALIS

Pancratium	Scilla
Pforicum	Sinapi
Ptarmica	Staphisagria
Pulegium	Thapsia
Pulmo marinus	Thymelæa
Pyrethrum	Tithymali
Ranunculus	Veratrum album
Salia	Vrtica
Sardonias herba	Vrtica Romana.

De medicamentis attrahentibus, Cap. 33.

A Ttrahentia medicamenta dicuntur, quæ ex alto corpore vehementius attrahunt, ijs quæ eadem substantia calida est, & tenuium partium, attrahit enim perpetuò calidū. Caterum quod cū caliditate coniunctam habet partium tenuitatem, trahit vehementius. Ex horum genere sunt

Amaracus	Bdellium. Botrys
Ammoniacum	Bulbus esculentus
Anagallis vtraq;	Centaurium vtrumq;
Anagyris	Ciccr
Anchusæ radix	Cochleæ terrestres
Anemone. Apium	Cyclaminus
Aristolochia rotunda	Dictamn°
Baccharis radix	Dracunculus
	Elateri-

Elaterium . Eryngium	Panacis radix
Fax vsta	Pastinaca sylvestris
Fermentum	Personata. Pix
Galbanum	Propolis
Gentiana	Pseudodictamnus
Gladiolus	Pycnocomum
Harundo	Pyrethrum
Hedera	Ranunculus
Helenium	Resina omnis
Heliotropium	Rubia
Iris	Sagapenum
Lacerta caput	Scoria argenti
Lasepitium	Seseli Mafs.
Magnes	Siluri falsi caro
Mastiche	Stercus omne
Narcissus	Sinapi. Sulphur
Nepeta	Thapsia. Tragium
Nitrum	Veratrum nigrum
Onosma	Verbascum
Opopanax	Viscum
Oxyacantha	Xyris, &c.

De medicamentis cientibus, Cap. 34.

Cientia medicamenta sunt vehementer calida,
& substantia tenui: siue vrinam, siue menses
siue sudores cieat: cuiusmodi sunt

Ageratum

Allium

Alli-

142. PRACTICÆ GENERALIS

Alifina	Carpesium
Ammi	Carum
Amygdalæ amara	Casia
Anagyris	Castoreum
Androsaces	Caucali
Anemone	Cedri fructus
Anisum	Centaurium vtrumq;
Anthemis	Chamapitys
Apium	Chamedaphne
Apiastrum	Chrysocome
Aristolochia longa	Cicer
Artemisia	Conyza
Asarum	Coris
Ascyrum	Costus
Asphodelus	Crocus
Atramentum futuriū	Crocomagma
Atriplex	Crocodilium
Balsamum	Cucumis sativus
Bdellium	Cucumis sylvestris
Bitumen	Cyclaminus
Brassica	Cyminum
Bulbus vomitorius	Cyperus
Calamus odoratus	Cytisus
Cancanum	Daphnoides
Cantharides	Daucus
Capnos	Daucus sylvestris
Capparis	Dictamnus
Carduus	Dictamnus Cretensis
	Dia-

Dracunculus vterque	Libanotis
Elatarium	Ligusticum
Epithymum	Lithospermū
Eruum	Lonchitis
Eruca	Malum Cydonium
Eryngium	Mala orbiculata
Fel	Mala citria
Ferula	Malabathrum
Foeniculum	Milium
Folium	Moly
Fumaria	Myrrhis
Gingidium	Napum
Gratum cnidium	Narcissus
Gutta ammoniac	Nardum
Helichrysum	Nardum Celticum
Hypericum	Nardum montanum
Iasminum	Nepeta
Inula	Nigella
Iris	Ocymum
Irio	Oesippus
Iuniperus	Olea Ethiop. lac.
Iuniperi baccæ	Onobrychis
Lactuca syl.	Ononis
Lanaria herba	Origanum
Laureola	Orminum
Laurus Alex.	Paliurus
Leontopetalū	Panax
Lycocion	Pancratium

Pasti.

144 PRACTICÆ GENERALIS

Pastinaca sylvestris	Sampfuchum
Pæonia mas	Sardonio herba
Pæonia femina	Satyrion
Periclymenū	Satyrion alterum
Petroselinum	Scandix
Peucedanum	Scilla
Phaselus	Scordium
Phu	Scorodoprasum
Piper	Scolymus
Polium	Serpyllum
Porrum capitatum	Seseli
Porrum sylvestre	Siliquæ
Pseudobuniū	Sinapi
Pseudodictamnus	Sison
Præmna	Siser
Pulegium	Sisymbrium alterum
Radicula	Sium
Ranunculus	Smilax hortenſis
Raphanus	Smyrnium
Rapum	Solanum ſomniferum
Ricinus	Solanum veſicarium
Rubia	Solaris maior
Rufcus	Terra lemnia
Ruta ſylveſtris	Thlaſpi
Sabina	Thymbra
Sagapenum	Thymus
Salis flos	Tilia
Salvia	Tordilium

Tragy-

Tragium	Veratrum nigrum
Tragoriganum	Veronica
Trichomanes	Vitis alba
Trifolium	Vrtica
Trissago	Xyris
Veneris vmbilicus	Zingiber, &c.
Veratrum album	

De medicamentis deleterijs, Cap. 35.

Deleteria sunt, quæ tota essentia nobis contraria sunt, proinde si vel minimum eorum adsumptum fuerit, omnino lædat, necesse est, seu dryopteris, & pityocampe, & thapsia, & solanum manicum, & hydrargyrum, & fungorum nonnulli, præterea salua & fel venenatorum animalium. Nam quæ huiusmodi sunt, omnia genere sunt deleteria, non quantitate. Ac propterea eorum nihil in alexiterias antidotos imponitur, veluti ea, quæ sola quantitate deleteria sunt, utpote papaveris succus, & crocus, &c. Nam si horum aliquod largius hauriatur, demerentabunt quædam, mortem autem quædam inferent. Caterum alijs admista cõuenienti quodam pondere, seu mēsurā, adiuuabunt. Porro humane nature recta quidē ratione toto genere deleteria existimāda sunt, quæ hominē aut per cōtactū aut per putredinē, aut per erosionē interficiunt,

K non

non vt frigefacientia duntaxat quantitate, hæc enim, vt paulo antè dictum est, vincuntur interdum, & nutrimentum animali euadūt. Putrefacientia autem etiam si quantitate minima sumantur, omnino tamen corrumpunt, quia videlicet, quæ putredini obnoxia sunt, calore, humiditateq; putrescere solent. At calidus humidusque sanguis est. Itaque putrescere nunquam cessare potest, simulq; vicissim putrefacere. Iam verò cum ijs quoq; accidat, vt sensim incalescât, proinde longo etiã post tēpore, à quo sumpta sunt, nonnulla interimunt, potissimum quæ crassa terrenaque substantia. Hæc enim corporibus nostris inharrentia, insidentiaque, deinde temporis spacio putrescentia, ex crassitie sua tenaciter adharrentia, erodunt, corrumpuntque vicinas corporis partes. At quæ tenuiora sunt, etiam excerni interim cum excrementis possint. Siquidem medicamenta putredine erosionēue necantia quandoq; non interficiunt, idque ob duas causas: quarum vna est, quam modo diximus, nempe quum simul cum excrementis excernantur, priusquam iniuria corpus afficiant. Altera est, si cui accipienti bona faueat fortuna, videlicet, aut cibus, aut quæ alioqui conferunt videnti, aut Medico, qui curando præsit, nactus. Nam vbi grauis ab ijs noxa illata est, malum neq; victus ratione, neque generosorum

forum medicaminum, medicique auxiliantis
ope fieri potest. Quod si prorsus exile sit delecte-
rium, nihil repugnat, quò minus illud quoque
nihil perficiat, propterea quòd cū excremen-
tis excerni possit, aut idonea victus ratione su-
perari. At ex delecteriorum genere sunt

Aconitum	Chrysocolia
Aeris squama	Colchicum
Aerugo	Colocynthis
Agaricus niger	Coriandrum
Anacardi	Cyclaminus
Apocynum	Daphnoides
Argenti spuma	Dorycnium
Argentum viuum	Dracunculi semen
Arsenicum album	Elaterium
Auripigmentum	Erucæ pinorum
Buprestis	Euphorbium
Bryonia	Flammula
Calx	Felis cerebrum
Canis piscis fel	Ferri scobs
Cantharides	Fungi
Castoreum malum	Gypsum
Cerussa	Genistæ semen
Chalcanthum	Hyoscyamus
Chalcitis	Ixia
Chamedaphne	Lapis Armenus
Chamaelea	Lapis caruleus
Chamaeleon	Lapis magnes

248 PRACTICÆ GENERALIS

Lathyris	Salamandra
Lepus marinus	Sandaracha
Mandragora	Sanguis menstruus
Mel heracleoticum	Sanguis taurinus
Minium	Sardonio herba
Nerium	Scamonium
Nux vomica	Scilla
Opium	Solanum manicum
Opocarpium	Staphisagria
Papaver corniculatum	Sudor quadrupedum
Pardi fel	Taxus
Pityusa	Thapsia
Pharicum	Thymelæa
Plumbi scobs	Toxicum
Pforicum	Turpetum
Psyllium	Viperæ fel
Rana rubeta	Veratrum album
Ricinus	Veratrum nigrum
Rhododaphne	Vitis alba, &c.

De medicamentis alexiterijs, Cap. 36.

Alexiteriorum, seu alexipharmaeorum natura duplex est. Quædam enim eorum, quod mortiferum est, alterant, & alterando iuuant. Quædam vero ex corpore patiente corrumpens venenum, seu medicamen deleterium euacuant. Verum alterant una qualitate, aut duarum coniugatione, aut denique

tota

tota substantia. Euacuant quoque totius essentia similitudine, aut caliditate, & partium subtilitate. At alexiterium, quod qualitatibus solum contrarietate auxilio est, manifestum est. Nam si frigidum deleterium, aut venenum animantis, ab excalescentibus petendum est remedium: si calidum, a refrigerantibus: si vero humidum, ab exsiccantibus: si siccum, ab humectantibus. Sic etiam si frigidum sit & humidum, ab exsiccantibus, & calescentibus, & in reliquis coniugationibus proportionem similiter. Caterum alexiteria, quæ tota substantia medicamenta deleteria alterant, facultatem, seu naturam habent mediam inter corpora affecta & ipsa afficientia, ut scilicet idem sit recessus corporis, ad facultatem alexipharmacam, qui alexipharmacum ad deleteriam: & rursus deleterij ad alexipharmacum, quæ alexipharmacum ad corpus. Quapropter omnia propemodum, quæ deleterijs aduersantur, si largius sumpta fuerint, grauiter corpus animantis obledunt, quamobrem in ijs exhibendis consideratione opus est. Porro omne deleterium venenum, a foris adhibitis medicamentis euacuatur, utpote, aut caliditate attractionem molientibus, aut totius substantia similitudine. Sed & hic quoad fieri poterit, maxime medium natura alexiterium sit, necesse est. Nam si aduersissimum foret corpori, in ipsum ageret potius

150 PRACTICÆ GENERALIS
ceū deleterium non euacuaret venenum. Porro
ex genere alexiteriorum sunt

Abrotonum. Anisum.	Cyminum sylvestre
Absynthium	Cyclaminus
Aristolochia longa.	Daucus
Agaricum.	Dictamnus
Allium	Elleborine
Adiantum.	Eupatorium
Ammi	Erysimum
Apium.	Fœniculum
Acorus	Gentiana
Amomum.	Galbanum.
Bdellium	Iris
Butyrum	Iuniperus
Brassicæ succus.	Lasercpitium.
Bryoniæ radix	Libysticum.
Betonica	Leucas
Bolus armen ⁹	Marrubium.
Cyperî radix	Mala citria
Castoreum	Iuglans
Cinnamomū	Napi
Cardamomum	Origanum.
Citrei mali semen	Pulegium.
Chamædrys.	Paliurus
Casia	Polium
Carnabadium	Quinquefoliū.
Costus	Lasercpitium
Calamintha	Piper.

352 PRACTICÆ GENERALIS

Adeps gallinaceorum	Fermentum
Adeps taurinus	Ficus
Adeps caprinus	Fœnumgræcum
Adeps anserinus	Hydrelæum
Althea	Ladanum
Amomum	Liliorum alborum ca-
Butyrum	pita
Bryoniæ radix	Lini semen
Cera cum oleo aliquo	Mastiche
calido <i>Cepa cocta.</i>	Oesypum
Crocus	Panis coctus cum aqua
Chondri farina	& oleo
Farina triticea cum a-	Pix cum oleo aliquo
qua & oleo	Resina cum oleo
Farina hordei	Smyrnum. Styrax
Farina lolij	Thus, &c.

De medicamentis emplasticis,

Cap. 38.

Emplasticum medicamentū est, quod poros illinēdi facultatem obrinet, quod viscosum sit & terrenę consistentiæ, sic vt tenaciter corporis poris illitum in hæreat, omni mordacitate vacans. Temperatum igitur sit in caloris & frigoris differentiâ: sicæ & terrestris consistentiæ, & citra morsum desiccantis, veluti pleraq; quę exacte lota sunt. Sunt autem emplastica

Adeps

Adeps omnis recens	Lilium
Adeps fuillus	Lupini
Althea	Malua
Amylum	Medulla
Bdellium	Mel
Butyrum	Muccago omnis
Cacalia	Myagrum
Cerussa	Nuclei pinei
Calx lota	Oesyphus
Cadmia lota	Oleum
Cafeosum lactis	Oui album
Cera	Samius aster
Cimolia terra	Sarcocolla
Chondrus	Sesamum
Cochleæ	Terra cretensis
Fermentum	Terra fullonum
Fœnumgræcū	Thus
Ficus	Tragacanthum
Gummi	Triticea farina
Gypsum	Triticeus panis
Iris	Vua passa, &c.

*De medicamentis obstructione
liberantibus, Cap. 39.*

Medicamentum quod obstructione seu infarctu liberat, emplastico planè contrariū est, quia nec viscosum, nec mordacitatis expers,

K 5

sed

154 PRACTICÆ GENERALIS

sed nitrosum vel amarum, & tenuiū partium: vt

Absynthium	Marrubium
Abrotonum	Nepeta. Nitrum
Acetum	Nitri spuma
Allium. Agaricum	Orob. Osyris
Amygdalæ amaræ	Paonia
Asarū. Aphronitrum	Pistacia
Asparagus	Polium
Baccharis	Rhu
Carpesium	Rubia
Capparis cortex	Ruscus
Cubebæ	Scilla
Eruum	Scandix
Gentiana	Seriphion
Hedysarum	Scolopendrium
Hederæ terrestris	Sison
Hirundinaria	Tamaricis radix
Iris	Thymus
Lupini	Vrticæ semen, &c.

De medicamentis epuloticis, Cap. 40.

Epulotica, hoc est, quæ cicatricem inducunt
medicamenta, vlcera plana claudere valent.
Proinde vt contrahent, constringāt, constipent,
densent, siccant, & calli instar indurent, necesse
est, cum cutis aliud nihil sit, quàm caro in cal-
lum indurata. Ex horum autem genere sunt,
Aegyptiæ spinæ fructus **Aeris squama**

Acrugo

Aerugo	Eruum
Aes vsum	Erysimi semen
Aloe	Eupatorium
Alumen vsum	Fax vini vsta
Althea	Fornacea teste
Amylum	vsta
Anagallis	Fragaria
Aristolochia	Galla
Aqua aluminosa	Gummi acacie
Argenti spuma	Gypsum
Astij lapidis flos	Iris. Illyrica
Balaustia	Isatis
Bedellium	Lolium
Bolus Armenus	Lycium
Buccina putamen	Lithargyrum
Cadmia	Lupinus
Calx lota	Malicorium
Chamaedrys	Mel costum
Chamepitys	Myrrha
Chalcitis	Misy
Cerussa	Mituli vsti cloti
Centaurium	Molybdæna
Conchula radica	Myrobalani
Corallium	Myrti baccæ
Diphryges	Omphacitis galla
Dracunculus	Ostreorum putamina
Ebulus	Palmula
Equisetum	Papyrus vsta

Penta-

156 PRACTICÆ GENERALIS

Pentaphyllon	Sarcocolla
Perfoliata	Spodium
Plantago	Spongia
Pompholyx	Stibium
Plumbum vstum	Symphytum maius
Plumbum elotum	Thus
Pumex	Tormentilla
Purpura cremata	Terra lemnia
Sanguis Draconis	Testa oui
Sambuci folia	Verbenacæ, &c.
Sandaracha	

De medicamentis exedentibus,

Cap. 41.

Exedentia medicamenta, Græcis cathartica dicta, extimam tantum superficiem, quâ contigerunt, detrahunt, sed in altum subire non valent: ita vt eorum vsus sit ad detrahendam vlcereb. excreſcentibus carnem superfluam, cicatricemq; inducendum. Oriuntur ex calida, sicca, tenuiumq; partium substantia. Ex horum numero sunt

Adarces	Alumen
Ærugo	Aqua saporis
Æris flos	Argentum viuū sublimatum
Æris squama	Argentum viuū precipitatum
Æs vstum	

epitatum	Chalcitis
Arfenicum	Diphryges
Asie petre flos	Melanteria
Asius lapis	Mercurij oleum
Auripigmentum	Misy
Calx	Ochra
Cantharides	Pforicum
Ceruleus lapis	Sori
Chalcanthum	Stibij oleum, &c.

*De medicamentis expurgan-
tibus, Cap. 42.*

Medicamenta expurgantia calida esse debent
& substantia crassa, sed minori quā abster-
gentia: eiusmodi sunt.

Abfynthium	Atramentum futoriū
Adiantum	Ballote
Amygdalæ amaræ	Balsamum
Anagallis	Beta
Anemone	Buccina
Apiastrum	Butyrum
Apios	Capparis
Aqua maris	Cardui succus
Argemone	Caries lignorum
Aristolochia rotunda	Carpesium
Arum	Cedrinus liquor
Asclepias	Centaurium maius
	Centaurium

158 PRACTICÆ GENERALIS

Centaurium minus	Eupatorium
Cape	Faba
Chamaepitys	Ficus
Chelidonium maius	Flos æris
Chelidonium minus	Fumaria
Chrysocolia	Gentiana
Cicer	Genista
Cinnamomum	Glans vnguentaria
Circea	Gratum cnidium
Clematis altera	Gutta ammoniaci
Cnicus	Hedera
Colocynthis	Hedysarum
Colymbades	Hippophestum
Conchula Indica	Hippophaes
Crocodilion	Hysopus
Cucurbita vsta	Iris
Cucumis satiuus	Irio
Cucumis syluestris	Isopyrum
Cyclaminus	Iuniperi bacca
Daphnoides	Lactuca syluestris
Dictamnus	Lanaria herba
Dictamnus Cretenfis	Lapis Armenus
Dracunculus maior	Lapis Indicus
Ebulus	Lapis chalcitis
Elaterium	Leucacantha
Empetrum	Libanoris
Epithymum	Lini semen
Eruum	Lotus satiuus

Lichnis

ichnis sylvestris	Peplis
Mandragora	Peplos
Marrubium	Peucedanum
Mel	Piper
Melanteria	Pistacia
Mercurialis	Pityusa
Mora matura	Polium
Morrad. decoctum	Polygonatum
Myagros	Polypodium
Myrrha	Porrum capitatum
Myrrhis	Porrum sylvestre
Narcissus	Pruna
Nasturtium	Pseudodictamnium
Nitrum	Ptarmica
Oenanthe	Pulegium
Oenomel	Pumex
Olusatrum	Purpura
Orobis	Pycnocomum
Origanum	Radicula
Osmium	Rhaponticum
Othonna	Rhabarbarum
Oliurus	Recrementum plūbi
Oncarium	Recrementum argenti
Opaucor. corniculatum	Ricinus
Opaucor. spumcum	Rubia
Orrhenium	Ruscus
Ostinaca	Sabina
Oxonia	Sagapenum

Sal

160 PRACTICÆ GENERALIS

Sal	Thlaspi
Salis spuma	Thapsia
Salis flos	Thelypteris
Salvia	Thymelæa
Sambucus	Thymbra
Scamonium	Thynus
Scandix	Tithymallus
Scilla	Tordylium
Scordium	Tragoriganum
Sesamoides maius	Trichomanes
Sesamoides minus	Trifolium
Siliquæ	Tripolium
Solaris maior	Triflago
Spartium	Thus
Spodium	Thuris manna
Sphondylium	Thuris fuligo
Squama æris	Veratrum album
Staphylinus	Veratrum nigrum
Staphisagria	Verbenaca
Stibium	Vetonica
Stochas	Vitex
Sulphur	Vitis alba
Symphitum petrum	Vitis nigra
Terebinthus	Vitis sylvestris
Testiculus	Vlmus
Testiculus alter	Vrtica
Terra melia	Zingiber, &c,

De medicamentis extenuantibus,

Cap. 43.

Extenuantia medicamenta calida sunt, & tenuium partium. Suo enim calore & subtilitate, facile meatus subintrât, & crasso occurrentia humori, sese suâ humiditatis causa insinuât, hac ratione extenuandi præbêt effectum. Ex genere verò extenuantium sunt

Abſynthium ſeriphiû	Aristolochia rotunda
Abrotonum	Aſarum
Acetum	Aſphodelus
Acorus	Aſplenon
Adiantum	Baccharis
Allium	Balaſamum
Ammi	Brassica ſylueſtris
Amomum	Butyrum
Amygdala dulcia, &	Chamaemelum
amara	Cancamum
Aparine	Casia
Anchusa	Castoreum
Anemone	Cedron aquor
Anethum	Cinnabaris
Apium fatium	Cinnamomum
Apium ſylueſtre	Clinopodium
Apium paluſtre	Coris
Apium magnum	Cucumis ſylueſtris
Artemisia	Cuminum

L Cumi-

362 PRACTICÆ GENERALIS

Cuminum sylvestre	Panax
Daucus	Paronychia
Daucus sylvestris	Pastinaca syl.
Dictamnus	Peucedanum
Dictamnus Cret.	Piper
Dracunculus maior	Polemonia
Dracunculus minor	Populus nigra
Elaterium	Pseudodictamnus
Elelisphacos	Ptarmica
Fel	Pulegium
Ferula	Quinquefolium
Ficus	Sabina
Gentiana	Sagapenum
Hyssoopus	Sal
Iris	Salis spuma
Iuglandes	Sampfuchum
Iuniperi baccæ	Sinapi
Lacca	Sisymbrium
Lapis chalcitis	Squama æris
Lapis spongiæ	Stoechas
Laserpitium	Symphitum petraura
Ligusticum	Thymbra
Marrubium	Thymus
Opopanax	Tragoriganum
Origanum	Trichomanes, &c.

De medicamentis in crassantibus,

Cap. 44.

In crassantia verò medicamenta frigida sunt, & crassarum partium. Frigore enim coeunt, & substantiæ crassitudine in crassant, vt Hypecoon. Hyoscyamum, &c.

De medicamentis flatus discutientibus, Cap. 45.

Carminantia.

Flatibus discutientia medicamenta calida sunt cum partium tenuitate: vt

Absinthium	Cyperus
Acorus	Daucus
Allium	Enuta
Anisum	Epithymum
Apium	Eryngium
Anethum	Foeniculum
Idellium	Furfur
Carum	Galanga
Carnabadium	Iuniperus
Castoreum	Iuncus odoratus
Chamæmelum	Lauri bacca
Costus	Lignum aloes
Cinamomum	Maiorana
Cuminum	Nigella
Cyminum	Nux moschata

164 PRACTICÆ GENERALIS

Origanum	Seseli
Petroselinum	Smyrnum
Piper	Spica nardi
Rosmarinus	Virex
Ruta	Zingiber conditū, &c.

De medicamentis extrahentibus,

Cap. 46.

Extrahentia medicamenta calida quoq; sunt cum substantiæ tenuitate: cuiusmodi sunt

Acute spinæ radix	Gutta ammoniaca
Ammoniacum	Harundo
Anagallis vtraque	Lacertæ caput
Aristolochia	Narcissi radix
Arum	Oleum sinapinum
Bulbi	Opopanax
Cyclaminus	Onosma
Dictamnus	Orminum
Dictamnus Cret.	Oxyacanthæ radix
Dracunculus maior	Pycnocomum
Dracunculus minor	Piper
Elaterium	Pix
Eryngium	Sagapenum
Fermentum	Scoria argenti
Galbanum	Sinapi
Genista	Sulphur
Gladiolus	Tragium

Thapsia

Thapsia
Terebinthina
Verbasci semen

Viscum
Xyridis radix, &c.

De medicamentis glutinantibus;

Cap. 47.

Glutinantia medicamenta ex sicca & cogen-
te constant materia, Eiusmodi sunt

Achillea	Bryonia radix
Adiantum	Bulbus esculentus
Acorus	Caseus
Aloe	Calamus odoratus
Alumen	Chamaedrys
Althea	Centaurium maius
Amomum	Centaurium minus
Amylum	Clymenum
Amurca	Costus
Androsæmum	Conyza
Anthyllis	Coccum infect.
Aristolochia	Corallium
Argemone	Cupressus
Asphodelus	Cyclaminus
Batus	Cyperus radix
Betonica	Dictamnus
Bitumen	Daphnoides
Brassica	Fraxunculus
Britannica	Equisetum

L 3

Eupa-

156 PRACTICÆ GENERALIS

Eupatorium	Myrrha
Erigerum	Myrtus
Æs vltum	Narcissus
Fagus	Ocimi semen
Filix	Oesypus
Fragaria	Olea syluestris
Gentiana	Oua
Glans	Palmula immatura
Glycyrrhizæ fuccus	Papyrus
Graminis radix	Pentaphyllum
Gummi acaciæ	Picea
Gypsum	Perfoliata
Hedera	Pirus
Hypericum	Pix sicca
Hypocistis	Plantago
Illicis pilula	Plumbum-clotum
Isatis	Polium
Lapis gagates	Polycnemum
Lapis Thracius	Potamogeton
Lapis morochtus	Polygonatum
Lens	Polygonum vtrunque
Lonchitis alt.	Peterij radix
Lyfimachia	Punicorum cytini
Lolium	Pumex
Lycium	Quinquefolium
Malicorium	Quercus
Mel	Resinæ omnes
Millefolium	Salix

Sambucus	Symphitum petraeum
Sanguinalis	Terra lemnia
Sarcocolla	Terra erethria
Scordium	Thuris manna
Sideritis	Thus
Smyrnium	Tilia cortex
Spongia	Tormentilla
Stoebe	Tragoriganum
Stratiotes	Verbascum
Sycomoros	Verbenaca
Symphitum magnum	Vitex. Vlmus, &c.

De medicamentis incidentibus,

Cap. 48.

Incidentia medicamenta ex partium tenuitate proficiscuntur: ex quorum genere sunt

Abrotonum	Cedria.
Acanthus	Chamaepitys
Acetum	Chelidonium vtrunq;
Agaricum	Cepa
Allium	Cicer
Amygdalæ amaræ	Coagulum
Angyris	Conyza
Anemone	Cucumis sylvestris
Arum	Cyclaminus
Casia	Cyminum
Castoreum	Cyperus

168 PRACTICÆ GENERALIS

Dictamnus Cret.	Panocratium
Elaterium	Papauer cornic.
Eruum	Pastinaca syl.
Eupatorium	Periclymenum
Fel	Petrofelinum
Gentiana	Peucedanum
Glans vnguentaria	Piper
Hyssopus	Pityusa
Iris	Polium
Isopyrum	Porrum capitatum
Iuniperi baccæ	Porrum syl.
Lepidium	Pseudodictamnus
Leucacantha	Radicula
Libanotis	Raphanus
Ligusticum	Rubia
Marrubium	Ruta
Marum	Salis flos
Meum	Scandix
Moly	Scilla
Nasturtium	Scordium
Nepeta	Scorodopra-
Nigella	sum
Nitrum	Sinapi
Nitri spuma	Sphondylium
Orobis	Staphylinus
Ononis	Teucrium
Origanum	Thlaspi
Paliurus	Thymbra

Thymus

Thymus
Tragoriganum
Triffago

Vetonica
Vinum
Zingiber, &c.

De medicamentis repellentibus,

Cap. 49.

Repellentia medicamenta frigida & crassa-
rum partium sunt, facultatemq; habent oc-
currentes sibi succos in altum repellendi. Si-
quidem repellit semper frigidum: & quod cum
frigidityte partium crassitiem coniunxit, violen-
tius propellit. Ex horum autem genere sunt

Acacia	Leporinus pes
Acetabulum	Limonium
Ambrosia	Lycopsis
Apollinaris herba	Lycium
Balaustia	Malicorium
Cafeus recens	Mali punici flos
Centunculus	Mespilus
Cerussa	Muscus marinus
Cytus	Myrtus
Gucurbita	Olostium
Cytinus	Omphacium
Ephemerum	Omphacomel
Hordeum murinum	Oxyacantha
Lens palustris	Palma
Lentiscus	Palma elate

L s

Papa-

170 PRACTICA GENERALIS

Papauer fatium	Rubus Ideus
Papauer syl.	Rumex
Persea	Sal
Phyllitis	Salis spuma
Picea	Sanguinalis
Pirus	Sedum maius
Plantago	Sedum minus
Plumbum	Sentis canina
Portulaca	Solanum
Potamogetum	Stratiotes millefolia
Punica mala	Stratiotes aquatica
Quercus	Symphytum petraeum
Radix Idæa	Tamarix
Rhus	Terra cimolia
Rubrica sinopis	Terra pinguis
Rubrica fabrilis	Thuris cortex
Rubus	Thuris manna, &c.

De medicamentis roborantibus,

Cap. 50.

Roborantia medicamenta adstrictoriam siue
 cohibentem facultatem obtinent, suntque
 crassarum partium: cuiusmodi sunt
 Absinthium Alumen
 Acacia Amaracus
 Agallochum Arbutus
 Aloe Balauſtium

Bryon

Bryon	Labruscæ flos
Calamus odoratus	Ladanum
Castanea	Lagopus
Centaurium ma.	Lentiscina refina
Coccum infect.	Limonium
Colymbades	Lycium
Corallium	Lyfimachia
Coriandrum	Malabathrum
Coronopus	Malicorium
Cornu ceruinum	Mala syluestria
Cornus	Mentha
Crocum	Mespilus
Costus	Milium
Cotonea mala	Morus
Cupressus	Muscus
Cyperus	Myrrha
Cytinus	Myrtus
Ebur	Nardum Indicum
Equisetum	Nardum Celticum
Fagus	Oenanthe
Galla	Olea syluest.
Gallinæ ius	Oliuæ falsæ
Gypsum	Omphacium
Hedysarum	Oryza
Iaspis	Palma
Ilex	Palma elate
Intybus syl.	Piper
Iuncus odoratus	Pistacia

Plantago

172 PRACTICÆ GENERALIS

Plantago	Rubus Ideus
Platanus	Salvia
Quercus	Spina alba
Quinquefoliū	Spina Arabica
Rhaponticum	Stoechas
Rhabarbarum	Succinum
Rhodia radix	Symphytum
Rhus	petraum
Rosa	Terebinthus
Rosmarinum alt.	Thus
Rubus	Thuris cortex, &c.

De medicamentis sarcoticis, Cap. 51.

S Arcotica medicamenta mediocriter citraque
 morsum abstergendi vim habere debent, ut
 cavitates carne impleant. Quæ enim carnem
 creant medicamenta, & cavitates implent, pri-
 mam siccantium derergentiumq; sedem obti-
 nent. Talia namque humoris abundantiam re-
 ficcare, & sordem detergere possunt. Ex horum
 autem genere sunt

Abiegna lacryma	Iris
Aloe	Lapis asius
Butyrum	Lentiscus
Cadmia	Mastiche
Fuligo thuris	Myrrha
Hypericum	Panacis cortex
	Pix arida

Pix arida	Sanguis draconis
Pix liquida	Sarcocolla
Resina pinca	Styrax adustus
Resina strobilina	Thuis
Resina terebin- thina	Thuris manna
	Thuris cortex, &c.

De medicamentis sistendi vim habentibus. Cap. 52.

Sistentia medicamenta adstrictoriam, & co-
gentem vim obtinent: cuiusmodi sunt

Acacia	Coagulum
Achillea	Condrylla
Acini	Corallium
Adiantum	Cornus
Agræstis olea	Cornu ceruinum
Alifina	Coronopus
Alrhea	Cupressus
Alumen	Cynosbatus
Astragalus	Fax
Brassica	Ferula medulla
Britannica	Fagus
Bromus	Foeniculum syl.
Cinnabaris	Galla
Cistus	Galium
Clematis prima	Glans vnguentaria
Clymenum	Glycisis

Gramen

37A. PRACTICÆ GENERALI

Gramen harund.	Marum
Gypsum	Medium
Hordeum murinum	Mentha
Hyacinthus	Mespila
Hypocistis	Milium
Intybum	Mora immatura
Isatis sativa	Muscus marinus
Ilex	Myrtus
Labruscæ flos	Nardus
Lactuca sativa	Nitri spuma
Ladanum	Nymphæa
Lapis Indicus	Olea syl.
Lens	Oleum omphacinaum
Lentiscus	Oleum Myrteum
Leporinus pes	Oleum lentiscinum
Limonium	Oliuæ salæ
Lotus arbor	Olostium
Lycium	Omphacium
Lyncurium	Paliurus
Lyfimachia	Palma
Malum punicum	Palma elate
Mali punici flores	Panicum
Mali punici putamen	Pæonia
Malum cotoneum	Persea
Mala orbiculata	Phyllitis
Mala sylvestria	Phoenix
Mala persica	Phu
Manna thuris	Picea

Mirus	Sentis canina
Plantago	Solanum
Plumbarius lapis	Sorba
Plumbum elotum	Spina alba
Plumbum crematum	Spina Arabica
Poma Cydonia	Stibium
Portulaca	Stoebe
Potamogetum	Stomoma
Pruna	Stratiotes mil-
Punica mala	lesolium
Quercus	Succinum
Radix Idea	Symphytum petraeum
Recrementum	Testiculus alter
plumbi	Tilia
Recrementum	Tomentum
argenti	Tragium alterum
Rhus	Tragus
Rosa	Tribulus
Rubrica synopica	Trichomanes
Rubrica fabrilis	Thuris cortex
Rubus	Thuris fuligo
Rubus Ideus	Verbascum
Sanguinalis	Verbenaca
Sarcocolla	Vua acerba, &c.

176 PRACTICÆ GENERALIS
De medicamentis vrinam cientibus,

Cap. 53.

Medicamenta vrinam prouocantia quodam modo acria esse debent, & valde calida, non sicca, à quibus sanguis non extenuatur solum, sed & funditur, ac secernitur, non secus aquelac, quod coagulatur, seroso & tenui seculum segregato, crasso in sese coeunte. Nam vt rones serosum humorem, qui in sanguine existit facilius ad se trahant, multum confert primū sanguinis fusio, deinde segregatio, quorum trunque à valido calore fit. Ex horum generis sunt

Acorus	Bdellium
Ageratum	Bitumen
Allium	Calamus odoratus
Ammi	Cantharides
Amygdala amara	Capnos
Androsaces	Capparis
Anisum	Carduus
Apium satium	Carpesium
Apium montanum	Carum
Apium magnum	Casia
Asparagus	Caucalis
Asphodelus	Chamaepitys
Baccharis	Cinnamomum
Balsanum	Crocus

Cyperu

Dyperus	Lonchitis
Dryifus	Malum cydonium
Daucus	Mala orbiculata
Dicamnus Cretenfis	Mala punica acida
Dicamnus	Malabathrum
Dracunculus maior	Mel
Dracunculus minor	Mentha
Dichinus marinus	Meum
Diphthymum	Milium
Druum. Eruca	Moly
Dumaria	Napum
Deniculum	Nardus Indica
Dolium	Nardus Gallica
Dingidium	Nardus montana
Gramen harund.	Nepeta
Gutta ammoniaca	Nigella
Helenium	Ocymum
Hafminum	Olea fyl. lacryma
Hris	Ononis
Huniperus	Origanum
Huniperi bacca	Paliurus
Hactuca fylueftris	Panax
Hanaria herba	Pancratium
Haurus Alexandrina	Pafinaca fylueftris
Hcontopetalum	Periclymenum
Hibanotis	Petrofelinum
Higufticum	Peucedamum
Hithofpermum	Phu
	M. Piper

178 PRACTICÆ GENERALIS

Piper	Seseli. Siliquæ
Polium	Sinapi. Sifon
Porrum capitatum	Silymbrium alt.
Porrum sylvestre	Sium
Pseudobunium	Smilax
Pseudodictamnus	Smyrniacum
Pulegium	Solanum vesicarium
Radicula. Raphanus	Solanum somniferum
Rubia. Ruscus	Sphondilium
Ruta	Terebinthi fructus
Ruta sylvestris	Testiculus alter
Rumicis acuti radix	Thlaspi
Sabina	Thymbra
Salvia	Thymus
Sampuchum	Tilia
Scandix	Tordylium
Scilla	Tragoriganum
Scordium	Trichomanes
Scolymus	Trifolium
Squinanthum	Triflago
Semen apij	Veneris umbilicus
Semen petroselinij	Vetronica
Semen fœniculi	Vitis alba
Semen dauci	Vitis nigra
Semen seselios	Vrtica
Semen smyrnij	Xyris
Serpyllum	Zingiber, &c.

De medicamentis menstrua prouocantibus, Cap. 54.

Quæ menstrua prouocant medicamenta vehementer calida tenuiumq; partium esse debent, sed non admodum sicca, ita ut secundi vel tertij quodammodo ordinis calida sint, sicca erò primi, vel etiam secundi. Porro menses moventia urinam quoque ciunt, sed inter se differunt, quòd menses mouentia non tam valenter efficiēt, ut vretica: verū vretica ad menses prouocandas, atque ad lac generandum minimè apta sunt, utpote nimium desiccantia. At ex prouocantium menstrua genere sunt

Absynthium

Abrotonum

Acorus

Adiantum

Agaricum

Allium

Alisma

Amomum

Amygdala amara

Anemone

Anisum

Anthemis

Apium

Apiastrum

Aristolochia longa

Arthemisia

Asarum

Ascyrum

Asphodelus

Baccharis

Balsamum

Batis. Betonica

Bitumen

Bryonia radix.

Brassica. Bunium

Calamintha

Cassia odoratus

Canchamum

M 2

Cap.

180. PRACTICÆ GENERALIS

Capparis. Casia.	Glycissis
Castoreum. Cassutha	Hedera
Caucalis. Cedri fructus	Heliochrysus
Centaurium vtrumq;	Hypericum
Chamæpitys	Iasminum
Chamædrys.	Inula. Iris
Chamædaphne	Lanaria. Lauendula
Chrysocome	Lapathum
Cicer	Laureola. Læserpitium
Cinnamomum.	Laurus Alexandrina
Clinopodium	Leucoion. Libanotis
Conyza	Ligusticum
Coris. Costus	Lilij radix
Crocodilium	Lithospermon
Cucumis sylvestris.	Marrubium. Meum
Cyclaminus	Melissa. Myrrha
Cyperus	Napus. Nasturtium
Daphnoides	Nigella
Daucus. Dictamnus.	Ocelypus
Dictamnus Cretenfis	Olex æthiop. lacryma
Elæterium	Olusatrum
Elelisphacus.	Oreoselinum. Origanum
Epithymum.	Panax
Eruum	Pastinaca sylvestris
Eryngium	Pæonia. Petroselinum
Feniculum.	Peucedamum. Phu
Galbanum	Piper. Polium
Gladiolus	Porrum capitatum
	Porrum

rum sylvestre	Solaris maior
adobunium	Spica nardi. Staphys
adodictamnus	Staphylinus. Styrax
egium	Thlaspi. Thymbra
dicula	Thymus. Tilia
tundus odoratus	Tragium
tuncus	Tragoriganum
bia. Ruscus	Trichomanes
ca sylvestris	Trifolium. Triflago
apenum. Sabina	Veratrum vtrumq;
uia. Sampsuchum	Viola albæ
rdium. Serpyllum	Vitex
eli. Sison	Vitis nigra
m. Smyrnum	Vrtica, &c.

*De medicamentis menstrua sisten-
tibus, Cap. 55.*

Edicamenta quæ menstrua cohibent, an-
tedictis contraria esse debent: ut sunt

cia. Acetum	Cornu ceruinum
hera	Fagus. Fragaria
urca aceti	Glandium calyces
ustia. Berberis	Hypocystis
sa pastoris	Hyoscyamus
nabaris	Ilex
ninum	Lycium
gulum leporis	Lapis hæmatites
	M 3 Limonium

382 PRACTICÆ GENERALIS

Limonium	Rubus
Lythimachia	Rhus obsoniorum
Malum punicum ac- dum	Semperuium
Manna thuris	Sedum
Medium. Myrtus	Sanguinalis
Nymphæa	Symphitum
Oxyacantha	Solanum
Palma	Spina Arabica
Pæoniæ semen	Thus
Portulaca	Thuris cortex
Radix idæa	Vua passa cum nucl is, &c.

De medicamentis sudorem cien-
tibus, Cap. 56.

Svdores eliciunt calida, quæ extenuant & d-
gerunt humores, meatusq; rarefaciūt, vt in-
cisus humor commodè & largè erumpat. Sudo-
namque natura duce profilit, cū superuacuum
inanit humorem & egerit. Aut cū ea fuer-
imbecillior, quā vt humorem continere val-
at hiantibus iam quibus erumpit spiraculis, ei-
tenuatoq; qui excernitur humore. Sunt autem
quæ id possunt, aqua calida, vel in vtre, vel in
vesica, vel in vasculo, aut aneo, aut testaceo ac-
hibita, ferula, granum cnidium, nepeta, onobr-
chis, salis flos, &c.

De me

De medicamentis calculum frangentibus, Cap. 57.

Quæ calculum renum minuunt medicamenta valenter incidere debent, absque tamē acritate, & vehementi calore. Calida namq; & quæ calculos procreant, indurantq;. Proinde ut minus excalfaciunt, incidereq; valent, meliora sunt, veluti

Adiantum	Lanaria herba
Acerum scillinum	Lapis ophites
Alisma	Lapis spongiæ
Amygdalæ amaræ	Lithospermon
Arthemisia	Malua. Marum
Asparagus	Oculus solis. Ochra
Abiegna lacryma	Oleum amygd. amar.
Althea	Ononis
Batus. Betonica	Paliurus
Edellium	Parthenium
Carpesium	Polium. Pruna
Cerasij gummi	Radicula
Cicer. Cyperus	Rubi radix
Cicadæ vstæ	Ruscus
Cortex rad. lauri	Sium
Eryngium	Tragium. Tribulus
Foeniculum sylvestre	Vetonica
Graminis radix	Vitrum vstum, &c.

De medicamentis lac generantibus, Cap. 58.

Medicamenta, quæ lac generant modicè ex-
calfacere absq; desiccatione debent. Sint
itaq; primi vel saltem secundi ordinis excalfa-
cientium: veluti glaux herba, anethum viride, e-
ruca, foeniculum, apium, smyrnium, polium, si-
on, omnia quidem virentia.

De medicamentis, quæ crassos humo-
res in thorace & pulmone expur-
gant, Cap. 59.

Medicamenta, quæ expuitionem purulentâ
ac tenacium humorum, crassorumq; in pe-
ctore & pulmone collectorum facilem efficiunt,
vim incidendi habere debent, non tamen mul-
tum calidam, nec valdè desiccantem. Debent
autem sorbitiunculis potionibusq; humectan-
tibus admisceri, Ex horum genere sunt

Acetum scillinum	Capillus Veneris
Adiantum	Caricæ. Crocodilion
Ammoniacum	Faba. Ficus
Apiastrum	Glycyrrhyza
Amygdalearum amararum	Gummi Arabicum
Arum	Hyssopum. Helenium

rio. Iris. Ispyron	Scabiosa Scilla
Li ni semen	Tragacanthum
Marrubium. Mel	Terebinthina
Myrrha	Trichomanes
Nasturtium	Tussilago
Oleum ricinum	Thymus
Palmula. Penidia	Vrtica
Peucedanum	Vetonica
Pinea nux	Vua passa
Sagapenum	Zizipha, &c.

*De medicamentis tussim sedanti-
bus, et prouocantibus,
Cap. 60.*

Quæ tussim compescunt medicamenta, natu-
ram in crassandi habere debent. Proinde fri-
gida, & crassarum partium vt sint, necesse est. Fri-
gore enim cogit, & substantiæ suæ crassitudine
incrassat. At quæ tussim prouocant, vim extenu-
andi, acrem, & mordacem habere conuenit.
Nā quicquid mordax ac acre est, ad tussim, impe-
tum prouocat. Quapropter calida, tenuiumq;
partium vt sint, necesse est. At tussis remedia
sunt

Allium
Amygdalæ amara

Arum
Asphodelus
M s

Baccha-

186 PRACTICÆ GENERALIS

Baccharis.	Panax. Pancratium
Bdellium.	Papauer fatium
Bitumen.	Papaueris liquor.
Buglossum.	Piper. Propolis
Cardamomum.	Radicula
Cedri fructus	Ruta
Cerasij gummi	Sagapenum.
Cinnamomū.	Scilla
Daucus	Scordium
Galbanum.	Scorodopraso.
Hypecoön	Seseli
Iris. Iris.	Stichas
Laferpitium	Styrax
Lanaria herba	Sulphur
Lini semen	Tragoriganum
Marrubium	Triffago
Mel. Myrrha	Tussilago
Oleum picinū	Verbascum
Origanum	Zingiber, &c.

De medicamentis dolorem sedantibus, Cap. 61.

A Nodynorum medicamentorum, quædā reuera sunt anodyna, quædam nomine dūtatur. Reuera anodyna calida quidem sunt, & coniunctam habent partium tenuitatem. Nam tenuium partium ut sint, & calidiora, quàm syme-

symetra sunt, necesse est, vt scilicet euacuent, ac digerant, tum rarefaciant, extenuent, concoquant, & æquabile reddant, quicquid in partibus dolore vexatis, aut humorum acrium, aut lentorum, aut crassorum, aut multorum tenuibus spiramentis infarctorum, aut etiã vaporosi, aut crassi, aut admodum frigidi spiritus exitũ commodum non inuenientis inhæsit, atque inclusit. Itaque nihil prorsum adstrictionis, habeant, oportet. Anodyna verò nomine narcotica, hoc est, stupefacientia sunt, qualia sunt refrigerantia omnia. Nam medicamēta, quæ soporem exhausta conciliant, ac imposita, partem suā frigiditate stupefaciunt, temperiem sortita sunt contrariam ijs, quæ reuera sunt anodyna. Corpus enim refrigerant omnia, & sensum eousque stupefaciunt, vt si paulò liberalius exhibantur, mortem adferant. At reuera anodyna sunt

Absinthium
Acorus
Anethum
Agallochum
Agaricum
Althea
Amonium
Apollinaris herba

Asclepias
Atriplex
Chamæmelum
Cardamomum
Castoreum
Calamintha
Centaurium marianum
Cuminum

Chama-

188 PRACTICÆ GENERALIS

Chamaepitys	Malua
Daucus	Opopanax
Eryngium. Eruum	Piper. Panicum
Fœnuigræcum	Peucedanum
Ficus	Petroselinum
Iris. Iuniperus	Rorismarinum
Iuglans	Ruta
Hyoscyamus	Sisymbrium
Lini semen. Libyficū	Serpyllum
Lupus salictarius	Sampfuchus
Milium	Vitellum oui, &c.

De Soporiferis, Cap. 62.

Soporifera medicamenta ex genere anodynorum habentur, vt præcedenti capite diximus. Sunt autem hæc, veluti

Cicuta	Mandragoræ liquor
Dorycnium	Moscus arbor recens
Halicacabum	Opium
Hyoscyamus	Papauer satium
Hypecoon	Papauer erraticum
Lactuca	Pessicorum nuclei
Lapis Memphires	Solanum somniferum
Lolium	Vitex
Mandragora	Vinum recens, &c.
Mandragoræ poma	

De me-

De medicamentis venerem excitantibus, Cap. 63.

Quæ Venerem excitant medicamenta calida esse debent, & flatulenta, non siccantia. Sunt autem quæ id possunt

Acorus. Allium coctū	Napus. Nasturtium
Amygdalæ dulces	Nux Indica
Anitum. Auellana	Nux myristica
Asparagus	Nux pontica
Asphodeli radix	Orchis
Belzoinum	Oryza cum lacte cocta
Bulbus esculentus	Orminum
Ceparum semen	Oua recentia
Cervi genitale. Cicer	Palma cerebrum
Cinara fructus. Costus	Palma flos
Crocus. Cynosorchis	Passerum cerebrum
Daucus sylvestris	Pastinaca
Dracunculi marina radix	Personata radices
Encephalos. Eruca	Phaseli. Pineæ nuces
Faba. Ferula corculum	Pistacia. Piper longum
Ficus. Fraxini semen	Porri semen
Galanga. Galij radix	Rapæ semen
Gladiolus. Garyophylli	Satyrion primum
Lac omne.	Satyrion alterum
Mala insana	Scincus.
Mentha viridis.	Scorodoprasson
Muscus	Semen lini

190 PRACTICÆ GENERALIS

Sifer	Tubera
Sepia cum allio	Vrticæ semen
Testiculus herba, rad.	Xyli semen
Testiculus alter	Xyphij radix
Testiculi gallorum	Zibetum, &c.
Testiculi aprugni	

De spermaticis, Cap. 64.

Spermatica sunt tum cibi qui bene nutriunt, & flatuosi sunt, totisq; substantijs similes, tū medicamenta flatuosa, & modicè calida, cuiusmodi sunt

Amygdalæ dulces	Nux Indica
Anisum	Oryza cum lacte cocta
Asparagus	Oua recentia
Acorus	Passerum cerebella
Bulbus	Pastinaca
Cicer	Phaseli
Cynosorchis	Pistacia
Encephalos	Rapum
Eruca	Satyrium primum
Ficus	Satyrium alterum
Lac omne	Semen lini
Napus	Sifer
Nuclei pinei	Testiculi gallorum, &c

*De medicamentis, quæ ambustis
conueniunt, Cap. 65.*

Ambustorum medicamina sunt althea, adi-
tum, adeps suillus, alumen scissile, anchusa,
arction, ascyron, atramentū librariū, beta, bulbi,
cinnabaris, gallion, glutinum, hедера, hemero-
callis, hypericon, hiacynthi, lactuca sylvestris, li-
lium, lingua canis, mori arboris folia, muris au-
ricula, oleum myrtheum, oliuæ salsa, oua, picea,
platanus, sambucus, sedum maius, stercus ouil-
lum, terra chia, terra felinūsa, terra cimolia, ty-
pha, verbascum, &c.

*De medicamentis simplicibus digesti-
uis, seu concoquentibus, Cap. 66.*

Nunc autem de digestiuis simplicibus, vsua-
libus dicendum, quæ quidem talia dicun-
tur, quod præparent humores ad expulsionem.
Est enim digestio, si re concoctio nihil aliud, *concoctio
humorum*
quam preparatio humoris ad expulsionem. Hæc
autem preparatio fit vel in humoris substantia, *hæc præparatio*
vel in qualitate. In substantia quidem, crassus
attenuandus seu subtiliendus, tenuis incrassan-
dus, viscosus incidendus venit, & sic de alijs. In
qualitate verò, vt calidus infrigidandus, frigidus
calfacien-

192 PRACTICÆ GENERALIS
calefaciendus, humidus exiccandus, & siccus
humectandus, &c. Humores autem qui digesti
onem recipiunt tres tantummodo sunt, bilis re
licet flava, pituita, & atra bilis. Sanguis enim di
gestionem non recipit, cum sit semper ad exitum
preparatus.

De medicamentis bilem flavam
concoquentibus Cap. 66.

IN CAPIT.

Acetum	Opium
Caphura	Papauer album
Hyoscyamus	Rosa
Lactuca	Salicis folia
Nenupharis folia	Viola purpurea, &c.
Nenupharis flores	

IN PECTORE.

Amylum	Papaveris albi semen
Gummi arab.	Sebesten
Iuiuba	Tragacanthum
Mora celsi	Viola, &c.
Papauer albū	

IN CORDE.

Acetosa	Acetosa semen
Acetositas citri	Caphura. Carabe.
Acetositas limonum	Citri semen
Acetum	Corallium
	Corian.

Coriandrum	Nenupharis flores
Cotonea mala	Os de corde cerui
Acetofum	Pira
Lapis hiacynthus	Rafura eboris
Lapis Smeraldus	Rosa
Margaritæ	Viola, &c.
Nenupharis folia	

IN STOMACHO.

Acetofitas citri	Mespila
Aurantia mala	Pira syluestria
Citrulli	Portulaca
Cotonea mala	Prunella
Cucumeres	Rosa
Cucurbita	Semperuiuum
Mala punica	Solatrum
Myrthus	Sorba
Melones	Viola, &c.

IN HEPATE.

Berberis	Portulaca
Caphura	Rosa
Cichorij rad.	Sandali omnes
Endiuiâ	Semen melonum
Hepatica	Semen cucurbitæ
Lactuca	Semen cucumeris
Nenupharis folia	Semen citrulli
Nenupharis flores	Semen endiuiæ
	N Semen

194 PRACTICÆ GENERALIS

Semen lactuæ	Solatrium
Semen scariolæ	Spodium, &c.
Semen portulacæ	

IN SPLENE.

Acetum	Semen citrulli
Cichorium	Semen cucumeris
Endiuiæ	Semen endiuiæ
Lactuca	Semen portulacæ
Sandali omnes	Semen lactuæ
Semen melonum	Semen scariolæ
Semen cucurbitæ	Spodium, &c.

IN RENIBVS, ET vesica.

Endiuiæ	Semen cucurbitæ
Lactuca	Semen citrulli
Nenupharis folia	Semen cucumeris
Nenupharis flores	Semen endiuiæ
Portulaca	Semen portulacæ
Papauer album	Semen lactuæ
Plantago	Semen scariolæ
Semperuium	Succus citoniorum
Semen melonum	Virga pastoris, &c.

IN MATRICE.

Cucurbita	Nenupharis flores
Endiuiæ	Papauer album
Lactuca	Portulaca
Nenupharis folia	Rosa

emperuium	Semen lactucæ
emen cucurbitæ	Semen portulacæ
emen melonum	Semen scariolæ
emen citrulli	Succus citoniorum
emen cucumeris	Virga pastoris, &c.
emen endiuia	

IN IUNCTURIS.

ciacia	Hyoscyamus
album oui	Lactuca
cerum	Pisillum
olus Armenus	Rosa
ndiuia	Sanguis draconis
olia salicis	Semperuium
olia vitis	Solatrum
olia graminis	Terra sigillata
olia myrthi	Viola purpurea, &c.

De medicamentis simplicibus, pituitam concoquentibus, Cap. 68.IN CAPITE.

mbra	Flores meliloti
etonica	Flores betonicæ
hamomilla	Folium
alamintha	Ladanum
ubebe	Lapendulæ flores
eniculum	Lauri folia
lores chamomillæ	Maicrana. Melilotum
N 2	Molichus

196 PRACTICÆ GENERALIS

Moschus	Saturegia
Nux moschata	Serpyllum
Pæonia	Stœchas
Pulegium	Siler montanus
Radix fœniculi	Semen maioranz
Radix pæoniæ	Semen fœniculi
Rosmarinus. Ruta	Thus
Salvia	Xylobalsamum, &c.

IN PECTORE.

Aristolochia rotunda	Marrubium
Betonica	Melissa
Capillus Veneris	Passiflæ
Dactyli	Prassium
Enula	Radix aristolochiæ
Ficus	Radix ireos
Flores liliorum	Radix enulæ
Flores scabiosæ	Radix liquiritiæ
Flores Betonicæ	Scabiosa
Flores melissæ	Serpentaria
Glycyrrhiza	Semen vrticæ
Hyslopum	Vrtica, &c.
Iris	

IN CORDE.

Ambra	Cinnamomum
Aurum	Citri cortex
Been album	Cotula montana
Been rubrum	Crocus
Caryophylli	Enula campana

Flor

ores anthos	Nux moschata
ores melissæ	Ocimum
olia citri	Rosmarinus
lacis	Semen ocimi
leliffa	Xyloaloes
loschus	Zedoaria, &c.

IN STOMACHO.

absynthium	Macis
ammi	Mentha
anifum	Nux moschata
Calamus aromat.	Piper
Cardamomum	Radix fœniculi
Caryophylli	Raphanus
Cinnamomum	Semen anisi
Cuminum	Semen cumini
Fœniculum	Semen ameos
Galanga	Serpyllum
Gallia moschata	Zingiber, &c.
Lignum aloes	

IN HEPATE.

absynthium	Carum
ammi	Cuminum
anemum	Cyperus
Anifum	Dauci semen
Apium	Eupatorium
Asparagus	Fœniculum
Asarum	Flores spicæ
Cinnamomum	Flores origani

N 3

Flores

13: PRACTICÆ GENERALIS

Flores sambuci	Semen fœniculi
Hyssopus	Semen cumini
Origanum	Semen carei
Petroselinum	Semen ameos
Radix apij	Semen amomi
Radix fœniculi	Semen apij
Radix petroselini	Semen dauci
Radix rufci	Semen asparagi
Radix asparagi	Spica
Rufcus	Squinanthum, &c.
Semen anifi	

IN SPLENE.

Absynthium	Radix Apij
Acorus	Radix fœniculi
Aristolochia	Radix petroselini
Asarum	Radix rufci
Anisum. Apium	Radix asparagi
Asparagus	Radix aristolo-
Amygdalæ amara	chia
Calamintha	Radix gentianæ
Cappares	Radix fraxini
Cortex capparis	Radix acori
Carum	Rubia tinctorum
Eupatorium	Semen anifi
Fraxinus	Semen carei
Gentiana	Semen nasturtij
Nasturtium	Tamarix, &c.

LIBER IV.
IN RENIBVS, ET

199

vesica.

rodium cicerum ru-	Pentaphyllon
brum	Saxifragia
cicer	Semen erucæ
tubebe	Semen vrticæ
ruca	Semen saxifragiæ
granum pini	Spica nardi
uniperus	Spica celtica
melilotum	Radix quinquefolij
arietaria	Vrtica, &c.

IN MATRICE.

arthemisia	Opopanax
calamintha	Pulegium
uniperi baccæ	Rubia tinctorum
oschus	Ruta
iatricaria	Sabina
melissa	Semen rutæ
myrrha	Serapinum
nux moschata	

IN IUNCTVRIS.

Ammoniacum	Flores chamomillæ
Castoreum	Flores meliloti
Chamomilla	Hermodactyli
Costum	Hypericum
Euphorbium	Iuniperus
Eupatorium	Melilotum
Flores anthos	Myrrha

N 4

Nastur

200 PRACTICÆ GENERALIS

Nasturtium	Stichas
Oleum iuniperinum	Styrax liquida
Radix costi	Squilla
Radix zingiberis	Semen rutæ
Radix hermodactyl.	Semen nasturtij
Ruta	Semen sinapi
Rosmarinum	Stercus caprarum
Salvia	Stercus vaccarum
Sinapi	Zingiber, &c.

De medicamentis bilem atram con- coquentibus, Cap 69.

IN CAPITE.

Fumus terræ	Oxymel
Lupulus	Poma dulcia, &c.

IN PECTORE.

Acorus	Flores melissæ
Dactyli	Melissa, &c.

IN CORDE.

Borrago	Flores melissæ
Buglossa	Melissa
Flores anthos	Radix Buglossæ
Flores Buglossæ	Rosmarinus, &c.
Flores borraginis	

IN HEPATE.

Asarum	Fumus terræ
Cichorium	Lupulus

Radix

Radix cichorii

Radix polypodij

IN LIENE.

Acorus

Radix acori

Amygdalæ amara

Radix polypodij

Cappares

Radix buglossæ

Cortex cappararum

Radix tamaricis

Cortex tamaricus

Scolopendria

Cuscuta

Tamarix

Epithymum

Thymus, &c.

Polypodium

*De seminibus calidis maioribus
& minoribus, Cap. 70.*

CALIDA MAIORA.

Anisi

Cumini

Fœniculi

Carui.

CALIDA MINORA.

Amcos

Apij

Amomi

Dauci.

*De seminibus frigidis maioribus, &
minoribus, Cap. 71.*

FRIGIDA MAIORA.

Melonum

Cucumeris

Cucurbitz

Citrulli.

N 5

MINO.

202 PRACTICÆ GENERALIS
MINORA.

Laſtuca	Scariola
Endiuia	Portulaca

RADICES QVINOVE.

communes.

Apij	Asparagi
Fœniculi	Rufci.
Petroſelini	

De medicamentis purgantibus, Cap. 72.

HAecenus de digeſtiuis medicamētis ſimpli-
cibus, nunc de purgantibus agendum vide-
tur. Sunt autem medicamenta purgantia omnia
calida, & attrahētia qualitatū familiaritate, hoc
eſt torius ſubſtantia ſimilitudine. Qua ratione
attrahunt & ſtirpes, & vnaquaq; planta, animā-
tiumque ſingularim quaque particulā familia-
re ſibi nutrimentum. Hoc modo attrahunt,
medicamenta purgantia omnia. Siquidem me-
dicamenta purgantia detrahendis quidem hu-
moribz ſunt familiaria: quæ verò attrahūt quo-
dammodo ſunt efficaciora valentioraque, ſicuti
cnicus à pituita natura alienus non eſſe de-
prehenditur, vti & calore ſuo præ ſe fert, ſed ta-
men calore ipſo quàm pituita valentior, vt tra-
here quàm trahi magis par ſit. Calida itaque
vt ſint id genus omnia, neceſſe eſt. Nam inter ea
quæ ſibi ſubſtantijs ſimilia ſunt, quod calidius
eſt, id

est id, potentius attrahit, vtpote, quod essentie
similitudini calorem adiunxerit, auxiliarium.
Porro inter purgantia medicamenta sunt non-
nulla, quæ mordicando, irritando, & quodam-
modo conuellendo purgant, cuiusmodi sunt, vi-
trum, & flores antimonij, & squama æris, & si-
milis. Hæc namq; quodammodo mordicant.
Mordicatio verò organa ad excretionem exci-
tat. quò fit, vt cum superiores ventriculi partes
irritentur mordicante medicamento aliquo per
vomitus: cum verò inferiores, per aluum deij-
ciant id, quod in eo continebatur.

*De medicamentis bilem flauam pur-
gantibus, Cap. 73.*

Medicamenta purgantia flauam bilem, qui-
bus communiter practicanes hoc die vtun-
tur, sunt

A L O E, succus est, optima est pinguis, are-
nularum expers, rufi coloris, friabilis, iocinoris
modo coacta, facillè liquefcens, odorata, & ama-
rissima. *Dosis est ab aureo semisse ad drachmas*
duas in infusione verò ab aureo vno vsq; ad dra-
chmas tres. Bilem & pituitam purgat: affectibus
ventriculi & cerebri confert: hamorrhoidibus
& sedi nocet.

C A S S I A nigra est fructus oblongus, teres
fistulo-

Mastic.
Sp. hien.
Idole. Dier.
gacris. Sinc.
mag. mo.
masos. Spic.
Cap. op. yll.
à 2j. ad 3j.

fistulosus, intus humorem nigrum continens.

fistulosus, intus humorem nigrum continens.
 Eligenda est ponderosa, plena, quæ cōcussa, clau-
 sis intus granis non strepat. Extrahitur recens,
 daturq; omni ætati: imbecillioribus quidem dra-
 chmā quatuor: robustioribus autem & adultis
 uncia, vel sescuncia, vel drachmā decem, mane,
 vel ante coenam, in forma boli, vel potionis. In
 forma boli hoc modo. ꝛ Cassiæ nouiter tractæ
 ꝑ. 10. vel 12. cum saccharo fiat bolus. In forma
 verò potionis sic: ꝛ Cassiæ recent. tractæ. ꝑ. 12.
 Dissoluatur cum decoctione, flor. & fructuum,
 fiatq; potus, cui adde Syrupi violacei ꝑ. 1. Clemē-
 ter & innoxie à ventriculo bilē & pituitam pur-
 gat leniendo, febribus inde ortis confert, &c.

*Ann. Cin.
E.
ab 3. r. 23. j.* **MANNA** ros est, qui herbis, arboribus, & lapidib. interdum in hærere inuenitur. Praefertur Calabra. Dosis ei⁹ est a drachmis sex, vsq; ad uncias duas in forma potionis hoc modo: R. Mannæ electæ ʒ. i. s. vel ʒ. 2. Dissoluatur cū decoctiōe florum & fructuum, fiatq; potio, cui addē syrupi ros. lax. ʒ. i. Eadem cassia nigræum habet. flauā enim bilem clementer purgat, daturq; ijs, qui certa ratione validius medicamētum respuunt.

Ficus *citrina* *Arabum* *fructus* *sunt* *Laudantur* *multum* *flauis* *in* *viride* *inclinantes* *densa* *grauis* *gummosa* *corticis* *crasso* *os* *paruum* *complectente* *Dosis* *in* *substantia* *est* *a* *drachmis* *duabus* *vsq;* *ad* *drachmas* *quinque*

que: in infusione verò à drachmis quinque vsq; ^{30. 2. 22.}
ad viginti. Bile in à ventriculo purgant, febribus
biliosis conferunt. Cauendus tamē eorum vsus
in viscerum obstructionibus. Corriguntur cum
amygdalis dulcibus, vel passulis.

SCAMMONIVM succus est. Laudatur
nitidum, rarum, leue, colore quā simillimum
taurino glutini, fungosum, tenuibus fistulis. Da-
tur per se à granis quinque ad duodecim. Obest
cordi, ventriculo ac iecori totius substantiæ suæ
propriate. Corrigitur aniso, mastiche, tragacā- *Corrobor.*
tho, tum calidis, tum frigidis, quæ cordi, iecori,
ventriculoq; opem suam præstant. Deijcit bilē
valentissime.

SYCCVS rosarum, vel infusio ipsarum da-
tur ab vncia vna, vsq; ad vncias duas. *ab 3. ad 4.*

RHABARBARVM radix est crassa. Lau-
datur Indicum recens, graue, confractum, ex ru-
fo & glauco alternans, & croci modo tingens.
Corrigitur tertia parte spicæ Indicæ, vel cinna- *Corrobor.*
momi. Dosis in substantia cōmuniter est pōdere
duarum, trium, aut quatuor drachmarum, cū se- *ad 3. iij.*
ro lactis, vel decocto cichorii, hoc modo: R. Rha-
barbari electi ʒ. 3. vel 4. Spicæ Indicæ ʒ. i. pulue-
rizētur subtiliter, & cum decoctione cichorii fi-
at potus, cui adde syrū violacei ʒ. i. In infusio-
ne verò à drachmis tribus vsque ad sex, vel
decem, pro virium & ætatis ratione. Hac
ratione

206 PRACTICÆ GENERALIS.

ratione: R. Rhabarbari electi ℥. s. vel 6. Squina-
thi ℥ 2. misce, puluerizando omnia crasse,
funde per horas septem in sufficiente quantita-
te vini odoriferi: deinde fortiter exprime, &
cum aqua endiuæ vel decoctione florum & fru-
ctuum fiat potus, cui adde syrupi rosati laxatiui
℥ 1. Purgat clementer bilem flauam, præcipue à
ventriculo, & hepate: obstructionsque li-
berat.

TAMARINDI dactyli sunt acidi, fructus
palmarum syluestris Indicarum. Probantur recetes, pin-
gues, non retorridi, ex dulcibus acidi, & vino so-
lapore. Dosis in infusione vel decoctione seri la-
ctis est ab uncijis duabus, vsq; ad uncias quinque.
Flauam purgat bilem, sitim restinguit, febre-
que acutas sanat.

SERVM lactis siue aqua cassi, est medicina
lenitiua & laxatiua. Dosis eius est ab uncijis tri-
bus vsque ad uncias quinque.

De medicamentis purgantibus pi-
tuitam, Cap. 74.

EX medicamentis pituitam purgantibus, qui-
bus hodie practicantes vtuntur, vltatiora sunt.

AGARICVS nascitur in arborum truncis,
veluti fungus. Eligendus est albus, porosus, leuis
fragilis, leuis, primo gustu dulcis. Aduersatur
ventricu-

culo, quòd sua leuitate emergens enatet. Infrenatur eius malicia, adieſta tertia parte Zingiberis, vel ſalis gemmæ. Sumitur autem in ſubſtantia, vel in infuſione. In ſubſtantia doſis eſt à drachma vna uſque ad duas, hoc modo: R. Agarici opt. ℥ i. ſalis gemmæ, vel Zingiberis ℥ i. puluerizetur, & cum decoctione florū & fructuum fiat potus, cui adde Mellis roſati colati ℥ i. Vel ſic: R. Agarici electi ℥ i. Salis gemmæ ℥ i. cinnamomi parum, miſce & ſiant pilulæ, vel puluis. In infuſione verò doſis eſt à ℥ 2. uſq; ad quinq; hoc modo: R. Agarici electi ℥ 2. vel 3. Zingiberis ℥ 2. vel ℥ i. puluerizentur, & infundantur per horas 7. in ſufficiente quantitate oxymellitis ſimplicis: fiat omnium fortis expreſſio, & cum decoctione florum & fructu: fiat potus, cui adde mellis roſ. col. ℥ i. Purgat pituitā craſſam, lentam, putridam, & bilem ſlauam, &c.

MECHOACA, radix eſt Indica, quā aliqui Rhabarbarum albū appellant. Sumitur in ſubſtantia tantum, ſcrupulorum duorum, vel drachma vnius pondere cum brodio carnis, vel vino abſynthiaco, vel dulci odorifero hoc modo: R. Rhabarbari albi ℥ i. Gentianæ ℥ i. Cinnamomi ℥ s. Fiat puluis, & cum hauſtu vini abſynthiaci ſumatur tribus horis antepaſtum. Purgat pituitam & aquoſos humores ſine moleſtia. Cōfert dolori capitis diuturno, febribus.

208 PRACTICÆ GENERALIS
bribus, colicis, hydropicis, & asthmaticis, &c.

TURBITH laudatur vacuum, arundinum, fragile, & plani corticis turbith, gummi & albidum. Dosis in substantia, perinde ac que agarici est. Datur cum melle, rosaceo, passularum decocto. Eodem etiam modo in infusione.

ā ʒij. ad ʒij.
Sal. gum.
Cin. p. nigr.
Mastic.
filiat. o. amygd.

Correctio eius pars tertia zingiberis. Eius Purgat lentam, & crassam pituitam: longis morbis medetur apoplexiæ, epilepsiæ, insanix & furori, &c.

ā ʒij. ad ʒij.
Anis. ʒ. ʒ.
masic. Cin.
Sal. gum. Recb.
Pell. ʒ. ʒ.

CNICI, seu Cartami seminis dosis est à drachmis tribus usque ad aur. quinque. Datur cum aqua mulsæ, vel iure gallinaceo, vel ptisanæ cremore. Pituitam purgat: sed stomacho aduersatur.

Galliamoscb.
Spica.

ʒj.

COLOCYNTHIS est cucurbitæ sylvestris fructus. Huius medulla in usu est. Eligenda autem est candida, & recens. Corrigitur mastiche, zingibere, cinnamomo, caryophyllis, turgacatho, vel bdellio. Datur saltem robustis senibus cum aqua, mulsæ, quatuor obolorum pondere. Pituitam, bilem, humoremq; mucosum purgat: confert cephalalgia, hemicrania, epilepsiæ, apoplexiæ, vertigini, podagra, coxæ dolore, asthmati, tussi, & spirandi difficultati, &c.

HERMODACTYLVS radix est officinalis. nota. Probatur plenus, candidus, grauis, non carius.

carie affectus. Datur drachma vnius pondere, 3j.
 aut paulo plus. minusue pro sumentis viribus,
 cum melle rosaceo, vel oxymellire scillirico.
 Corrigitur cinnamomo, mastiche, Zingibere, ^{Spica.}
 aut pipere longo. Pituitam crassam à iuncturis ^{Chutinis.}
 trahit, &c. ^{Numbal.}

ELATERIVM, cucumeris sylvestris succus est. Dosis à granis decem vsq; ad drachmam ^{à gr. 10. ad 35.}
 limidiā cum lacte. Pulueris radices eius à gr. 5. ad
 3 5. Aquæ decoctionis radices à 3 2. vsque ad 4.
 Corrigitur tragacantho, vel bdellio, vel masti- ^{Cine? Spica.}
 che. Datur quoque elaterium in forma pilula-
 um hoc modo: ʒ. Elaterij ʒ. i. masticis ʒ. 5. cum
 syrupo de mentha fiant pilulæ. Dentur duæ vel
 res ad summum. Purgant pituitam, bilem, &c.
 quam.

MEZÆREI siue Thymeleæ dosis est à ʒ. 5. ^{à 35. ad 3j.}
 vsque ad ʒ. i. in decoctionibus. In puluere verò à
 ʒ. i. vsque ad 5. Malitia eius frangitur, si per
 nem in acetū infundatur. Porro psilij mucilagi- ^{Succo olivæ}
 ne extinguitur, vel portulacæ, vel endiuæ succo. ^{cautiv. it}
^{malis p. uici}
^{et Colicis.}

EUPHORBIVM gummi est: Dosis à Kira-
 ʒ. i. vsque ad 3. Alij verò à granis quatuor, vsque ^{à gr. 4. ad}
 ad duodecim. Corrigitur autem aniso, mastiche, ^{Cine}
 & spica. Datur ex aqua mulsa. Præstat autem cum
 melle cocto in pilulas digerere. Pituitam & a-
 luam subducit: medetur colicis, & aluum fri-
 diorem habentibus.

210 PRACTICÆ GENERALIS

MYROBALANA Chebula pituitam de-
 a 3ij. ad 3ss. trahunt. Dosis in substantia est à drachmis dua-
 bus, vsque ad drachmas quatuor: in infusione
 a 3iij. ad 3ss. vero à drachmis quatuor vsque ad decem. Te-
 rantur autem cum amygdalis dulcibus vel pas-
 sulis, &c.

MYROBALAN. emblicorum dosis. in
 a 3ij. ad 3ss. substantia est ab aureis duobus vsque ad aureo-
 tres, in infusione vero ab aureis tribus vsque ad
 ab 3ss. ad 3ss. sex. Pituitam trahunt, profunt nervis, & veteri-
 nosi, mentis aciem exacuunt, ventriculum pu-
 gant, &c.

MYROBALAN. Belliricorum dosis: per
 inde est, vt emblicorum & citrinorum: eiusdem
 que quasi natura sunt, vt emblica, &c.

OPOPANAX ferula liquor est. Optimus
 a 3ss. ad 3ss. qui intus albus est, foris flauus, amarus, fragili-
 a 3ss. ad 3ss. odoris boni. Datur à drachma vna ad duas. Co-
 rrigitur mastice, & spica. Purgat pituitam crassam
 & lentam à cerebro, nervis, thorace, & iusturi-

SERAPINVM, vel Sagapenum ferulace-
 a 3ss. ad 3ss. herba succus est. Eligitur sulum, intus album
 a 3ss. ad 3ss. acre. Datur à drachma semisse ad drachmas
 vnam cum aqua ruta vel enula. Purgat pitui-
 tam, humores crassos & lentos, & aquas à ven-
 triculo. Corrigitur mastice & spica, &c.

De medicamentis atram bilem pur-
gantibus. Cap. 75.

COLUTEA siue Sena eligenda est Alexan-
drina, folijs viridibz, subalbidis, et tenuibus.

Dosis pulueris drachma vna: in infusione verò ʒj. ʒss.
vel decocto vncia semis. Corrigitur Zingibere, *Cin. Sal. ʒss.*
& c. Purgat bilem atram, tum flauam pituitam *ʒij.*
citra noxam.

EPITHYMVM datur in puluere scrupu-
lorum quinque aut drachmarum duarum pon-
dere cum passo vel oxymellite: in decoctione
verò à drachmis quinque ad viginti vsque. Non
detur astatē, & parum coquatur. Corrigitur ad-
iecta tertia parte salis gemmæ, vel salis Indi: &
oleo amygdalarum incorporetur, & exhibea-
tur cum decoctione myrobalanorum Indorum,
mellis & passularū. Atram bilē purgat, vitij statu
turgētibus, & hypochōdriorū noxis opitulatur.

ELLEBORVS niger radicem habeat bene
nigram, corpulentam, plenam, acrem. **Dosis** pul-
ueris à siliquis sex vsq; ad scrupulum vnum, vel
duos cum passo, vel oxymellite. Corrigitur cin-
namomo, foeniculo, aniso, mastiche, passo, &
oxymellite. Atram, flauamq; bilem è toto cor-
pore trahit, nec tamē citra vllam difficultatem.

EVMVS terræ humorem melancholicum
euacuat. Succus dosi non debet transcendere

212 PRACTICÆ GENERALIS

ab 3. ad 4. vncias duas: Decoctionis verò est ab vncijs tribus ad vncias quinque vel sex. Corroboratur tamen in operatione dādo ipsum cum sero lactis, & cum decoctione passularum, & cum succo absynthij, &c.

a 3. ad 4. MYROBALANA Inda atram bilem detrahunt. Dosis in substantia est à drachmis duabus ad drachmas quatuor: in infusione, à drachmis quatuor vsque ad decem.

3. ad 4. LAPIS Armenius preparari sup lapide, vel in mortario debet. lauatur vicies cum aqua, & terendo lauatur decies cum rosarum aqua. Administratur cum diaborraginato, vel aqua buglossæ, vinoque odorifero. Dantur scrupuli quatuor, aut paulò plus. minusve pro sumentis viribus. Atram bilem, & omnem lentum crassumque humorem educit, citra omnem molestiam.

a 3. ad 4. LAPIS Lazuli seu Stellatus sicut lapis armenius preparari debet. Dosis abluti à drachma vna vsq; ad duas est. Corrigitur vt lapis armenius. Purgat melancholiam egregie, sed magis turbat armenio lapide.

Corrall. POLYPODIUM probatur quercinum, recens, dulce, austerum. Corrigitur aniso, Zingibere, caryophyllis, & cinnamomo. Dosis à drachmis duabus ad aureos quatuor, cum aqua multa: mediocriter verò aluum ciēt, & citra molestiam, tum in gallinaceo iure, tum in cremore ptisanæ.

prisanæ cocta radix. Bilem atram & pituitam extrahit. Hæc de medicamentorum qualitate nobis sufficiant, reliquum nunc est, vt de remediorum quantitate, loco, & tempore agamus, exordium à remediorum quantitate sumentes.

De remediorum quantitate, Cap. 76.

Icet præcedentibus tribus capitibus de purgantium dosi in specie aliquid dixerimus, hic tamen etiam de remediorum quantitate in vniuersum agendum esse videtur. Nisi enim iustam remediorum quantitatem obseruauerit Medicus, parum aut nihil in præxi proficere videbitur. Est itaque Medico remediorum quantitas maximè necessaria. Non enim omnibus vna eademque medicamenti mensura conuenit, sed pro diuersa ratione, complexionum, partium læsarum, morborum, virium, ætatis, temporis, & consuetudinis augenda, vel minuenda est. *Partes vniuersales vnde hæc Geniua.*

Natura namque calidiores magis calefaciendi: 1.
 frigidiore minus: sicciore verò magis quam
 humidi siccandi sunt. Quod ad partes læsas atti- 2.
 net, nobiliores, cuiusmodi est cor, cerebrum, hepar, & ventriculus, minus ac blandius medicamentum exposcunt: ignobiliore verò, vt ossa, cartilagine, crura, &c. maius, ac vehementius

O 3 medica-

214 PRACTICÆ GENERALIS

2. medicamentum desiderant. Sic quoq; partes in superficie posita, minus: quæ verò in alto abscondita sunt, maius medicamentum efflagitât.
3. Porro morbi quoq; tum qualitas tum quantitas medicamentorum quantitatem immutant. Si quidẽ maligni, & magni morbi, maius: benigni verò, & parui, minus medicamentũ poscunt. Eadem ratione virtus valida, maius: imbecillis verò minus remedium admittit; nec pueri tã magna, sicuti adulti medicamenta tolerant. Præterea tempora tum morbi, tum anni minimẽ negligenda veniũt. Nam in morborum principio, minus medicamentum offerendũ est, nisi materia turgeat valdè: in augmento, & vigore adhuc minus pharmacum dādum, in declinatione verò maius præbendum est. Sic quoque ver, & autumnus, maius exposcunt remedium: hyems verò & æstas, minus. Eadem ratione, regio temperata, maius: intemperata verò, minus medicamentum feret. Rursus consueti maius, insueti minus remedium efflagitant. Quapropter & natura tum corporis, tum partium, nec non morbi qualitas, & quantitas, & virium robur, & ætas, tempusq; tum anni, tum morbi, & consuetudo, circa remediorum quantitatem, maximẽ perpendenda sunt. Vtrum autem semel vel bis medicamentum sit exhibendum, indicabit nobis tum virtus, tum morbi quantitas & locus affectus.

Siqui.

*Quoties sit
exhibendum.*

Siquidem natura seu, virtus valida, rarius: imbecilla, frequentius medicamentū admouendum esse indicat. Sic morbus diuturnus, frequentius: brevis verò, rarius medicamentū exhibendum esse insinuat. Ad eundem modum affectus in superficie corporis, rarò: in profundo verò, in quem medicamenta non facile penetrant, frequenter remedium admouendum ostendit.

De remediorum loco, Cap. 77.


VBi autem & quibus partibus remedia sint aptanda, ipse locus affectus indicabit. Partibus namque externis (quo sensui oculorum subijciuntur) affectis, forinsecus medicamenta applicanda sunt. Internis verò læsis, partim per ea quæ intrinsecus sumuntur, partim per ea, quæ forinsecus apponuntur, succurrimus. Porro in alterando, caput remedia cephalica: cor, cordilia: pectus, pectoralia: stomachus, stomachica: hep̃ar, hepatica: lien, splenitica: vterus, vterina medicamenta efflagitat. In euacuando, verò, cerebrum per palatum, nares, & aures purgatur. Sic venter vomitu, deiectioneq; inanitur. Intestina deiectione tantum, sicut iecinoris caua. Pectus, & pulmo, per tussim. Renes verò, & iecinoris gibba, & vesica, si multo vitioso succo sint referta per deiectiones, & pharmaca


216 PRACTICÆ GENERALIS
deiectionia expurgantur: sin modico fuerint re-
ferta, per vrinarios meatus. Verus per clysteres
vel pessos euacuatur, &c.

De remediorum tempore, Cap. 78.

PORRò in remedijs adhibendis, tempus oportu-
num maximè considerandum venit: id au-
tem indicabit nobis morbi tempus tum vniuer-
sale, tum particulare. Siquidem in febrium prin-
cipio, augmento, & statu, alterantibus, & con-
coquentibus vtendum est medicamentis, nisi
materia turgeat, & venenosa sit: in declinatione
verò euacuantibus. Sic quoq; in tumorum prin-
cipio repellere, cōmodè licebit: In augmen-
to verò repellere, & resolvere simul: in statu, re-
solvere tantum & discutere conueniet. Ad eun-
dem modum in accessionum principio, vomitum
prouocare licebit: in augmento, & statu,
quiescendum omnino erit: in declinatione ve-
rò concoquentibus, euacuantibus, & corrobora-
ntibus vti non erit inconueniens. Sed hæc de
medicamentis simplicibus nobis sufficiant, ad
compositorum tractationem, nunc transeun-
dum est.

PRA-





PRACTICAE GENERALIS

LIBER V.

ARGVMENTVM.

Præcepta tradit, quæ ad compositiones medicamentorum, tam orum quæ intrinsecus sumuntur, quàm quæ corpori extrinsecus admoventur, attinent.

Eius capita hæc sunt:

De Syrupis,	Cap. 1.	222.
De Syrupis concoquentibus bilem flavam,	Cap. 2.	224.
De Syrupis concoquentibus pituitam,	Cap. 3.	227.

N 3 De

229. De syrupis concoquentibus atram
lem, Cap.
230. De syrupis digerentibus humores
xtos, Cap.
231. De syrupis laxantibus, Cap.
232. De iulapijs, *Emulio. 232.* Cap.
233. De eligmatis, Cap.
235. De rob, Cap.
236. De decoctis, Cap.
237. De decoctis alterantibus, Cap.
239. De decoctis alterantibus, simul & purga
tibus bilem flauam, Cap.
242. De decoctis alterantibus & purgantibus
pituitam, Cap.
246. De decoctis alterantibus & purgantibus
melancholiam, Cap.
248. De decoctis alterantibus & purgantibus
humores mixtos, Cap.
251. De infusionibus, Cap.

- de infusionibus purgantib. bilē, Cap. 17. 253.
 de potionibus purgantibus, in substantia sumptis, Cap. 18. 253.
 de medicinis lenientibus, Cap. 19. 256.
 de medicinis solutiuīs, Cap. 20. 256.
 de potionibus purgantibus, partim infusis, partim in substantia sumptis, Cap. 21. 257.
 de bolo purgatorio, Cap. 22. 260.
 de pilulis, Cap. 23. 262.
 de pilulis purgantibus bilem flauam, Cap. 24. 263.
 de pilulis purgantibus pituitam, Cap. 25. 264.
 de pilulis purgantibus melancholiam, Cap. 26. 266.
 de clysteribus, Cap. 27. 267.
 de clysteribus alterantibus, Cap. 28. 269.
 de clysteribus purgantibus, Cap. 29. 273.
 de suppositorijs siue glandibus, Cap. 30. 277.
 de pēsis, Cap. 31. 279.

De

283.	De errhinis,	Cap. 32
284.	De caput purgijs,	Cap. 33
285.	De sternutamentis,	Cap. 34
286.	De apophlegmatismis,	Cap. 35
287.	De gargarismatis,	Cap. 36
290.	De Trochiscis,	Cap. 37
293.	De collyrijs,	Cap. 38
296.	De electuarijs,	Cap. 39
305.	De tabulis & rotulis, et morsellis,	Cap. 40
310.	De Trageis, siue tragematis	Cap. 41
315.	De pulueribus,	Cap. 42
317.	De pulueribus purgantibus,	Cap. 43
319.	De dentifricijs,	Cap. 44
320.	De pomis odoratis,	Cap. 45
322.	De suffimentis,	Cap. 46
325.	De linimentis,	Cap. 47
331.	De vnguentis,	Cap. 48
335.	De fomentis,	Cap. 49
337.	De epithematibus,	Cap. 50
		De

De saeculis,	Cap. 51.	340.
De cataplasmatibus,	Cap. 52.	345.
De emplastris,	Cap. 53.	347.
De cerotis,	Cap. 54.	349.
De scutis,	Cap. 55.	352.
De embrochis,	Cap. 56.	353.
De balneis,	Cap. 57.	354.
De collutionibus, seu ablutionibus,	Ca. 58.	358.
De ponderibus, & mensuris,	Cap. 59.	361.

PRA-



PRACTICAE GENERALIS

LIBER V.

De Syrupis, Cap. 1.

Syr: digestio

Superiore libro simplicium medicamentorum
 præcepta tradidimus, reliquum nunc est,
 compositorum, tam intrinsecus sumentorum
 quam forinsecus adhibendorum medicamentorum
 præceptiones doceamus, à syrupis digesti-
 onis originem ducentes. Itaq; Syrupus digestivus
 est potio alterans humores corporis in qualitate.
 Conficiuntur ex aquis distillatis, & syrupis
 simplicibus, & compositis, ita ut syruporum d-
 sis sit ab 3 1. usque ad 3 1. s. vel ad summum 3 2.
 quartum verò ab 3 2. usque ad 3 3. vel 4. in dupla pr-
 portione: exempli gratia: Si Medicus corrigere
 velit complexionem calidam, dabit Syrupi endiuiæ
 3 1. s. aquæ endiuiæ 3 3. misce, & fiat potio.
 Si verò duo spectet Medicus, videlicet, ut malam
 complexionem alteret, & aperiat, pro primo, dabit
 syrupum endiuiæ, cum aqua eiusdem, pro secundo,
 Syrupum Bisantinum cum aqua fœniculi,
 hoc modo: Syrupi endiuiæ 3 1. Syrupi Bisantini
 3 s. aquæ endiuiæ 3 2. aquæ fœniculi 3 1. misce.
 Quod si tria velit efficere Medicus, ammonere
 complexionem calidam, aperire, & incidere,
 pro primo, dabit Syrupum endiuiæ cum aqua eiusdem,
 pro secundo Bisantinum cum aqua fœniculi.

ali: pro tertio Syrupū acetosum simplicē, cum
 qua acetosa, in hac forma: R. Syrupi endiuiz,
 Syr. Byssantini, Syr. acetosi añ. ʒ. s. aquarum endi-
 iz, fœniculi, acetosæ, añ. ʒ. i. misce, & fiat potus.
Porro aqua vt plurimū syrupis proportionē re-
pondere debent, nisi propter cōplexionē malam
inferendā aliter facere cogatur Medicus: exem-
pli gratia: Si ordinaret Syrupū epithymi, aut de
tochade, miscendæ illis erunt aquæ frigidæ, vt
tiolarū, aut endiuiz, vt syrupi caliditas corriga-
ur, quæ omnia pro arbitrio p̄iti Medici sunt.
 Ceterū obseruādū quoq; venit, quòd omib. *causis.*
 syrupis cordialē aliq̃ aquā cōmiscere oporteat,
 vt virtus reatrix cordis cōfirmetur, qua in corde
 non aliter, quā rex in suo regno regnat. Sic igitur
 concludam⁹, Syruporū dosim nō trāsgredi opor-
 tere ʒ. i. s. aut ad summū ʒ. 2. idq; rarò admodū:
 aquarū vero ʒ. 3. &c. Qualitas aut syruporum ab
 ipsius morbi causa petenda est. Siquidem bilis, *Qualitas Sy-*
 refrigerātes: pituita, exalfaciētes, & incidētes; *ruporum*
 melancholia, exalfaciētes & humēscantes sy- *vt de potu.*
 rupos exposcit. Sumitur interdū à morbo: vt cū
 in obstructione, aperiēte vtimur syrupo aliquo.
 Porro locus affectus syruporū aquarumq; varie-
 tatem maxime indicabit. Medicus namq; volēs
 ordinare syrupū, debet semper assumere aquam
 proportionatā parti affectę, cui p̄portionatur syru-
 pus. verbi gratia: accipiēs medicinā stomachicā,
 debet

debet assumere aquam stomachicam: idem
Conferre
Exhibere reliquis censendum. Exhibentur autem sy-
Syrupus frequenter in aurora, repidi: interdum eti-
 vesperi, vbi scilicet somni conciliandi gratia
 muntur. Succos corporis purgationi præparan-
 meatus referant, obstructions aperiunt, inter-
 peries corrigunt, incidunt, detergunt, &c.

De Syrupis & aquis concoquentibus
bilem flavam, Cap. 2.

Syrupi & aquæ digerentes materiam choler-
 cam, in

C A P I T U M

Syrupi	Aquæ.
Syrup. Rosarum.	Aqua Lactucæ.
De Nenuphare.	Nenupharis.
De papauere.	Rosarum, &c.

Exempli gratia.

℞. Syrupi de papa- uere ℥. i. s.	℞. Syrup. de Nenupha- re ℥. i.
Aquarum	Aquarum
Violarum	Lactucæ
Lactucæ	Nenupharis. añ. ℥. i.
Nenupharis. añ. ℥. i.	Misce, & fiat potio.
Misce & fiat potus.	

IN PECTORE.

Syrupi.

Aqua.

Syrup. Violarum.

Violarum.

Syrup. de iuiubis.

Portulacæ.

uleb. violatum, &c.

*Syr. de iuiubis. de succo violarum.**Gyranth. 400.**Exempli gratia.*

R. Syrup. violarum.

R. Syrup. de iuiubis. ʒ i.

De iuiubis. añ. ʒ s.

Iul. violati ʒ s.

Aq. violarum. ʒ 2.

Aq. Portulacæ.

Misce & fiat syrup.

Viol. añ. ʒ i. s.

Misce.

IN CORDE.

Syrupi.

Aqua.

De succo acetosæ.

Acetosæ.

Syr. acetositis citri.

Buglossæ.

Iulapium rosa-

Borraginis.

ceum, &c.

Rosarum, &c.

*Syr. Rosarum.**Limon.**Exempli gratia.*

R. Sy. acetos. citri. ʒ i. s.

R. Syrupi acetosæ. ʒ i.

Aq. acetosæ

Iulapij rosar. ʒ s.

Borraginis

Aq. buglos. ʒ i.

Buglos. añ. ʒ i.

Borrag. ʒ 2.

Misce, & fiat potio.

Misce.

P

IN

226 PRACTICÆ GENERALIS
IN STOMACHO

Syrupi.

Aquæ.

*Syr. d. agrostis
Syr. d. lico
Syr. myrtus*

Syr. acetosus Simp.

Cotoneorum.

Syr. Granatorum.

Acetosæ.

Syr. Rosarum.

Portulacæ.

Iulapium rosaceum.

Violarum, &c.

Oxylaccharum.

Mina citoniorum.

Sy. mal. aurâtiorû, &c.

Exempli gratia.

R. Sy. Granatorum.

R. Sy. acetosi Simp.

Mal. aurât. añ. 3 s.

Rosar. 3 s.

Aq. acetosæ

Aq. cotoneorû

Portulac. añ. 3 i.

Violar. 3 z.

Misce, & fiat potio.

Misce.

IN HEPATE

Syrupi.

Aquæ.

Syrup. Endiuia.

Endiuia. Hepaticæ

Syrup. de succo endiu.

Cucurbitæ. Cichorij

Syrup. de cichorio, &c.

Solatri, &c.

Exempli gratia.

R. Sy. de endiu. 3 i. s.

R. Sy. de suc. end

Aq. endiuia

De cichorio

Hepaticæ

Aq. Solatri

Cucurbi

Cichorij

tæ añ. 3 i.

Endiuia añ

Misce, & fiat syrup.

Misce.

De Syrupis cōloquentib. pituitam, Cap. 3.

Syrupi & aquæ digerētes materiā phlegmaticā.

IN CAPITE.

Syrupi.

Aquæ.

Syrupi de Betonica.

Betonica. Maiorana.

Syr. de Stœchade, &c.

Saluia. Rorismarini.

Mel anacardium.

Pçon. Primul. veris, &c.

Exempli gratia.

Syrupi de Betoni-

Syr. de Stœcha. ʒs.

ca ʒi.

de Beton. ʒi.

Aquar. Saluia

Aq. Betonica

Maiora-

Saluia

ne añ. ʒi.

Primulæ ve-

Misce, & fiat syrup.

ris añ. ʒi.

Misce.

IN PECTORE.

Syrupi.

Aquæ.

Syrup. Capill. Veneris.

Capillorum Veneris.

Syrup. de Hyssopo.

Hyssopi.

De Prassio.

Scabiosæ.

De Calamentho

Adianthi.

De Glycyrrhiza, &c.

Thymi,

gr. Scabiosa.

Marrubij, &c.

IN STOMACHO.

Syrupi.

Aquæ

Syr. de mentha.

Absynthij.

Syr. de absynthio.

Mentha.

Mel roscolatam.

Apij.

P 2

Oxyme

228 PRACTICÆ GENERALIS

Oxymel simplex. Fœniculi.
Oxymel compositum. Chamomillæ.
Oxymel scilliticū, &c. Rutæ, &c. *Aq. melleæ.*

IN HEPATE.

Syrupi. Aquæ.
Syrup. de duab. rad. Eupatorii.
Syrup. de quinque rad. Prælij.
Syrup. de eupatorio. Hepaticæ, &c.
Syrup. Byfantinus, &c.

IN RENIBVS.

Syrupi. Aquæ.
Oxymel compositum. Nasturtij.
Syr. de duab. radicib. Cicerum rubrorum.
Syr. de quinq; rad. &c. Erucæ, &c.

IN MATRICE.

Syrupi. Aquæ.
Syr. de arthemisia. Arthemisia.
Syr. de calametho, &c. Matricariæ, &c.

IN TOTO.

Syrupi. Aquæ.
Syrupus Byfantinus Apij
Oxymel cōpositū, &c. Fœniculi.
Chamomillæ, &c.

Exempli gratia.

℞. Syr. Byfantin. $\frac{3}{4}$ i. s. ℞. Oxym. compos. $\frac{3}{4}$
Aq. fœniculi $\frac{3}{4}$ 2. Aquæ chamomil
Apij $\frac{3}{4}$ 1. lꝝ $\frac{3}{4}$ 2.
Misce, & fiat potio. Misce pro potu.

De Syrupis cōcoquētib. bilē atrā. Cap. 4.

Syrupi & aquæ digerentes melancholiam,

IN HEPATE.

Syrupi. Aquæ.

Syr. de Fumo terræ. Fumiterræ.

Syr. de epithymo. Lupulorum, &c.

Syr. Lupulorum, &c.

Exempli gratia.

R. Syr. de fumoterræ. R. Syrupi Lupulo-

De epith. añ. ζ 6. rum ζ i. s.

Aq. Lupulorum Aquæ Fumiter-

Fumiter. añ ζ i. s. ra. ζ 3.

Misce, & fiat syrup. Misce.

IN SPLENE.

Syrupi. Aquæ.

Syr. de fumoterræ. Scolopendriæ.

Syr. de epithymo, &c. Epithymi, &c.

IN CORDE.

Syrupi. Aquæ.

Syr. de pomis comp. Borriginis

Syr. Sabor regis, &c. Buglos. Melissæ, &c.

*Exempli gratia*R. Syr. de pomis R. Syr. Sabor reg. ζ i. s.comp. ζ i. Aq. borraginis ζ 2.Aq. borraginis Melissæ ζ i.Buglos añ. ζ i. Misce.

Misce, & fiat potio.

210 PRACTICÆ GENERALISS

Nota me non posuisse quæ sanguinem digerant, quia cum putrescit, in cholera[m] transit: sufficit igitur cholera[m] digerentes adscripsisse

De Syrupis digerentibus humores mixtos, Cap. 5.

Syrupi & aquæ digerentes bilem & pituitam,

IN CAPIT.

℞. Syr. de Nenuphare	℞. Syr. de Papauere
De Betō. añ. ʒ i.s.	Rosarum
Aq. Lactuæ	De stœc. añ. ʒ s
Nenupharis	Aq. Violarum
Saluia	Rosarum
Pēon. ana ʒ i.s.	Lactuæ
Misce, & fiat porio	Primulæ veris
pro duabus dosibus.	Maioranæ
	Rorism. añ. ʒ s
	Misce, pro vna dosi

IN PECTORE

℞. Syr. capill. Ven.	℞. Syr. de Hyssopo
Iulub. ana ʒ 6.	Deglycyrrhiza
Aq. adianthi	De iulub. añ. ʒ s
Thymi	Aq. capill. Ven.
Violarum	Portulacæ
Portul. ana ʒ 6.	Marrubij
Misce, & fiat syrup.	Borra. ana. ʒ 6.
	Misce.
	IN

LIBER V.
IN STOMACHO.

232

Rx. Syr. de absynthio 3 s.
De metha an. 3 s.
Acetosi simp. 3 i
Aq. absynthij
Borraginis
Acetosa
Cotoneorū 3 i.
Misce, & fiat potio.

Rx. Syr. de mentha 3 s.
Granator. 3 i.
Aq. mentha 3 2.
Cotoneor. 3 i.

Misce, & fiat syrup.

SYRUPVS PURGANS BILEM. PL

tuat n. & Melancoliā in Hepate.

Myrtos hūm

Rx. Syrupi de duabus radicibus

Syr. diajauos.

De epithymo

De cichorio ana 3 s.

Aquar. Eupatorij

Fumiterræ Lupulorum

Endiuia ana 3 s.

Hepatica 3 i.

Misce & fiat potio, pro vna doſi.

De Syrupis laxantibus, Cap. 6.

Syrupi laxantes simplices sunt,

Syrupus rosatus laxatiuus.

Syrupus violatus laxatiuus.

Syr. de florib. persicæ arboris.

Comp.

Syr. de Cichorio cum Rhabbarbaro.

P 4

De

De iulapijs, Cap. 7.

Iulapium seu Zulapium est Arabum delicatioris potionis genus. Fiunt autem ex aquis stillarijs, & saccharo, ad syrupi consistentiam coctis. Vfus tempore aqua largiore, nimirum quadrupla dilui solent, ita vt si Iulapiorum pondus si 3. erunt aquarum 12. vt infra in formulis patebit. Vtimur his in febribus potissimum, alijsque morbis, tussi præsertim, vbi vini vices, quorum abstinere oportet, supplent.

I.

℞. Iul. Rosacei
Violati añ. 3j s.
Aqu. Endiuizæ
Acetosa
Borrag. añ. 3 4.

II.

℞. Iulapij violacei
Syrupi de glycyrrhiza añ. 3 i.
Aquat. scabiosæ
Tussil. añ. 3 4.
Aque hordei coctæ. 3 4.

Misce & fiat iulapus.

III.

℞. Aq. Cinnamomi
stillatizæ
Borraginis
Buglossæ
Acet. añ. 3 i. s.
Iulapij rosacei 3 i.
vel 3 i. s.
Margarit. præparat.
Coralli rubr. præparati.
Fragm. lap. pretiosorum añ. 3 s.
Fol. auri N. 3.
Commistis singulis
fiat Iulepus.

*Emulsio ex fructibus et quibusdam seminibus com-
luis oleosis, quæ quod siccis minimè frindunt, et ne at-
pinguecant, inter contrahendum liquore, cuiuslibet affectui ap-
posito, asperguntur, et ita simplicium visib. et in colatur et
tribus adduntur, interdum Margaritæ et lapides sic. p. p.
minquam Symplicis leuans et refrigerans Emulsio.*

De Eligmatis, Cap. 8.

[Inſtus ſive Eligma Græcis, Barbaris Loch: medicamentum eſt thoracicum, vel pulmo-
nicum, lingēdo, vel lambendo, tandiu in ore re-
tentum, vel linguæ ſubditū, quoad paulatim eli-
queſcat, tabeſcatue], in ſpiritus meatum deci-
dens potius, quàm deuoretur, per ſe, ex dolci-
bus, tergentibus, ac etiam glutinofis, interdum
amaris, & acribus conſtatū. Hodie verò eis adij-
ciuntur, ſpecies, ſyrupi, & conſeruæ interdum,
ita vt eligmatum doſis ſit ab ℥s. vſq; ad ℥i. Spe-
cierum verò à ʒ3. vſque ad ℥i. plus, minùſue.
Conſeruarum autem ab ℥2. vſq; ad ℥3. Syrupor-
um, quantum ad excipiendum ſatis eſt, vt infra
in formulis patebit. Cuinam parti corporis cor-
reſpondere debeant medicamenta, ipſe locus
affectus indicabit, nimirum thorax, vel pulmo.
Quare his adijciēda medicamēta ſunt, quæ tho-
racis, vel pulmonis vitijs auxiliātur: cuiusmodi
ſunt, Diapenidium, Diatragacanthum, trochiſci
becchici, ſuccus glycyrrhizæ, tragacanthum,
gummi arabicum, & id genus alia. Qualitas
autem ab ipſo affectu, vel ipſius cauſa deſumen-
da erit. Sic aſpera arteriæ aſperitas, eligmata le-
nientia expoſcit: pulmonis vlcera, cōſolidantia:
intemperies calida, refrigerantia: frigida, excal-
facientia. Ad eundem modum humores in tho-

234 PRACTICÆ GENERALIS

race crassi, attenuâtia efflagitant eligmata vi
fcofi, quâ vim incidendi & abstergendi habent
&c. Porro exhibentur quouis tempore, ante &
post cibum, fabæ quantitate, potissimum vero
matutino. & vespertino. Ad pulmonis inflam
mationem, asperæ arteriæ asperitatem, vlcera
spiritus difficultatem, anhelationes, tussim
humoris influxu, ac destillatione ortum, & eos
qui difficulter glutinosa excreant, vt præfocari
videantur.

I.

R. Cōseruē capi. l. Ve
neris

Hyssopi ana ℥ i.

Loch de pulmone
vulpis ℥ s.

Spec. diapenidij

Diaireos ana ℥ i. s.

Syr. de prassio quan
tum sufficit ad exci
piendum, fiat Loch.

I l.

R. Loch de vino

De pulmo. vulpis

Sani & experti

De scilla. ana ℥ 2.

Spec. diapenidij

Diatragacan

thi ana ℥

Diaireos ℥ i.

Trochif. becchi co

Succi glycyrr. an. ℥

Radicu enulæ ℥ 2.

Dracōtij ℥

Syr. de hyssopo, ve

de glycyrrhiza quant

sufficit fiat eligma.

I l l.

R. Conseruæ violarū

Nenupharis

ana ℥ i.

Loch de Papauer. ℥

Spec. diatragac. frig. ℥

Sy viol. q. s. fiat eligma

De Rob. Cap. 9.

Rob est succus fructuum, ignis calore inspissatus, ut asseruari possit, & eo viniceat, aut p se, aut cū melle, aut aquis stillatis syruporum instar, & ita Rob dotis erit ab $\frac{3}{4}$ l. ad $\frac{3}{4}$ f. s. aquarum vero ab $\frac{3}{4}$ z. usque ad $\frac{3}{4}$ an dupla proportione, ut infra in formulis patebit. Differt tamen Rob a syrupo, vel decocto: quod syrupus fiat ex medicamentorum similibus decoctione, addito melle, vel saccharo. Rob vero ex herbis succis igne, ut antea dictum, inspissatis. Porro Rob in materia pituitosa, & melancholica fortioris operationis est, quam syrupus, vel decoctum. Quoniam in succo fortior operatio, quam in decoctione est. Siquidē ex decoctione partes subtiliores exhalāt, in succo vero remanent. In materia autem calida, syrupus & decoctum præstantiora sunt, quam Rob. E contra vero in gargarismis magis laudatur Rob quam syrupus: quoniam fortioris est virtutis ad attrahendum, subtiliandum, &c. Ceterum cum Rob similes cum syrupis virtutes obtineant, poterunt quoque propter easdem intentiones, propter quas exhibentur syripi, dari, & exhiberi, & eadem hora, & eodem tempore. Porro Rob etiam cum alijs medicamentis, cum simplicibus, tum compositis exhiberi poterunt. vñ in formulis videre licebit.

*Rob. Syro
ut distat.*

236 PRACTICÆ GENERALIS

I.		Cōseruæ ros. antic
℞. Rob è Ribes		Diaciton. simpli
è Nucibus		Mittæ cotoneo-
Mittæ citonio-		rum añ. 3 s.
rum añ. 3 s.		Consolidæ maiori
Aq. Acetosa		Balaustiarum
Plantaginis		Trochiscorū è spo
Fragorū añ. 3 i.		diā
Misce, & fiat potio.		Trochisc. è terra fi
I I.		gillata añ. 3 i.
℞. Rob è Ribes		Cū syrupo myrtim
Diamo-		q. f. ad mellis confi
ron añ. 3 s.		stentiam, fiat Rob.

Apozemata.

De decoctis, Cap. 10.

Decocta, Græcis apozemata, Latinis syrups longi, & magistrales dicuntur, sunt potiones non ad syrups consistentiam decoctæ, sed dilutæ. Fiunt ex folijs, floribus, radicibus, fructibus, seminibus, corticibus, lignis, interdum etiam succis. Coquuntur autem hæc ex aqua fontana, vel pluuiæ. Foliorum autem quantitas manipulos quinq; ad summū: flores pugillos quatuor: radicum uncias tres, ad summum quinq;: seminum drachmas quatuor, aut sex non excedat. Aquæ mensura rarò libras duas, vel ad summum tres superet. Coquuntur autem omnia in olla vi-

treata

Docis.
Fol.
Flor.
Rad.
Semin.
Aque.

creata ad tertias, interdum ad dimidiæ partis
 onsumptionem: postea colo transfunduntur,
 adiecta interdum sacchari conuenienti quanti-
 ate, vt delicatius reddatur decoctum, & cum
 oui albumine clarificatur: & p qualibet vna dosi
decocti 3 i. s. f. rui conuenientis commiscetur.
 Adduntur etiam interdum decoctis medica-
 menta purgatiua, vbi diligenter ad pondus pur-
 gantium medicamentorum respiciendum est,
adiectis semper ijs. quæ vim eorundem infre-
uant. Quibus autem membris medicamenta
 proportionata esse debeant, locus affectus, com-
 mode ostendet: sic eorundem qualitatem tum
 affectus ipse, tum eius causa maximè indicabit.
 Porro asseruantur vix per septimanam decocta.
 Assumuntur autem instar syruporum, tempore
 matutino, pondere duarum, aut trium, aut qua-
 tuor vnei arum, pro varia ratione ætatis, comple-
 xionis, &c. Vtitur autem his ad alterandum,
 praparandum, concoquendum, & purgandum
 interdum, vt in sequentibus formulis patebit.

Sofis

Vins.

De decoctis alterantibus, Cap. ii.

DECOCTVM ALTERANS
bilem flauam.

Rad. Cichorii 3 3.	Endiuia
Fol. Lactucæ	Portulacæ añ. M. i.
	Sem.

238. PRACTICA GENERALIS

Sem. Melonum

Sebesten

Cucurbitæ

Iuiubarum

Cucumeris

Prunorum ana ʒss

Citrul. ana ʒi.

Flor. Violarum

Passularum

Borra. ana P.i

Fiat decoctio in mensuris duabus aquæ vsque ad consumptionem tertiæ partis, de colatura accipe lib. i. cui adde sacchari lib. s. Coquantur iterum despumando, & clarificando, fiatq; apozema pro quatuor aut quinque dosibus. cui addatur syrupi violacei ʒ 4. vel ʒ 5.

DE COCTVM COMMUNE

aliterans pttu. tam

ʒ. Betonicæ

Petroselinii

Hyssopi

Rufci

Capill. Veneris

Asparagiana ʒ 6.

ana M. i. s.

Sem. anisi

Flor. Borraginis

Fœniculi

Bugl. ana P. i.

Ameos ana ʒ i.

Rad. Fœniculi

Passularum ʒ i. s.

Apij

Ficum N. io.

Coquantur in lib. 2. aquæ, vsque ad consumptionem tertiæ partis. Colaturæ adde mellis rosati colati q. s. fiatq; potio pro quinque dosibus.

APOZEMA COMMUNE ME-

laucholi. m. aliterans

ʒ. Fumiterræ

Scolopendriæ

Lupulorum

Endiuiz

Scariolæ ana M.1. Prunorum N.10.
 Rad. Polypodij Passularum ʒ1.
 Cichorij ana ʒ1.5 Cor. tamaricis
 Sem. anisi Capparorum
 Fœnicul. ana ʒ2. ana ʒs.
 Fiat de coctio secundum artem Colaturæ ad
 e sacchari q. s. & fiat potio pro quinq; dosibus.

De decoctis alterantibus. et purgantibus simul bilem flauam;
 Cap. 12.

Ecocta concoquentia & purgantia bilem
 flauam,

IN CAPITE.

Fol. I asuca Sem. papaueris albi
 Nenupharis ʒ3. vel ʒ4.
 ana M.2. Passularum ʒ1.
 Flor. Violarum Prunorum N.9.
 Resar. ana P.2.
 Coquantur in sufficienti quantitate aquæ vs-
 que ad consumptionem tertiæ partis, de colatu-
 ra ʒ. ʒ4. quibus infunde
 Rhabarbari electi ʒ2.
 Spicæ ʒ2.

Relinquantur per noctem, mane coletur, &
 exprimatur fortiter, cui addo

Electua-

240 PRACTICÆ GENERALIS

Electuar. de succo Syr. viol. lax. ʒi.

ros. ʒ2. Misce, & fiat potio

IN PECTORE.

℞. Fol. Tussilaginis Sebesten

Lact. añ. M. 2. s. Iuiubarum añ. ʒi.

Flor. Violarum Passularum ʒs.

Borrag. añ. P. 2. Glycyrrhiza ʒi.

Coquantur secundum artem, De colatura

℞. ʒ4. quibus adde iii ʒ2. s. vel ʒ3.

Mannæ electæ ʒi. Infusionis viol. ʒi.

Diaprunis soluti Misce, & fiat potio.

IN VENTRICULO.

℞. Lactuca M. r. Cucur. añ. ʒi.

Flor. Violarum Prunorum

Borra. añ. P. i. Passularum añ. ʒs.

Sem. Portulacæ Myrobalanorum

Scariola citrinorum ʒs.

Coquantur s. a. & fiat potio pro duabus dosi-

bus, cui adde,

Cassia recentis ʒ2. Syrup. ros. lax. ʒ2.

Elect. ros. Mes. ʒ3. Misce, & fiat potio.

IN HEPATE.

℞. Rad. cichorij ʒ2. Lactuca ana

Fol. Endiuia ʒi. s.

Sonchi añ. M. i. s. Tamarindorū ʒi.

Flor. cichorij P. 2. Passularum ʒs.

Sem. endiuia Rhabar. electi ʒ6.

Scariola Spicæ Indicæ ʒi.

Co-

Coquantur s.a. & fiat potio pro duabus dosibus, cui adde

Diapruni leniti- Syrupi de cichorio
ui ʒi. cū Rhabar. ʒi.

Misce, fiatq; potio, pro duabus matutinis.

IN SPLENE.

Fol. Endiuia Sem. endiuia ʒi.
Cacuminum Cortamaricis ʒi.s
lupulorū añ. Passularum ʒs.
M.i. Rhabarb. electi ʒs.
Flo. Borraginis Spicæ Indicæ ʒi.
Buglos. añ. P.i.

Decoquantur s.a. & fiat potio pro vna dosi, cui adde Syrupi ros. lax. ʒi.

IN MATRICE.

Fol. endiuia Nenupha-
Nenupha- ris. añ. P.i.s.
ris. añ. M.i.s. Passularum. ʒi.
Flor. borraginis

Decoquantur s.a. & fiat potio pro duabus dosibus, cui adde

Mannæ electæ ʒ2. Syrupi violati
Electuar. de succo lax. ʒ2.
ros. ʒs. Misce, & fiat potio.

IN IUNCTVRIS.

Fol. Lactuca Semē endiuia ʒs.
Endiuia añ. M.i.s. Vuarum passa-
Flor. Violarum P.3. rum ʒs.

Q

De

242 PRACTICÆ GENERALIS

Decoquantur f.a. De colatura accipe ʒ 4. quibus adde

Diacatholiconis ʒ 5.

Mef. ʒ 3.

Syrupi ros. lax. ʒ 1.

Electuarij succi ros. Misce.

De decoctis alterantibus, et purgantibus pituitam, Cap. 13.

A Pozemata concoquentia & purgantia pituitam,

IN CAPITE.

ʒ. Rad. Fœniculi ʒ 1.

Passularum ʒ 6.

Betonicæ

Myrob. chebulorum ʒ 5.

Maioranæ ana M. i

Flor. anthos

Agarici optimi ʒ 6

De stœcha-

Zingiberis

de ana P. i.

Salis gemmæ

Sem. fœniculi ʒ i. s

ana ʒ i.

Coquantur f.a. & fiat potio pro duabus dosibus, cui adde Syrupi de betonica ʒ 2.

IN PECTORE.

ʒ. Rad. Ireos

Fol. Betonice

Enulæ

Hyslopi

Glycyrrizæ

Marrubij

ana ʒ 2.

ana M. i

Flor.

LIBER V.

243

Flor. Scabiofa	Dactylor. ana ʒ s.
Betonica	Turpeti ʒ 2.
Borrag. ana P. i.	Agarici ʒ s.
Sem. vrtica ʒ 3.	Zingiberis
Passularum	Salis gemmæ
Ficuum	ana ʒ i. s.

Fiat decoctio s.a. pro duab^{us} dosibus, cui adde
 Diaphœniconis Syr. de hyssopo ʒ 2.
 ʒ s. Misce, & fiat potio.

IN VENTRICULO.

Rad. Fœniculi	Sem. Fœniculi
Petrose. ana ʒ 6	Anisi ana ʒ i.
Fol. Mentha M. 2.	Passularum ʒ s.
Flor. Rotisimarini	Agarici ʒ s.
Borra. ana P. i.	Zingiberis ʒ i.
Decoquantur s.a. & fiat potio pro duabus do-	
sibus, cui adde	
Electuarij Indi	Syrupi de men-
Diaphœniconis	tha ʒ 2.
ana ʒ 2.	Misce, & fiat potio pro
	duabus vicibus

IN HEPATE.

Rad. Petroselini	Asparagi
Apij	Rusci ana ʒ 2.
Fœniculi	
Q. 2	Fol.

244. PRACTICÆ GENERALIS

Fol. Origani	Petrofelini añ. ʒ i.
Hysſopi	Paſſularum ʒ s.
Eupatorii. añ. M. i. s.	Agarici ʒ s. v.
Flor. Borraginis	Salis gemmæ
Origani añ. P. i.	Zingiberis añ. ʒ i.
Semen aniſi	

Decoquantur ſ. a. & fiat potio pro duabus doſibus, cui adde

Diaphœniconis ʒ s.	Syrupi de eupatorio ʒ 2.
--------------------	--------------------------

IN SPLENE.

Rad. Asparagi	Borraginis añ. P. i.
Cichorii añ. ʒ s.	Semen aniſi
Fol. Calaminthi	Carui añ. ʒ i.
Aſari	Cort. tamaricis
Eupatorii añ. M. i.	Capſariorũ añ. M. s.
Flor. bugloſſæ	Turpeti ʒ 6.
	Zingiberis ʒ 2.

Fiat potio pro duabus doſibus, cui adde ſyrupi de calamintha ʒ i.

IN RENIBVS ET VESICA.

Rad. quinq; communium	Cicerum rub. añ. P. i.
Pentaphylli. añ. ʒ 2.	Baccarum iuniperi ʒ 2.
Flor. borraginis	Ficuum N. 10

Decoquantur ſ. a. De colatura accipe vncias 4. quibus infunde per noctem

Agaric

LIBER V.

245

Agarici ℥ 2.

ua ℥ 4. s

Zingiberis ʒ i. s.

Syrupi de duabus

Mane exprimantur,
addaturq;

rad. ʒ i.

Misce, fiatq; potio.

Benedictæ laxati-

IN MATRICE.

34. Artemisia

Sem. petroselini

Pulegij

Anisi añ. ʒ i.

Sabinæ

Baccarum laui ʒ i.

Melissæ

Agarici

Rad. Apij añ. M. s.

Turpeti añ. ʒ 3.

Asparagi

vel 4.

Rubiæ tin-

Zingiberis ʒ 2.

florū añ. ʒ s.

Decoquantur s. a. & fiat potio pro duabus vi-
cibus, cui addantur syrapi de arthemisia ʒ 2.

IN IUNCTVRIS.

35. Rad. Fœniculi

Borraginis

Ireos

añ. P. i.

Cichorij

Sem. Fœniculi

Asparagi

Anisi añ. ʒ i.

añ. ʒ 2.

Passularum ʒ i.

Fol. Betonicæ

Turpeti

Hysopi

Agarici añ. ʒ 2. s.

Menthæ

Zingiberis

Eupatorij

Salis gemmæ

añ. M. s.

añ. ʒ i. s.

Flor. anthos

Cinnamommi ʒ i.

Q 3

Deco-

246 R A C T I C A E G E N E R A L I S

Decoquantur s.a. fiatq; potio pro duabus do-
sibus, cui adde

Diacatholiconis

Oxymellis ℥2.

℥1.

Misce, & fiat potio pro
duabus matutinis.

Benedictæ lax. ℥5.

De decoctis alterantibus et purgati- bus melancholiam, Cap. 14.

Decocta concoquentia & purgantia atrâ bile

I N C A P I T E.

℞. Lupulorum

Borraginis

Fumiterræ

ana P.1.

ana M. i s.

Pŕunorum N. 10.

Rad. Buglossæ ℥1.

Passularum ℥5.

Flor. anthos

Fol. senæ ℥1.s.

Buglossæ

Zingiberis ℥2.

Decoquantur s.a. & fiat potio pro duabus do-
sibus, cui adde

Syrupi de pomis ℥2.

I N P E C T O R E.

℞. - Fol. Melissæ

Borraginis

Rosmarini

ana P.1.

Buglossæ

Passularum ℥5.

ana M. i.

Glycyrrhizæ ℥1.

Flor. Violarum

Ficum N. 6.

Melissæ

Senæ ℥1.s.

Zingiberis ℥2.

Co-

Coquantur s.a. & fiat potio pro duabus vicibus, cui adde Syrupi violacei ℥ 2.

IN HEPATE.

Rad. cichorii ℥ s.	Flor. borraginis
Polypodij ℥ 2	Buglossa
Fol. Asari	ana P. r.
Fumiterræ	Vuarū passarū ℥ 6.
Lupulorum	Myrobal. Ind. ℥ s.
ana M. r.	Fol. senæ ℥ i. s.
	Zingiberis ℥ 2.

Coquantur s.a. fiatq; potio pro tribus dosibus, cui adde

Confect. Ha. ℥ i.	terra ℥ 3.
Syrupi de fumo-	Misce.

IN LIENE.

Rad. Buglossæ	Epithymi
Polypodij	ana M. r.
ana ℥ 3.	Cort. tamar. P. r.
Fol. Thymi	Cappar. ℥ i. s.
Scolopendriæ	Sem. anisi ℥ 2.
Cuscuthæ	Senæ ℥ i.
	Zingiberis ℥ 2.

Fiat decoctio s.a. & fiat potio pro duob. haubis, cui adde Cōfectionis Hamech ℥ s. Syrupi de epithymo ℥ i. s.

IN TOTO.

Fumiterræ	Lupulorum
Scolopendriæ	Epithymi ana M. r.
	Q 4 Flor.

248 PRACTICÆ GENERALIS

Flor. borraginis Myrob. Ind. ʒ ʒ.

Buglossa Passularum ʒ 6.

Melissa Semen anisi

an. P. i. Fœniculi

Rad. polipodij ana ʒ i.

Buglossa Senæ Orientalis

Cichorij ʒ i. s.

Fœniculi Zingiberis ʒ 2.

ana ʒ s.

Concoquantur f. a. & fiat potio pro tribus do-
sibus cui adde

Diacatholiconis Manna electæ ʒ 2.

ʒ i. Syrupi de fumoter-

Confect. Hamech ra ʒ 3.

ʒ 6. Misce, & fiat potio.

De decoctis alienantibus, et purgan-
tibus humores mixtos, Cap. 15.

BILEM ET PITUITAM.

ʒ. Rad. cichorij o ana. P. i.

Fœniculi Sem. anisi

ana ʒ s. Fœniculi

Eediuia Endiuia

Capill. Veneris Cucurbitæ

ana M i. ana ʒ s.

Flor. Violarum Passularum ʒ 6.

Borraginis Tamarindorum ʒ i.

Rhabar.

Rhabarbari electi Zingiberis ℥ i. s.
 Agarici opt. añ. ℥ 3. Salis gemmæ ℥ i.
 Spicæ Indicæ ℥ i.
 Coquantur s. a. & fiat potio pro duobus hau-
 sis, cui adde
 Diacatholiconis ℥ i. Syrupi ros. lax.
 Diaphœniconis ℥ 2.
 Elect. de succo ros. Misce.
 ana ℥ 2.

EILEM FLAVAM ET ATRAM.

Lupulorum Sem. endiuix
 Fumiterræ Anisi añ. ℥ i.
 Endiuix ana M. i. Passularum
 Rad. cichorij Sebesten ana ℥ s.
 Polypodij Rhabarbari electi
 ana ℥ s. ℥ s.
 Flor. Violarum Fol. senæ ℥ io.
 Borraginis Spicæ Indicæ ℥ i.
 ana P. I. Zingiberis ℥ i. s.

Decoquantur s. a. & fiat potio pro duabus vi-
 sib. cui adde
 Diasenæ ℥ i. Syrupi ros. lax.
 Elect. succi ros. Syrupi de fumoter.
 Mes. iæ ana ℥ i.

Confect. Ha añ ℥ 2 Misce.

ATRAM EILEM ET PITVITAM

Rad. Apij Buglossæ ℥ s.
 Fœniculi Polypodij ℥ 2.
 Q s Beto-

250 PRACTICÆ GENERALIS

Betonica	Fœnic. ana ʒ
Capill. Ven.	Cort. tamaricis ʒ
Epithymi ana M. i.	Passularum ʒ i.
Flor. borraginis	Fol. senæ ʒ i. s.
Buglossæ	Agarici ʒ 6.
Anthos ana P. i.	Zingiberis ʒ 2.
Sem. anisi	Salis gemmæ ʒ i.
Coquantur s. a. & fiat potio pro tribus dosib.	
cui adde	
Diacatholicon. ʒ i.	Syr. de Epithy. ʒ 2.
Benedictæ lar.	Oxymellis comp.
Confect. Hamech	ʒ i.
ana ʒ 3	Misce.

BILEM, PITUITAM, ET

atram bilem.

ʒ. Capill. Veneris	Viol. ana P. i. Sem. ani.
Lupulorum	Fœniculi
Betonica	Endiuia an. ʒ
Endiuia ana M. s.	Prunor. Dam. N. 6.
Rad. Fœniculi	Passularum ʒ 6.
Cichorii	Senæ orient. ʒ i. s.
Polypod añ. ʒ 3	Rhabar. electi ʒ 5.
Glycyrr. ʒ 3.	Agarici optimi ʒ s.
Flor. Borraginis	Spicæ Indicæ ʒ i.
Buglossæ	Salis gemmæ ʒ 2.
Viol. ana P. i.	Zingiberis ʒ 2.
Decoquantur s. a. fiatq; potio pro tribus dosib.	
bus, cui addantur	

Man-

Mannæ electæ

Aquæ cinnamomæ

Syrupi ros. lax.

distillatæ ℥ i.

ana ℥ i. s.

Misce pro tribus matutinis.

DECOCTVM PURGANS OMNEShumores.

Turpeti ℥ s.

Fol. senæ ℥ i o.

Polypodij ℥ 2.

Zingiberis ℥ 2.

Hermodactylorū

Cinnamomi

Rhabarbari añ. ℥ 2

Anisi ana ℥ i.

Concisa coquantur in libra vna & semis aqua usq; ad tertie partis consumptionem, co-
 erur: & de colatura dentur ℥ 3. tempore matutino, addendo syrupi ros. lax. ℥ i.

De infusionibus, Cap. 16.

Infusio, siue dilutum est maceratio medicamentorum purgantium in liquore aliquo appropriato per horas aliquot certas. Magnatibus & delicatioribus hominibus exhibentur. Quod ad compositionem horum attinet, primum necesse est, vt purgantium medicamentorum pondus recte eneamus: deinde vt semper purgantibus miscetur, q̄ vehementiā eorū corrigere possunt, vt in sequentibus formulis patebit. Vt plurimum aut 12. horas, non uero per integrū diē, vt propius, & uacatius tenuiores partes in se colligāt, macerantur: dein-

252 PRACTICÆ GENERALIS

deinde colantur & exprimantur quibus, denique
 fyrupi, vt suauior reddatur potio, commiscetur.
 Porro qualitas medicamentorum pro humorū
 praternaturam in corpore redundantium, rati-
 one variatur. Quantitas verò seu dosis, ex quarto
 libro petenda. Sumuntur autem diluta calide
 tempore matutino, & stomacho vacuo, sicuti sy-
 rupi, & apozemata ab ʒ 3. vsque ad ʒ 4. vel 5.

INFUSIO PURGANS BILEM.

R. Rhabbarbari electi ʒ 6.

Spica Indica ʒ 2.

Cōcidantur minutim, & macerentur per no-
 ctem, in aquis stillatitijs, endiuia, hepatica, &
 borraginis ana ʒ i.s. Deinde linteolo expriman-
 tur valide, & colentur: expressioni adde syrūpi
 ros. lax. ʒ i. fiatq; potio.

I I.

PURGANS PITUITAM

in capite.

R. Agarici optimi ʒ 3.

Zingiberis

Salis gemmæ ana ʒ s.

Macerentur per horas 12. in

Aquis Saluia

Betonica ana ʒ i.s.

Exprimantur, & fiat potio, cui adde Syrupi de
 stœchade ʒ i.

III.

PURGANS MELANCHOLIAM.

℞. Fol. fenæ ℥ 6.

Zingiberis ʒ 2.

Macerentur in decocti florum & fructuū ℥ 4.
 liu noctuq; , postea fortiter exprimantur adda-
 urq; syrupi de fumo terræ ℥ 1.

IIII.

PURGANS BILEM ETPituitam.

℞. Rhabarbari electi ℥ s.

Agarici optimi ℥ 1. s.

Spicæ Indicæ ℥ 1.

Salis gemmæ ʒ 1.

Concidantur singula minutatim, & maceren-
 tur in aquis stillaritijs, endiuix, & borraginis a-
 qua ℥ 1. s. Durent in his horas duodecim, deinde
 in teolo mundo exprimantur validè, & colētur,
 atq; potio, cui addatur syrupi ros. lax. ℥ 1.

De potionibus purgantibus in sub-stantia sumptis, Cap. 18.

Orro circa medicinas solutiuas, quæ in poti-
 onibus sumuntur, quatuor obseruanda veni-
 unt. Primum est, vt iuxta omnium ferè Medi-
 corum sententiam, in qualibet medicina solu-
 tiua, aliquid miscendum curemus, quod cor con-
 fortare.

2. fortare possit. Alterum est, quod medicina solutiua proprietatem habere debeat cum illo m-
bro, quod euacuandum est: vt si caput sit purgan-
dum, addenda aqua betonica vel saltia est, vel
3. flores stœchados, vel id ger us alia. Tertium,
quod inter soluentes medicinas, quædam leni-
endo, quædam attrahendo, vt in sequentibus
duobus capitibus videre licet, educant. Quartū
4. q in medicina compositione semper addendum
sit suum ^{corruptum} lenitiuum. Quoniam violentas soluti-
uorum virtutes ad securitatem perducit. Dosis
verò lenitiui est à 3. vsque ad 3 s. vel 6. Soluti-
uorum autem à 3 2. vsque ad 3 s. s. vt in sequen-
tibus formulis patebit.

I.

℞. Diacatholiconis 3 s.

Electuarij de suc. ros. 3 s. ii.

Misce & cum decoctione florum & fructuum
in aqua endiuia facta, fiat potus, cui adde syrupi
violacei 3 i.

Hic vides lenitiui 3 s. solutiui verò 3 s. s. & di-
gigitur virtus eius ad hepar, & cor confortat me-
diante decoctione facta in aquis proprijs.

II.

℞. Mannæ electæ, vel Cassiæ 3 6.

Elect. de succo ros. 3 s. s.

Cum decoctione florum & fructuum fiat po-
tus, cui adde syrupi ros. lax. 3 j.

LIBER V.

III.

295

Ad potum.

℞. Diacatholiconis ℥ 5.

Diaphœniconis ℥ 2.

Electuarij Indi ℥ 1. s.

Misce, & cum decoctione florum & fructuum
aquis buglossæ, & fœniculi facta fiat potio,
cui adde Mellis ros. col. ℥ 1.

IV.

Ad Melam

℞. Diasenæ ℥ 5.

Confect. Hamech ℥ 2.

Diasenæ Nicolai ℥ 1. s.

Misce, & cum decoctione florum & fructuum
a aqua buglossæ, & scolopendriæ facta, fiat po-
tio, cui adde syrupi violacei ℥ 1.

V.

℞. Diacatholiconis ℥ 5.

Elect. de succo ros. ℥ 2.

Diaphœniconis ℥ 1. s.

Misce, & cum aqua endiuivæ & borraginis
ana ℥ 1. s. fiat potio, cui adde Syrupi ros. lax. ℥ 1.

VI.

℞. Rhabarbari electi ℥ 2.

Spicæ Indiæ ℥ 1. s.

Puluerizentur subtiliter, quibus adde

Cassia ℥ 5.

Elect. de succo ros.

Diaphœniconis ana ℥ 2.

Cum

PRACTICÆ GENERALIS 25

Cum decoctione florum fructuum fiat potio
cui adde syrupi violati lax. 3 i.

De Medicinis lenientibus,

Cap. 19.

Quæ leniendo humores educunt, alunt, leu-
ter mouent, atq; sine tumultu exonerant
qualia sunt Diaprunis lenitiua, Diacatholicum
Diasena, compositio è Manna, è Cassia, & simi-
lia: quorum dosis à ʒ ʒ. vsque ad ʒ i. Exhibentur
autem vel in forma boli, vel cum decoctione a-
liqua, vel aquis destillatis, additis solutiuis (v-
antea diximus) tempore matutino, &c.

De medicamentis s. lenientibus,

Cap. 20.

Quæ attrahendo purgant medicamenta, ca-
thartica & solutiuia nuncupantur: Hæc va-
lenter purgant. Proinde absque lenitiuo aliquo
addito, sumi non debent. Quomodo autem, &
qua dosi commisceantur, suprà capite 18. abun-
dè ostendimus. Sunt autem medicamenta solu-
tiua, præsertim bilem purgantia, quibus ferè ho-
die vtuntur practitantes,

Electuarium de succo rosarum

Electuarium succi ros. Mesux.

Electu-

LIBER V.

Electuarium de Psyllio. *U. d. S. 357. solutio.*

Diaprunis solutiva.

Diarob cum rhabbaro, &c. *Diat. rhab. cum Rhab.*

CATHARTICA PHLEGMA

purgantia.

Diaphoenicum. *Acacia, brochiscat.*

Electuarium Indum. *Elect. Ind. d. 1. 1. 1. 1.*

Electuarium Elefcoph. *Hiera compo.*

Diarob cum turbith. *sternut. Logodion.*

CATHARTICA BILEM ATRAM

purgantia.

Confectio Hamech. *Silz Epithemi.*

Diasena Nicolai, &c. *Hiera logod.*

De potionibus purgantibus partim ab
in fufis, partim à substantia factis,

Cap. 21.

Non raro etiam vtuntur Medici cōmuniter
practicantes, potionibus, quibus partim in
induntur medicamenta purgantia, partim to-
substantia ponuntur, & ita bibuntur: vt sequē
bus formulis perspicuē videre licebit.

R. Rhabarbari electi 3 z.

Spica Indica 3 s.

Incendantur minutim, terantur, & infundan-
tantur per horas septem in sufficiente quan-

R

titate

Ad bibum.

258 PRACTICÆ GENERALIS
tate vini odoriferi, tempore hyemali, in aqua
endiuiæ ætate: deinde fiat expressio fortis, cui
adde, vel in ea dissolue

Cassia recent. extracta, vel Man. ℥ s.

Electuarium de succo rosarum ℥ 2.

Electuarium psyllij ℥ 1.

Misce, & cum decoctione florum & fru-
ctuum in aqua buglossæ, & endiuiæ facta, fiat po-
tio, cui adde syrupi rosæ lax. ℥ 1.

II.

℞. Myrobalanorum citrinorum ℥ 3.

Spica Indica

Sem. anisi ana ℥ s.

Trita in decoctionis passularum ℥ 3. per diem
integrum macerentur: deinde fortiter exprimā-
tur, addaturq; Elect. de succo rosarum

Diaprunis solutiæ ana ℥ 1. s.

Mannæ ℥ 6.

Syrupi violati ℥ 1.

III.

Ad hanc.

℞. Turpeti ℥ 1 s.

Zingiberis ℥ 1.

Trita macerentur horis duodecim in vini odo-
rati ℥ 3. deinde exprimantur, addaturq;

Elect. Ind. ℥ 3.

Mellis ros. col. ℥ 1.

IV.

- ℞. Agarici electi ℥ 2.
 Zingiberis ℥ 1.
 Salis gemmæ ℥ s.
 Trita macerentur horis duodecim in
 Vini odoriferi ℥ 1.
 Aquæ fœniculi ℥ 2.
 Exprimantur, addanturq;
 Elect. Ind. ℥ 3.
 Oxymellis scillitici ℥ 1.
 Misce, & fiat potio.

V.

- ℞. Rhabarbari electi ℥ 2.
 Agarici trochiscati ℥ 1.
 Spicæ Indicæ ℥ 1.
 Zingiberis ℥ s.
 Concisa, macerentur horis octo in
 Aqua endiuia ℥ 2.
 Fœniculi ℥ 1.
 Vini optimi ℥ 1.
 Exprimantur probè, addanturq;
 Manna electa ℥ 6.
 Electuarium de succo rosarum ℥ 1. s.
 Diaphœniconis ℥ 2.
 Syrupi ros. lax. ℥ 1.
 Misce, & fiat potus.

VI.

- ℞. Fol. senæ ℥ 3.

R 2

Rhabar-

*Ad bilium et
 pibula.*

*Ad os
 humorem.*

360. PRACTICÆ GENERALIS

Rhabbarbari electi ℥ 2.

Agarici optimi ℥ 1.

Spicæ Indicæ ℥ 1.

Zingiberis ℥ s.

Concidantur singula minutatim, & macerentur in decoctionis passularum ℥ 4. per horas duodecim, deinde exprimantur probe, addaturque Rhabbarbari albi, siue rad. mechoacæ ℥ s. syrupi ros. lax. ℥ 1.

De bolo purgatorio, Cap. 22.

37.
BOlus est frustulum medicamentorum purgantium, esui aptum, quantum scilicet bucca commodè capere potest. Formatur autem ex lenitiuis, & solutiuis: interdum ex simplicibus tantum medicamentis, cum suis correctiuis, atque syrupo, vel alio quodam liquore excipiuntur, & in formam boli digeruntur, ut formulis sequentibus patebit. Porro qualitas purgantium medicamentorum ab humore peccante desumenda erit. Quântitas verò augeri minuiq; poterit iuxta ægotantis vires, & medicinæ, quæ exhibetur: ira tamen, ut vnciam vnâ nunquam excedat. Nam vniuersa, vna vice deuoranda erit. Quarum verò partium proprietatem medicamenta habere debeant, ipse locus affectus commodè demonstrabit. Tempus autem assumendi matutinum est.

I.

- R. Cassiæ recentè extractæ ℥ 6.
 Electuarij de succo rosarum ℥ 3.
 Misce, & cum saccharo fiat bolus, auro
 coopertus.

II.

- R. Cassiæ nouiter tractæ ℥ 1.
 Diagridij gr. 3.
 Misce & cum saccharo fiat bolus.

III.

- R. Diaprunis lenit. vel Diacathol. ℥ 5.
 Diaphœniconis ℥ 3.
 Misce & cum saccharo fiat bolus.

IV.

- R. Turpeti ℥ 1.
 Zingiberis -
 Mastice ana ʒ s.
 Cum melle rosaceo quantum sufficit,
 fingatur bolus.

V.

- R. Conservæ violatæ ℥ s.
 Pul. rad. mechoacæ ℥ 1.
 Cum syrupo ros. lax. formetur bolus.

VI.

- R. Rhabar. albi, siue rad. mechoacæ ʒ 2.
 Fol. senæ, tritorum ʒ 1.
 Zingiberis ʒ s.
 Cum syrupo violaceo fiat bolus.

R 3

VII.

℞. Cassiæ recentè extractæ ℥ 6.

Confectionis Hamech ℥ 2.

Misce, & cum saccharo fingatur buccæ,
auro cooperta.

℞. Conseruæ ros. ℥ s.

Florum Antimonij gr. 3. vel 5.

Misce, & cum saccharo fingatur buccel-
lus, auro vel saccharo aspersus.

De Pilulis, siue Catapotijs,

Cap. 23.

Pilulæ Græcis Catapotia à parua pilæ figura,
medicamentum est, quod deglutiendo sumi-
tur, ad fallendam medicamenti insuauitatem
inuentum. Porro rarò vnius generis catapotijs
vtimur, sed varijs, potissimum autem tribus in-
ter se commixtis, additis, quæ vehementiam il-
lorum augere queant, vt est diagridium, agaricus
trochiscatus, & eius generis alia, cum syrupo ali-
quo vel aqua stillatitia in catapotiorum formâ
coactis, vt insequētibus formulis patebit. Quos
verò & quales humores educere debeant, ipsa
morbi causa indicabit. Ad eundem quoq; modû
quibus cum partibus correspondere oporteat, ip-
se locus affectus demonstrabit. Modus tamen
exhibi-

Exhibitionis communiter drachma vna est plus
 minusue, iuxta materiam simplicem, ex quibus
 conficiuntur; & virtutem agroti, itemq; magni-
 tudinem morbi. Fiunt autem pilulæ 5. vel plures
 vel pauciores pro Medici iudicio. Quæ maiori
 forma parantur pilulæ, vt sunt capitales, tribus
 aut quatuor horis à leuiori cœna, vel media no-
 cte, vel post primum somnum assumuntur. Mi-
 nores & leues, vt pestilenciales, & alephanginæ,
 hora vna, vel duabus ante cibum commodè ex-
 hiberi possunt. Mediocres verò matutinis horis
 in usum veniunt. Quoniam autem te non masti-
 catæ deuorandæ sunt, ob ingratum saporem, te-
 ctorio aliquo indigent. Quæ in re, saccharo, aut
 cinnamomi puluere, aut auri folijs vtimur. Po-
 morū coctorum pulpa inuoluitur potest, vs
 & pane azymo vino molliter perfuso.

De pilulis purgantibus bilem fla-

uam, Cap. 24.

Pilulæ purgantes bilem flauam à

CAPITE.

Pilulæ aureæ, Mel.

Sine quibus. Nic.

Arabica.

Affaieret

Lucis, &c.

R

4

Exempl.

Exempli gratia.

℞. Pilularum Aurearum

Arabicarum

Sine quib. esse nolo añ. 3.

Cum syrupo rosarum lax. fiant pilule
N. 7. auro coopertæ.AB HEPATE.

Pilulæ de Rhabarbaro.

Exempl.

℞. Pilularum de rhabarbaro 3 2.

Aggregatiuarum 3 1.

Diagridij gr. 3.

Cum syrupo de endiuia fiant pilulæ N.
auro obductæ.De pilulis purgantibus pituitam,

Cap. 25.

Pilulæ pituitam purgantes, à

CAPITE.

Pilulæ Cochiz.

Hieræ cum agarico.

De Colocynthide.

Alhandal.

Ex sex rebus. De octo rebus.

Exempl.

℞. Pil. Cochiarum 3 2.

Hieræ cum agarico 3 1.

Cum sy-

Cum syrupo de betonica fiant pil. N. 5.
Pulvere cinnamomi aspersa.

A PECTORE.

Pilula de agarico.
Hiera cum agarico.
Bechica, &c.

A STOMACHO.

Pilula Alephangina
Stomachica.
Mastichina.
Exturbith.
Pestilentialia.

I.

R. Pilularum alephanginarum.
Aggregatiuarum.
De Hiera S. ana ꝑ i.

Aloes optima ꝑ s.

Cum aqua foeniculi fingantur pil. N. 12.

II.

R. Pilul. de agarico
Stomachicarum ana ꝑ s.
Agarici trochiscati ꝑ s.
Diagrid j gr. 2.

Cum aqua absinthij fiant pilula N. 9.

A IUNCTVRIS.

Pilula de Hemodactylis.
Arthritica
Foetida

R s

De Saga-

De Sagapeno.

De Sarcocolla.

Benedictæ.

De Nitro, &c.

De pilulis melancholiam purganti-

bus, Cap. 26.

Pilulæ atram bilem purgantes, ab hepate
liene,

Pilulæ Indæ

Ex fumoterræ

De lapide Armeno.

De lapide lazuli, &c.

Exempla.

I.

℞. Pilul. de fumoterræ

Indarum ana ʒ i. s.

Cum syrupo de epithimo, formentur

lulæ N. 9. auro obductæ.

II.

℞. Pil. de lapide armeno ʒ 2.

De fumoterræ ʒ i.

Diagridij gr. 3.

Cum syrupo de fumoterræ fiant pilulæ

N. 7. auro coopertæ.

De Clysteribus, Cap. 27.

Clyster vel clysterium, à Græco verbo κλύσας, quod est abluerē: quibusdam enāma vocatur, ab ἐνίχυμι, quod illis injicio significat. Componuntur autem ex iusculo, vel decocto, medicamentis purgantibus, oleis, & sale. Interdum etiā mel, aut saccharū, aut vitelli ouorum, aut butyrum, aliāq; eius generis adijciuntur. Deoctrū autem iuxta morbi diuersitatem variari solet. Nunc enim ex ijs, quæ abstergerendi, aut obstructions liberandi, aut astringendi, aut glutinandi facultatem obtinent, paratur. Medicamentorum purgantium vis à morbi causa, siue ipso humore peccante, probè desumitur. Sunt autem vel simplicia, vel composita. Prioris generis sunt turbith, colocynthis, agaricus, sal gemmæ, &c. Composita sunt, Diaphoenicum, Hiera picra, Hiera logodium, electuarium, electroph, electuarium de baccis lauri, Benedicta laxatiua, Elect. Indum, &c. Porro decocti vel iuris cōmunis est libra magna ex parte, vna plus minúsue pro corporis magnitudine, ventris plenitudine, morbi natura, & ætatis ratione. Oleorū verò ʒ. ʒ. Pin-guedinū, mellis, butyri, sacchari ab ʒ. s. vsq; ad ʒ. ʒ. i. Medicamētorū purgatiū, & quidē simpliciū à dtachmis duab; ad ʒ. ʒ. cōpositorū aut ad ʒ. ʒ. i. vel ʒ. i. s. pl; minusue pro viriū ratiōe, & morbi vehementia.

De ʒ. ʒ. i.

De ʒ. ʒ. i.

Mell. ab ʒ. s. ad ʒ. ʒ. i.

ʒ. ʒ. i.

Pin. ʒ. s. ad ʒ. ʒ. i.

ʒ. ʒ. i.

hementia. In febribus enim, & debilibus, febribus, conualescentibus, & intestinorum motionibus, minorem dosim præscribimus: è contrà in apoplecticis, lethargicis, coxendicū doloribus, & in ijs, qui exitiale venenum hauserunt, maiorem dosim imperamus. Vitelli ouorū maxima ex parte, duo aut tres. Salis communis à 1. vsq; ad 3. plus minúsue prout facultatē excretricem proritare necesse est. Cæterum in mortuario omnia diligenter permiscēda sunt, & si q. crassi, aut terreni in fundo resederit, abiiciendū reliquum autem moderatē calidum per vesicam vel syringam duabus, vel tribus horis ante cibum iniiciendum. Detinendi verò tempus non vnū idemq; est: sed pro eorundem diuersitate variatur. Quibus enim abluendi & extergendi vis inest, hi supra horā dimidium in corpore haud retineantur. Dolores mitigantes longiori tempore detineri debent. Omnium longissimo, quibus glutinandi est facultas. Quibus purgandi vis inest, sua sponte erumpere solent. Quod si tamen diutius in corpore cunctantur, glandem supponere conuenit, vi facultas expultrix excitetur noxia tandem expellantur.

Salis in 3ij.

De clysteribus alterantibus,

Cap. 28.

Clyster leniens

℞. Maluē. Bismaluē
 Parietariā. Atriplicis ana M. i.
 Sem. lini. Foenigraci ana P. i.

Decoquantur in sufficienti quantitate aquæ
 ad consumptionem tertiæ partis, fiat colatura,
 e qua accipe lib. i. cui adde

Sacchari rubri ʒ 3.

Olei communis ʒ 3.

Salis ʒ i.

Misce & fiat clyster.

I I.

℞. Maluē
 Altheæ
 Violariæ
 Mercurialis
 Hordei ana M s.

Fiat decoctio in sufficienti quantitate aquæ
 ad consumptionem tertiæ partis, fiat colatura,
 e qua accipe lib. i. cui adde

Cassia recent. extracta

Sacchar. rub. añ. ʒ i. s. Olei violacei ʒ 3.

Misce & fiat clyster.

I I I.

℞. Iusculi caponis lib. i.

Vitell. l.

270 PRACTICÆ GENERALIS

Vitell ouorum N.2.

Mellis ros.col. ℥ 1. Olei cōmunis ℥ 2.

Commisceantur singula, fiatq; clyster.

IV.

℞. Decocti hordei lib.1.

Vitell.ouorum N.2.

Sacchari rubri ℥ 1.

Mellis ros. ℥ 1.

Olei communis ℥ 3.

Commistis omnibus fiat enæma.

EMOLLIENS ET LENI-

ens, in colica.

V.

℞. Olei communis ℥ 5.

Anethini

Chamomelini ana ℥ 2.s.

Misce & fiat clyster.

LAVATIVVS.

VI.

℞. Betæ

Brassicæ

Althææ ana M i.s.

Hordei M.i.

Decoquantur in aqua vel leui lixiuio ad tertiam
partis consumptionem, fiat colatura, de qua acci-
pi pel.1. cui adde

Vitell.ouorum N.1.

Mellis ros.col. ℥ 1.

Salis ℥ 3.

Misce & fiat clyster.

ASTRINGENS. IN DY-senteria.

VII.

℞. Rosarum rubrarum

Balaustij

Hordei torrefacti

Baccarum myrthi ana M. s.

Contundenda bulliant in sufficienti quanti-
tate aquæ cum capite castrati, donec caput sit
octum, fiat q; colatura, de qua accipe lib i. adde

Boli Armeni

Sanguinis draconis ana ℥ i.

Olei rosati

Omphacini ana ℥ i. s.

Pinguetinis capi ℥ i.

Virell. ouorum assat. N. i.

Misce & fiat clyster.

GLVTINANS.

VIII.

℞. Plantaginis

Poligoni

Consolidæ mediæ

Saniculæ

Rosarum ana M. i.

Rad. consolidæ maioris ℥ i.

Balaustiarum ℥ i.

Coquantur.

272 PRACTICÆ GENERALIS

Coquantur ad tertias, fiatq; colatura, de qua
accipe ʒ 14. quibus adde

Succi plantaginis ʒ 1.

Sanguinis draconis ʒ 2.

Seui caprini ʒ 1.

Olei myrthini

Rosacei

Cotoneorum ana ʒ 1.

Commistis omnibus, fiat clyster.

DOLOREM SEDANS.

I X.

℞. Anethi

Violarie

Flor. chamomillæ ana M. r.

Sem. lini

Fœnigræci ana M. s.

Fiat decoctio, de qua accipe lib. r. cui adde

Virell. ouor. N. r.

Olei anethini ʒ 3.

Salis ʒ i. s.

Misce & fiat clyster.

X.

℞. Olei anethini

Chamomelini ana ʒ 5.

Mal. aureorum ʒ 2.

Misce & fiat clyster.

De clyster

De clysteribus purgantibus,

Cap. 29.

BILEM FLAVAM. I.

℞. Hordei
 Violaria
 Mercurialis ana M. i.

Fiat decoctio, de colatura accipe ℥ 12. quibus
 adde, Diacatholiconis ℥ 1.

Electuar. de succo ros. ℥ 6.

Olei violati ℥ 3.

Salis ℥ s.

Misce, & fiat clyster.

PITUITAM. I I.

℞. Origani
 Chamomilla
 Meliloti
 Foenigraci ana M. i.

Coquantur in aqua vsq; ad consumptionem
 tertix parris. De colatura accipe lib. i. cui adde

Diaphoeniconis

Electuar. Indi maioris

Benedictæ laxatiuæ

Hieræ picæ S. ana ℥ s.

Olei chamomelini ℥ 2.

Rutacei ℥ 1.

Salis ℥ 3.

Misce, & fiat clyster.

S

I I I.

III.

℞. Betonice. Saluie
 Maioranæ. Serpilli
 Hyssopi. Rutæ
 Flor. stœchadis ana M.s.
 Colocynthidis ℥ 1.
 Agarici optimi ℥ 3.

Coquantur ad tertias. De colatura acci-

pe ℥ 15. quibus adde
 Benedictæ laxat.
 Hieræ picæ ana ℥ 5.
 Diaphœniconis
 Electuar. Indi ana ℥ 2.s.
 Mellis ros. col. ℥ 1.
 Olei laurini
 Rutati ana ℥ 1.s.
 Salis communis ℥ 2.

Commistis omnibus fiat clyster.

IN MATERIA FRIGIDA.

& vehementi auctoq; dolore.

I V.

℞. Centaurij minoris
 Saluie
 Abrotani
 Calamenti ana M.s.
 Origani

Marrubij

Stœchadis ana P. i.

Anisi. Sem. basiliconis ana ʒ s.Pulpæ colocynthidis ʒ 2.

Furfuris M. i.

Mellis anacardini ʒ i.Olei castorei ʒ 3.Salis gemmæ ʒ 2.

Hiera picræ

Hellebori albi ana ʒ 6.

Billiant omnia in suff. quantitate aquæ, ex-
cepta Hiera, ad consumptionem medietatis, fiat
colatura, de qua accipe lib. i. cui adde Hieram
supradictam, & tepide infundatur. Est enim ef-
ficax: propterea vltimum. Soluit materiam
hlegmaticam. Idcirco paralyfi, & apoplexiæ
prodest.

MELANCHOLIAM.

V.

℞. Violarum

Maluæ. Altheæ

Meliloti ana M. i.

Fiat decoctio. de qua accipe lib. i. cui
adde

Vitell. ouor. N. i.

Diacatholiconis

Confect. Hamech. ana ʒ i.Olei communis ʒ 3.

S 2

Salis

Salis ℥ i.

Misce, & fiat clyster.

VENTOSITATES RE.soluens. VI.

℞. Decocti carminantis lib. i. cui adde

Benedictæ lax.

Sacchari rubri ana ℥ i.

Mellis rosat. col. ℥ 2.

Butyri recentis ℥ 3. vel

Pinguedinis Gallinæ

Anseris

Anatis ana ℥ i.

Olei rutacei ℥ 3.

Salis ℥ 3.

Misce, & fiat clyster.

CLYSTER PRO OMNIinfirmate. VII.

℞. Iuris carniū vel

Decocti maluæ, violariæ, & hor-
dei lib. i.

Sacchari rubri ℥ i. s.

Vitell. ouorum N. i.

Olei violati ℥ 3. Salis ℥ 3.

Misce, & fiat enama.

De suppositorijs siue glandibus.

Cap. 30.

Glands, siue *βάραν* & Græcis, Barbaris à subijciendo, suppositorium: glandium figura conformatum medicamentum, quo aliquando utimur in his, quorum aliud ob stercus arrius non purgatur, vel ad educenda, quæ per clysterem injecta non redduntur: vel in quibus vires languent, ob id clysteris iniectionem non tolerant, sed in sita, ut altius impellantur, molliant, extrahant, erodant, & pruriendi vi, non modo cessantia sollicitent excrementa, verum etiam mucosum humorem vehementius extrahant, flatu dissipent, dolores sedent, stupefaciant. Sunt autem quædam leues, quales sunt, quæ ex betæ radice, melle peruncta, suillo adipe, sale conspersæ, sive in unguenta, & butyro adiecto sale, & id genus alijs parantur. Quædam verò mediocres, ut sunt, quæ à vitello oui, addito sale, componuntur. Item quæ à sale & melle duntaxat construuntur. Nonnullæ sunt vehementiores, quales sunt, quæ scammonium, colocynthidem, euphorbium, iisque similia accipiunt. Cum autem omnis ferè generis glandibus mel accedat, sciendum erit, illud sic esse commiscendum ut pondere suo speciebus respondeat. Quare

ad 3j. f. m. m. d. i. j. g.
 danda opera, vt drachmæ viii specierum & salis, vncia vna mellis addatur. Neque dum componuntur glandes, sunt admouendæ species, nil postquam mel satis concretum fuerit, quod alias vis illarum ignis vehementia dissipetur. Mel autem lento igne in exiguo cacabo ad spissitudinem vsque incoquitur: mox in asserem coniectum, in glandes indicis, aut digiti modo lōgas, crassasque formatur. Dum autem glandes subiiciuntur, prius oleo, butyro, aut alia pinguedine illitas esse oportet: sic enim minori molestia induntur. Indūtur autem ante cibum vna vel duabus horis. Porro species, quas glandium compositiones accipiunt, aut aluum deiiciunt, aut flarus discutiunt, aut stupefaciunt, vt ex formulis sequentibus perspicuè patebit.

I.

℞. Mellis cocti, & concreti ℥ 2.

Pul. euphorbij ℥ s.

Colocynthis gr. 4.

Hellebori albi gr. 2.

Salis ℥ i.

Misceantur singula, & formentur glandes.

II.

℞. Mellis ℥ i.

Spec. hieræ picæ ℥ i.

Salis gemmæ ℥ s.

Decoquatur mel, donec crassitudinem iustam accipiat:

accipiat: deinde addantur species, & sal, formenturque glandes.

III.

R. Semen. anisi

Cumini

Foeniculi ana ꝑ i.

Carei ꝑ 2.

Colocynthis ꝑ i.

Salis communis ꝑ i.

Puluerizentur singula, & cum mellis concreti ꝑ i. s. coeant, digeranturque in glandes.

IV.

R. Opii ꝑ i.

Croci. Castorei ana ꝑ s.

Tusa & cribrata cum melle cocto, aut cera, & oleo nymphet in vnum coeant, formenturque glandes, quibus filum appensum est.

De pessis, Cap. 31.

Pessus Barbaris pessarium, pro vterino clysteri quibusdam vsurpari consuevit. Horum tres sunt differentie. Alij siquidem emolliunt, alij astringunt, alij aperiunt. Emollientes ex cera, oleis, pinguedinibus anseris, aut gallinae, butyro salis experte, resina, medulla ceruina, foenogracæ & similibus fiunt, fiunt autem ad crassitudinem instar strigmeti, & paulo spissiore, deinde

linamento tortili similis duplicata, in medicamento tincta, ori vulvæ condenda sic est, ut filum prælongum alligatum habeat, quò faciliù possint extrahi, quando visum fuerit: nunc linteo, sericòue tenuissimo obducta, ad digiti formam confuta, genitalibus mulierum partibus induntur. Aperientes verò parantur ex melle, artemisia, dictamnò, brassica, glycyrriza, succo rutæ, porro, scammonio, & id genus alijs. Astringentes componuntur ex bolo armeno, sanguine draconis, succo plantaginis, bursa pastoris, stercore porcino, &c. Hac autem ratione componuntur, ut ad ceram, aut mellis cocti vniâ vnam etiam medicamenti morbo accommodati altera misceatur. Subijciuntur autem vesperi, & dum somni tempus appetit, & sex, aut septem horis in vtero relinquuntur, ac subindè extrahuntur. Porro emollientes vteri inflammationibus, exulcerationibus, auersionibus, & inflationibus accommodantur. Aperientibus verò utimur, cum suppressos menses euocare, aut vterum conuenientem, aut compressum emendare conamur. Adstringentes contrarium aperientibus usum præbent. Nam fluxum muliebrem cohibent, & apertum, laxumue vterum contrahunt, prolapsumque reprimunt, atque propulsant.

LIBER V.

287

PESSVS EMOLIENS. I.

℞. Butyri salis experti ℥ 3.

Medullæ ceruinæ

Adipis anseris

Gallinæ ana ℥ i. s.

Masticis. Melibti ana ℥ i.

Sem̃n. lini

Fœnigraci ana ℥ i. s.

Otorum vitella N. 3.

Olei rosacei

Iriani ana ℥ s.

Ceræ q. sufficit ad crassitudinem iustam indu-
endam: deinde lana duplicata in hoc medica-
mento intincta, vtero subijciatur.

PESSVS APERIENS MEN-*sesq. mouens. I l.*

℞. Pul. pil. foetidarum ℥ 6.

Succi mercurialis, quantum sufficit,
fiat pessus, & linteolo illigatus, vtero in-
feratur.

III.

℞. Artemisia. Abrotani

Dictamni ana ℥ i.

Rad. acori

Rubia tinct. ana ℥ 6.

Nigellæ ℥ i.

Baccarum lauri ℥ s.

Rutæ ℥ i. Sabinæ ℥ s.

Castorei gr. 5.

S s

Myr-

282 PRACTICA GENERALIS

Myrrhæ. Stactis ana ℥s.

Sagapeni ℥2.

Tufis, & cribratis ijs, quæ opus est, mel quantum satis est, vt in coalitum crassiores, vnitatem coeant, adijciatur & vbi opus est fingantur pessi, qui invuluam indantur.

PESSVS ASTRINGENS.

I V.

℞. Cornu ceruini vsti ℥1.

Thuris ℥2. Gallarum ℥1.

Balaustiorum

Ros. rub. ana ℥2.

Gummi. Acaciæ

Hypocystidis ana ℥1.

Boli armeni ℥s. gr. s.

Succi plantaginis quantum sufficit ad excipiendum: & linteolis deligantur fingantur pessi.

METENCHITA I.

℞. Succi vel decocti arthemisiæ ℥3.

Olei liliorum

Ex sem. lini. Laurini ana ℥1.

Myrrhæ ℥1 s.

Sagapeni. Castorei ana ℥1.

Committis omnibus fiat clyster.

I I.

℞. Succi plantaginis ℥4.

Olei myrrini

Maffi

Mastichini ana ℥r.

Succini Thuris

Boli armeni ana ℥i.

Trochiscorum è spodio

E terra lemnia ana ℥r.

Terenda terantur, & commisceantur, fiatque metenchyta.

De Errhynis, Cap. 32.

E Rhina, id est per nares purgantia, vulgò nasalia appellantur. naribus induntur, in pyramidis figuram, pulueribus, melle, adipe, aut cera compactis, vt in sequentibus formulis patebit. Filo alligari solent, vt commodius elician-
tur. Vsus est in diuturnis capitis affectibus, morbo comitali, oculorum hebetudinibus, narium obstructionibus, odoratus difficultate, &c. Vti-
mur autem ijs, corpore prius euacuato.

℞. Nigellæ

Nucis moschatæ

Cubearum

Caryophyllorum ana ℥s.

Piperis albi

Pyrethri ana ℥i.

Maiorane. Cyclamini

Saluix ana ℥i.

Tusa & puluerata terebinthina, & modica

cera

284 PRACTICÆ GENERALIS
cera excipe, & in formam pyramidalem effinge
filo alligatum naribus inde, valentius fit adden-
do Hellebori albi ꝑ i.

De caput purgijis, Cap. 33.

CApud purgia sunt, quæ naribus liquida in-
funduntur, & attrahuntur, capite ad poste-
riora propenso, post ingentem insufflatum, cum
spiritu ipso, ne statim deorsum ruat, aliquantu-
lum continetur, ore prius aqua oppleto: ne scili-
cet è naribus, per internum meatum ad os cor-
ruet. E succis herbarum, betæ scilicet, brassicæ,
cyclamini, maioranæ, foliorum enulæ, liquori-
busque ijs similibus, oleis, & speciebus medi-
camentorum præcedenti capite commemora-
torum; nempe piperis, pyrethri, nitri, nigellæ,
castorei, hellebori albi, & horum similium com-
ponuntur. Sufficit autem vna vice semiunciam
succorum infudisse. Vfus idem vt errhinorum.

I.

℞. Succi betæ ꝑ 2.

Aquæ maioranæ ꝑ 4.

Pul. sacchari ꝑ s. vel

Mellis rosæ. col. ꝑ s.

Misce, & repidum per nares attrahe.

I.

℞. Succi betæ

Bras-

LIBER V.

225

Brassica. Cyclamini ana \mathfrak{z} i. s.

Cōmiscantur, naribusq; infundantur.

III.

R. Succi betæ \mathfrak{z} i. s.

Cucumeris syluestris \mathfrak{z} 3.

Aquæ maioranæ \mathfrak{z} 2.

Cubebæ. Nigellæ

Piperis albi ana \mathfrak{z} i.

Terenda terantur, cōmiscantur, & naribus fundantur.

IV.

R. Rad. cucumeris syluestris \mathfrak{z} i.

Nigellæ. Piperis albi

Myrrhæ ana \mathfrak{z} 2.

Tritis & contusis addatur olei de piperibus, mod fatis est, & naribus illinatur.

De Sternutamentis, Cap. 34.

Sternutamenta sunt, quæ sicca naribus indita, aut calamo inspirata sternutamenta ciunt, quæ adeo puitam, ac mucum à cerebro elidunt. Conficiuntur ex pipere, pyrethro, helleboro albo, castoreo, nigellæ, maiorana, & id genus alijs, ut formulis sequentibus parebit. Adonedi sunt qui sumunt, ut sursum rapiant. Vfus em ut errhinorum. A.

R. Nigellæ. Maioranæ

Caryophylloium ana \mathfrak{z} 2.

Zin-

Zingiberis. Piperis albi

Struthij añ ʒ i. Castorei ʒ s.

Tritis & commissis fiat sternutamentum.

I I.

℞. Cubearum

Nucis Moschatæ

Rad. iridis ana ʒ s. Pyrethri ʒ i.

Hellebori albi ʒ s.

Piperis albi. Acori ana ʒ i.

Tritis vtitor.

Mastica.
foris.De apophlegmatismis, Cap. 35.

Apophlegmatismi, vulgò masticatoria, varijs
 vsus medicamina, vel trita, in sacculum con-
 iecta, dentibus premuntur, & per os diducun-
 tur: vel integra, vel contusa, succo aliquo exci-
 piuntur, & diu in ore retenta, vel masticata, sali-
 uam exciunt, noxiosque humores à capite,
 quòd maximè expurgatur, in os deriuant. quo
 tunc deorsum nuere oportet, atque attractam
 materiam expuere. Fiunt ex syrupis, hyssopo, ori-
 gano, thymo, pulegio, mastiche, zingibere, pi-
 pere, pyrethro, radice acori, corticibus capparo-
 rum, vua passa, & id genus alijs. Vtendum au-
 tem matutino tempore, corpore prius euacua-
 to. Post vsum illorum, aqua calida os abluen-
 dum erit, &c. Vsus idem vt exrhinorum est.

I. ℞. Py.

I.

℞. Pyrethri. Cubebarum.

Staphisagria ana ʒ 2.

Masticis. Piperis albi ana ʒ s.

Passularum enucleatarum ʒ 2.

Contusis singulis, fiat sacculus mandu-
catilis, vel ex melle exceptis, fiat pastilli
manfiles. II.

℞. Origani. Hyslopi ana ʒ i.

Sinapi ʒ 2. Piperis albi ʒ i. s.

Zingiberis ʒ i. Masticis ʒ i. s.

Trita excipiantur succo betæ, aut melle,
& formentur manfiles pastilli.III.

℞. Staphisagria.

Cubebarum ana ʒ i. s.

Maceris ʒ i.

Cort. rad. capparis ʒ 2.

Rad. acori

Nucis moschatæ ana ʒ s.

Trita excipiantur mastiche, pistillo calido ad-
hibito, singanturque pastilli manfiles.De Gargarismis, Cap. 36.

Gargarisma liquidum est medicamentum,
spirituosè in faucibus agitandū, at nō deglu-
tiendum, in synanche potissimū, gulæ, & capitis
affecti.

*Quibus affectibus
conueniat*

affectibus vsitatum, ex liquoribus stillatitijs, vè decoctis, syrupis, alijsque diuersimodè paratus. Quidā obseruant, vt ad succos medicatos, vel syrupos, triplum liquorum adijciatur. Verbi gratia, si serapiorum, & succorum medicatorū \bar{z} 2 sint, liquorum esse debent \bar{z} 6. In horum autem vsu obseruandum, vt tepida quadam caliditate præditi ori admoveantur, id quod tamen in ijs qui in destillatione capitis ex tenuibus & acris humoribus excitato adhibentur, haud fieri debet: nam in illa, quò scilicet citius sistatur, frigiditas etiā vti licet. Porro gargarizatum qualitate pro affectus diuersitate variatur. Alij namq; reprimunt, alij extergunt, aut discutiunt: nonnulli aliquid è capite eliciunt. Tempus autem vsurpandi matutinum est conueniens, & vespertinum ante cibum.

I.

- ℞. Diacoriij. Diamori ana \bar{z} 1 s.
 Vini granatorum
 Aceti ros. ana \bar{z} 1.
 Aqu. rosar. \bar{z} 2.
 Aqu. plantaginis \bar{z} 4.

Misce, & fiat gargarismus.

II.

- ℞. Succus è Ribes
 Ex oxyacantha ana \bar{z} s.
 Diamori \bar{z} 1.

Syrup

Syrupi de papauere 3 s.

Succi fragorum 3 3.

Aceti 3 s.

Aquarum rosarum

Plantaginis ana 3 i. s.

Acetosæ. Lactucæ

Fragariæ ana 3 i. s.

Solani 3 i.

Nymphaeæ 3 s.

Prunellæ 3 i.

Commistis omnibus fiat gargarisma.

III.

R. Prunellæ. Fragariæ

Plantaginis. Acetosæ

Polygoni. Saluiæ ana M. i.

Ros. rub. M. s.

Gallarum

Balaustiorum ana 3 2.

Consolidæ maioris 3 s.

Coquantur in aqua fontana, ad tertias: de

latura accipe 3 i. quibus adde

Diacorij. Diamori

Syrupi myrtini ana 3 i. s.

Aluminis 3 i.

Bulliant iterum, fiat q; gargarismus.

IV.

R. Maioranæ. Saluiæ

Betonicæ. Origani ana M. i.

T

Pipe-

290 PRACTICÆ GLNERALIS

Piperis longi. Cubebarum ana ℥ i.

Pyrethri. Zingiberis ana ℥ s.

Coquantur in libra vna aquæ vsque ad tertiam partis consumptionem. Colaturæ adde.

Mellis rosati col. ℥ i. s.

Oxymellis scillitici ℥ i.

Commistis omnibus singatur gargarismus.

V.

Rx. Aquarum Betonicæ

Hysopi

Origani ana ℥ i. s.

Oxymellis scillitici ℥ 2.

Hieræ picræ ℥ s.

Misce, & fiat gargarizatus.

De Trochiscis, Cap. 37.

T Rochiscus, vel pastillus, siue placentula Latinis, est medicamentū planum, in rotā, aut orbiculi, seminisue lupini formam coactum, et si quadrati hodie pluribus fiant, simplicibus ad compositionem aptis, in pollinem tritis, conueniente humore subiguntur, & in pastillos temperatè digeruntur: qui quum postulat vsus triti ex aqua, aut vino, aut alio quouis cōperenti liquore, præstantur ebibendi. Porro pastillorum qui citra aliorum medicamentorum commistionem sumuntur, pondus haud excedat drachmam vnā,

am, vel drachmam vnam & semis. Et ij sanè,
eorum compositionem opium ingreditur, pō-
re ꝑ i. aut. ꝑ s. dantur. Nonnunquam antido-
s, succis, saccharis, catapotijs, clysteribus, vn-
entis, alijsque eius farina commiscuntur. Cē-
rum cum quibus partibus consentire debeant
Trochisci, ipsa pars affecta commodè docebit. Si-
idem alij respiciunt

C A P V T.

Trochisci Gallia moschata.

De agarico, &c.

P E C T V S.

Trochisci Alipta moschata.

De agarico.

De terra sigillata.

Becchij, &c.

V E N T R I C V L V M.

Trochisci Ramich.

Diarrhod. Abbaris.

De berberis.

Gallia moschata.

De Rosis.

De Caphura.

De spodio.

H E P A R.

Trochisci Ramich.

De eupatorio.

De lacca. De Rhabarbar.

292 PRACTICA GENERALIS

Diarrhod. Abbatis.

De berberis.

De rosis.

De caphura.

De spodio.

De absynthio, &c.

S P L E N E M.

Trochisci de capparibus.

De eupatorio.

De laeca, &c.

R E N E S. E T V E S I C A M.

Trochisci de halicacabo.

De terra sigillata, &c.

M A T R I C E M.

Trochisci de Myrtha.

De terra sigillata.

De Carabe, &c.

T O T U M C O R P U S.

Trochisci Alhandali, &c.

Porro cum trochisci commodè deglutiri nequeant propter rotunditarem depressam, Medici in forma pilularum, aut electuarij, aut pulveris exhibere consueverunt, hoc modo.

I.

Trochiscorum bechicorum.

De terra sigillata ana 3 s.

Cum syrupo de papauere quantum satis est, fiant pilula N. 5. vel 6.

I I.

R. Pil. foetidarum ʒ i.

Trochiscorum è myrrha ʒ i.

Cum aqua arthemisiae formentur pilulae N. II.

I I I.

R. Trochiscorum de eupatorio ʒ i.

Sacchari in aqua absynthij dissoluti,
quātum satis est, fiant tabulae, vel rotuli.

I V.

R. Trochiscorum è succino

E spodio ana ʒ 2.

Consolidę maioris

Boli armeni

Balaustiorum ana ʒ i.

Tusis & cribratis singulis commisceantur,
fiatque puluis.De Collyrijs, Cap. 38.

Collyria, id est ocularia medicamenta, quædam liquida sunt, priuatim hac voce nuncupata: quædam arida, Barbaris Sief, vel pastillo-
rum more, aut pyramidarum instar compacta. Liquida fiunt ex aquis destillaris, vt rosarum, plantaginis, myrthi, portulacę, caprifolij, &c. aut ex succis herbarum frustuumue repurgatis, quibus parum albuminis ouorum adijcitur: quorum gutta vna, aut altera oculorum angulis

Sief.

Liquida.

Arida

294 PRACTICÆ GENERALIS
instillatur. Arida ex metallicis conficiunt
herbis, floribus, fructibus, alijsque planta
partibus, tenuissimè tritis, ac liquore aliquo
petenti, in pyramidis ferè, vel trochiscorum f
mam redactis: quæ vsus tempore, vel trita, ac
coteleuigata, & in tenuissimū pollinem coad
aqua aliqua dissoluta, instillantur: vel arida
spirantur, aut intra palpebras ponuntur. Poi
vrimur his in oculorum diuersis morbis, vlce
bus, vulneribus, fistulis, suffusionibus, & id g
nus alijs. Sed formulis res clarior erit.

I.

℞. Aquarum rosarum.

Plantaginis ana ℥ i.

Collyrij albi in coteleuigati ℥ 3.

Misce, & fiat collyrium.

I I.

℞. Aquarum plantaginis

Rosarum ana ℥ i. s.

Collyrij è glaucio ℥ i.

E rosis ℥ s.

Cerussæ lotæ

Boli armeni ana ℥ i.

Opij gr. 3. Croci gr. 2.

Commistis omnibus, fiat collyriū liquidum

I I I.

℞. Aquarum rosarum

Euphrasiæ

Cheli

Chelidonij maioris

Fœniculi ana ℥ i.

Vini optimi ℥ i. s.

Aloes ℥ i.

Tutiæ præparatæ ℥ s.

Commistis omnib. fiat collyrium liquidum.

I V.

℞. Cerussa decies in aqua rosa. lota ℥ i.

Sarcocollæ ℥ 2.

Tragacanthæ

Amyli ana ℥ i.

Opij gr. 4.

Leuigata omnia, & succo fœnigræci excepta,
in collyria digerantur arida.

V.

℞. Lycij

Boli armeni ana ℥ i.

Aloes

Acaciæ ana ℥ i.

Gummi ℥ i. s.

Collyrij è glaucio ℥ 6.

Cum succo cotoneorū, fiant collyria arida.

Porro vtimur collyrio rosaceo, & è glaucio,
cū astringendi aut reprimendi necessitas vr-
get. Albo verò & rubro, cū glutinandi: viridi
verò cū erodendi, &c.

De Electuarijs, Cap. 39.

Electuaria, antidota liquida sunt. Hodie ferè
componuntur ex conferuis, conditis, specie-
bus electuاريorum, alijsque medicamentis cor-
roborantibus, additis syrupis appropriatis: ita
vt communiter pro qualibet vncia cōseruarum,
drachma vna specierum ponatur, plus minusue
pro Medici intentione: conditorum verò dosis
3 i. non excedat: syrupi verò, quantum ad ele-
ctuarij iustam consistentiam sufficit, vt in se-
quentibus formulis videre licebit. Porro quali-
tatem electuariorum ipse affectus, siue mor-
bus indicabit. Modus verò exhibitionis à
drachma vna, vsque ad 3 2. pro sumentis habitu
& affectu. Dantur duabus horis ante cibum, id
quod rectè fit in illis, quæ stomachum confor-
tant. Quæ autem caput iuuant, exhibeantur post
coenam vna hora fabæ quantitate. Ceterum qui-
bus membris appropriata esse debeant electua-
ria, ipsa pars affecta commodè demonstrabit.
Iuuabunt autem, atque excalfacient

C A P V T

Aurea Alexandrina.

Plurifarcoticum.

Theriaca fermentata.

Mithridatum.

Diabolibanum.

Theriack diatelsaron.

Dia-

Diacastorium.
 Theodorum.
 Confectio anacardina.
 Nux Indica condita.
 Diambra.
 Diamoschum. *Diapœonias.*
 Diacorum.
 Chebuli conditi.
 Dianthos.
 Conserua saluæ.
 Conser. Flor. stœchadis.
 Conser. maioranæ.
 Conser. betonicæ.
 Conseru. rorismarini.
 Cōser. primula veris, &c.

Verbi gratia.

3. Conseruæ maioranæ
 Betonicæ
 Florum rorismarini añ. 36.
 Spec diambre
 Diamoschi ana 2.
 Nucis Indicæ conditæ
 Myrobalanorum chebulorum con-
 dit. añ. 32.
 Misce, & cum syrupo de betonica, vel
 de Stœchade fiat electuarium.

T 5

ELECT.

298 PRACTICÆ GENERALIS
ELECT. CALEFACIENTIA

Pectus.

Diakis. Diapenidium.
Diaprassium.
Diahyssopum.
Diacalamentum.
Diatragacanthum cal.
Diathamaron.
Loch de pino.
Loch sanū & expertum.
Loch de scilla.
Loch de pul. vulpis.
Conserua hyssopi.
Conserua capill. veneris, &c.

Exemp.

℞. Conseruæ hyssopi
Capill. veneris ana ℥ i.

Spec. diapenidij
Diaireos simp. ana ℥ i.

Syrupi de hyssopo vel de glycyrrhi-
za q. satis est.

Commistis omnibus, fiat electuariū.

ELECT. CALEFACIENTIA COR.

Aromaticum rosatum

Diambra. Dianthos.

Diamargaritum cal.

Diagemma. Dianoschum.

Aromaticum Caryophyllatum.

Elect.

*Thamar Arabico
diathylum fiat.*

Elect. laticantis.

Diaxyloaloes.

Plirisarcoticum.

Confectio citri. *Confect. liberantis.*Cort. citri conditi. *Cordialis.*

Nux moschata condita.

Buglossum conditum.

Elect. pomorum.

Conserua borraginis.

Confer. bugl. Confer. melissæ.

Conserua anthos, &c.

B. Conseruæ anthos ʒ s.

Borragin.

Buglossæ ana ʒ i.

Spec. Diamarg. calidi

Plirisarcotici ana ʒ 2. vel ʒ i.

Cort. citri conditi ʒ s.

Cum syrupo conseruationis citri formetur e-
lectuarius auro coopertum.ELECT. CALEFAC. STOMACH.

Theriaca fermentata.

Mithridatum.

Aromaticum rosatum.

Diagalanga.

Dianisum.

Diaciminum.

Diacinnomum.

Dia.

Diapente Diatrion pipereon.
Uleb. & citro Diazingiber. Diaxyloaloes.
bac. laury. Galanga condita.
R. satanovella Ginger conditum.
 Conferua mentha.
 Diacitonium cōpos. &c.

R. Conferua mentha ζ 2.

Diacitonij compos. ζ s.

Spec. aromat. ros.

Diagalanga ana ζ s.

Zingiberis conditi ζ s.

Cum syrupo de mentha fiat electuariū.

ELECT. CALEFAC. HEPAR.

Diacinnamomum.

Diacalamentum.

Confectio Ravedseni.

Diacostum.

Conferua eupatorij.

Conferua capill. veneris.

Dialacca. Diacurcuma

R. Conferua eupatorij ζ i. s.

Capill. Ven. ζ s.

Spec. diacinnamomi ζ i.

Diacost. ϑ s.

Cum syrupo de eupatoria fiat electuariū.

ELECT.

ELECT. CALEFAC. SPLENEM.

Diacalamentum
 Diacapparis. Diacostum
 Conserua borraginis.
 Triphera magna.
 Triphera minor.
 Acorus conditus.
 Conserua eupatorij, &c.

℞. Conseruæ eupatorij ℥ 2.
 Borraginis ℥ s.
 Spec. diacalamenti ℥ 2.
 Acori conditi ℥ s.

Cum syrupo de calamentho fiat electuarium.

ELECT. CALEFAC. MATRICEM.

Electuar. de gemmis.
 Diacalamentum.
 Diambra.
 Tryphera magna.
 Diamoschum.
 Elect. ducis. Elect. dulce. *Elect. X. a. s. s. s.*
 Conserua arthemisiæ.
 Conserua melissæ.
 Extractum iuniperi.
 Conserua maioranæ, &c.

℞. Conseruæ melissæ ℥ 1. s.
 Maioranæ ℥ s.

Spec.

302 PRACTICÆ GENERALIS

Spec. diagemmæ ʒ i. s.

Extracti iuniperi ʒ i.

Cum syrupo de arthemisia fiat electuarium.

ELECT. CALEF. IVNCTVRAS.

Confectio anacardina.

Diazingiber. Diacorum

Acorus conditus

Conserua saluix

Conserua flor. rosinarini.

Conser. flor. stœchados.

Conser. primula veris, &c.

ʒ. Conserua saluix ʒ i. s.

Anthos ʒ s.

Spec. Diazingiberis ʒ i. s.

Acori conditi ʒ s.

Cum syrupo de stœchade fiat electuarium.

ELECT. FRIGEFAC. CAPVT.

Diacydon. Loch de papauere.

Conserua rosarum.

Conserua violarum.

Conserua flor. nenuphar.

Philoniũ persicum, &c.

ʒ. Conserua rosarum

Nenupharis ana ʒ i.

Loch de papauere ʒ s.

Cum syrupo de papauere fiat electuarium.

ELECT.

ELECT. REFRIGER. PECTVS.

Diatrachanthum frigidum.

Diapenidion sine spec. calidis.

Diapapauer. Loch de farfara simp.

Conserua violarum.

Elect. violarum.

℞. Conseruæ violarum ʒ 2.

Spec. diatrachanthi frig.

Diapenidij ana ʒ 1.

Cum syrupo violaceo fiat electuarium.

ELECT. FRIGEFAC. COR.

Diamargariton frig.

Diarrhod. Ab. sine spec. cal.

Thiasandilum. Manus Christi perlata.

Conserua. rosarum.

Conserua buglossæ.

Conserua acetosæ.

Poma condita, &c.

℞. Conseruæ acetosæ

Rosarum. Borrag.

Buglossæ ana ʒ s.

Spec. diamarg. frig. ʒ 1.

Margaritarum preparatarum

Corallij rubri preparati ana ʒ s.

Fol. auri N. 3.

Cum syrupo acetosæ fiat electuarium auro
ductum.

ELECT.

304 PRACTICÆ GENERALIS
ELECT. FRIGEFAC.

Stomachum.

Triasantal.

Diacitonium sine spec. cal.
 Diarrhod. Abb. sine spec. cal.
 Electuar. de sorbis.
 Cōser. rosar. Conser. viol.
 Cotonea condita.
 Mespila condita, &c.

R. Conserua rosarum
 Violarum

Diacitonij simp. ana ℥i.

Spec. diarrhod. Abb. ℥s.

Cum miua cotoneorum fiat electuariū.

ELECT. FRIGEFAC. HEPAR.

Triasantal. Diarrh. Abb.

Conserua rosarum

Conserua violarum

Conserua cichorij

Rad. cichorij conditi, &c.

R. Conserua cichorij

Violarum ana ℥i.

Rosarum ℥s.

Spec. Triasantali

Diarrhod. Abb. ana ℥s.

Rad. cichorij conditi. ℥s.

Cum syrupo de endiuiā fiat Electuarium.

ELECT.

LIBER V.

30

ELEC. FRIGEFAC. SPLENEM.

Triafantalum.

Diarrhod. Abb.

✓ Conserua violarum.

Conserua buglossæ.

ELECT. FRIGEFAC. MATRICEM.

Triafantalon.

Diarrhod. Abb.

Conserua nenupharis

Conserua violarum

Conserua rosarum, &c.

De Tabulis, rotulis, & morsellis,

Cap. 40.

Solidorum confectiō triplex est forma, rotunda videlicet, quadrata, & oblonga. Quæ rotundam orbicularemq; formam recipiunt, Orbiculi, siue rotula dicuntur. Quæ quadrata forma emunguntur, Tabulae nominantur. Quæ figuram oblongam accipiunt, Morselli appellantur. Componuntur magna ex parte, ex speciebus electuariorum, & saccharo in aqua stillatitia aliqua conuenienti, dissoluto, & ad perfectionem decocto. Interdum caponum, & perdicum pulpæ, amygdalæ, nuces pineæ, vix passæ, & id genus alia, commiscentur. Fiunt nonnunquam ex medicamentis, quæ aluum soluunt, in puluerē

V

reductis,

306 PRACTICÆ GENERALIS

redactis, & tabulæ purgantes dicuntur. Porro specierum & medicamentorum qualitas ab ipso affectu desumenda erit. Proprietas verò a ipso loco affecto. Quæ autem proprietatem cur capite, pectore, corde, stomacho, hepate, splene, matrice, &c. habeant, ex præcedenti capite petenda erunt. In rotulis parandis accipiuntur vnciæ quatuor sacchari ad drachmas duas specierum.

In tabulis verò & morsulis parandis eadem servatur quantitas: alij tamen ad libram vnam sacchari sumunt specierum drachmas octo: alij duodecim, præsertim in tabulis purgantibus. Tempus exhibitionis ante cibum duabus, vel tribus horis. Purgantes verò tabulæ tribus, aut quatuor horis cibos præcedere debent. Exhibentur ex ijs orbiculi duo, aut tres, plus aut minus pro morbi conditione. Morsulus vnus, nisi admodum exiguus sit, pro vice sufficit. Ex purgantibus vt plurimum non datur, nisi vncia semis, interdum verò plus, minusq; pro fumentis viribus, per se, vel trita in iusculo capi, vel galli. Sed formulis res clarior erit.

TABULÆ CORROBORANTES

& calefacientes Caput.

℞. Spec. Diambæ ℥ i.
Diamoschi ℥ s.
Cinnamomi ℥ i.

Macis

Macis

Caryophyllorum ana ꝑ s.

Cardamomi minoris

Cubebarum ana ꝑ i.

Nucis moschatæ ꝑ i. s.

Sacchari in aqua maioranæ dissoluti,

& ad perfectionem cocti ꝑ 3.

Fiant tabulæ secundum artem.

PECTVS.

R. Spec. Diaireos

Diahyssopi

Diaprasij

Diapenidij ana ꝑ s.

Olei foeniculi guttas s.

Sacchari in aqua hyss. diss. ꝑ 2.

Fiant tabulæ secundum artē.

C O R.

R. Spec. Diamargaritonis cal.

Pliris arcotici

Lætitiæ Gal.

Diaxyloaloes ana ꝑ s.

Cinnamomi ꝑ 2.

Caryophyl. Macis añ. ꝑ s.

Ligni aloes

Cort. mali citri ana ꝑ i.

Ossis de corde cerui

Ramentorum eboris

Vnicorniana ꝑ s.

V 2

Fol.

308 PRACTICÆ GENERALIS

Fol. auri N. 3.

Sacchari in aqua borraginis, dissol.
ti 3.

Fiant tabulæ.

VENTRICVLVM.

℞. Spec. aromat. ros.

Diagalangæ ana 3 s.

Cinnamomi 3 i.

Macis

Caryophyllorum ana 3 s.

Calami aromatici 3 i.

Nucis moschata 3 s.

Sacchari in aqua menthæ dissol.

Fiant tabulæ secundum artem.

HEPAR.

℞. Spec. Diarrhod. Ab b.

Diacurcumæ

Dialacæ ana 3 i.

Cinnamomi 3 i. s.

Macis 3 i.

Caryophyllorum 3 s.

Sacchari in aqua eugatorij dissol.

Fiant secundum artem rotulæ

SPLENEM.

℞. Spec. Diarrhod. Abb.

Diacalamintæ

Tr

LIBER V.

309

Trochiscorum de capparea ana ʒ i.

Cinnamomi ʒ 2.

Macis ʒ s.

Sacchari in aqua scolopendriae dissoluti ʒ 4.

Fiant rotulae secundum artem.

MATRICEM.

ʒ. Spec. Diagenmæ

Diamusci

Diambrae añ. ʒ s.

Cinnamomi ʒ i. s.

Macis ʒ s.

Caryophyllorum ʒ s.

Nucis moschatae ʒ i.

Sacchari in aqua arthemisiae dissoluti ʒ 4.

Fiant rotulae.

ROTVLÆ CORROD. ET RE-frigerantes Vetric. Hepar, Splenem. Et Matricem.

ʒ. Spec. Driafantali

Diarrhod. Abb. sine spec. cal.

ana ʒ i.

Trochiscorum e spodio ʒ i.

Sem endiuia

Cucumerum

Portulacae ana ʒ i.

Marg preparatarum ʒ s.

V 3

Coralli

110 PRACTICÆ GENERALIS

Coralli rubri preparati

Santali albi

Rubri ana ꝑ 1.

Sacchari in aqua ros. dissoluti ꝑ 4.

Fiant rotulæ secundum artem.

MORSVLI CORROBORANTES.

℞. Pulpæ caponis ꝑ 1.

Perdicis ꝑ 3.

Testiculorum galli ꝑ 3.

Nucis pineæ

Amygdalarum dulcium ana ꝑ 1. s.

Pistaceorum ꝑ 1.

Sem. 4. frig. maiorum ana ꝑ 3.

Spec. Diamargaritonis

Letitiæ Gal.

Dianthi ana ꝑ 2.

Cinnamomi electi ꝑ 1.

Ligni aloes

Macis ana ꝑ 1.

Sacchari in aqua borrag. dissoluti quâ
sufficit, formetur morsuli, auro obduc

De Trageis, siue Tragematis.

Cap. 41.

Tragemata, vulgares Trageos, & trituras a
pellant. Componuntur ex speciebus elect
ariorum, odoratisq, alijs rebus & medicamē
simp

mplicibus in puluerem redactis, saccharo ad-
fecto. In his conficiendis communiter capitur
r. sacchari ad singulas drachmas specierū. Spe-
erū qualitas ab ipso affectu sumenda est. Pro-
rietatem verò ipse locus affectus demonstra-
t. Exhibentur drachmæ unus aut duarum pō-
ere, cum pane tosto, vino odorato madefacto,
anè stomacho ieiuno, & vesperi, duabus, vel
ibus horis ante coenam: interdum etiam post
bum, quando vapores in caput exhalantes
hibere volumus, quæ tamē nullo odore, vel fa-
ore acri prædita esse debent. Nos formulis ali-
uot, quæ diximus perspicua reddemus.

TRAGEMATA CORROBORAN-

tiæ, & calefacientia Caput.

℞. Spec Diambra

Diarnoschi ana ℥ s.

Plirisarcotici ℥ i.

Cinnamomi electi ℥ i. s.

Macis

Caryophyllorum

Nucis moschatæ ana ℥ s.

Cardamomi minoris ℥ s.

Sacchari albissimi ℥ 3.

Misc: antur singula, & fiat trag.

P E C T V S.

℞. Spec. Diatreos

Diapenidij ana ℥ s.

V 4

Rad.

Rad. iridis \mathfrak{D} 2.Pul. glycyrrhizæ \mathfrak{D} 1.Cinnamomi \mathfrak{z} 1.Sacchari albi \mathfrak{z} 3.

Misce, & fiat tragea.

C O R. \mathfrak{R} . Spec. Dianthos

Diambraz

Diaxyloaloes

Pliris arcotici ana \mathfrak{D} 1.

Been albi

Been rubri

Ligni aloes

Ossis de corde cerni

Rasuræ eboris ana \mathfrak{D} s.Cinnamomi \mathfrak{z} 1.Sacchari albissimi \mathfrak{z} 3.

Misce, & fiat tritura.

VENTRICVLVM. \mathfrak{R} . Spec. Diagalangæ

Diaanisi

Diazingiberis ana \mathfrak{D} 1.Cinnamomi electi \mathfrak{z} 1 s.

Piperis longi

Caryophyllorum

Macis ana \mathfrak{D} s.Sacchari albifs. \mathfrak{z} 3.

Misce, & fiat tragema.

HEPAR.

HEPAR.

℞. Spec. Diacinnamomi

Dialacca

Diacurcumæ ana ʒ i. s.

Cinnamomi ʒ i.

Macis

Caryophyllorum

Spicæ Indicæ ana ʒ s.

Sacchari albifs. ʒ 3.

Misce, & fiat tragema.

SPLENEM.

℞. Spec. Diarrhod. Abb.

Diacapparis ana ʒ 2.

Maceris. Nucis moschatæ

Caryophyllorum ana ʒ i.

Cinnamomi electi ʒ s.

Sacchari candidissimi ʒ 4.

Misce, & fiat tritura.

TRAGEMATA REFRI-gerantiaCAPVT.

℞. Spec. Diarrhod. Abb.

Driasantali ana ʒ 2.

Flor. ros. rub. ʒ s.

Sem. papaueris albi ʒ i. s.

Cinnamomi ʒ 2.

Sacchari albi ʒ 3.

Fiat tritura.

V s.

PECTVS.

374 PRACTICÆ GENERALIS
PECTVS,

- ℞. Spec. Diatragacanthi frigidi ℥ 1.
Sem. papaueris
Lactuca ℥ s.
Sacchari candidi, vel penidij ℥ 2.
Misce, & fiat tragea.

C O R.

- ℞. Spec. Diamargaritonis frigidi
Margaritarum preparatarū añ. ʒ 1.
Frag. lap. pretiosorum
Sem. mali citri ana ʒ s.
Cinnamomi ʒ 1.
Sacchari albillimi ℥ 2.
Misce, & fiat tragema.

VENTRICVLVM.

- ℞. Spec. Diarrhod. Abb. ℥ 1.
Ros. rub. sic. ʒ 2.
Cotoneorum sic. ʒ 1.
Coralli rubri ʒ 1.
Macis
Caryophyllorum ana ʒ s.
Cinnamomi ʒ 1.
Sacchari albi ℥ 3.
Fiat tragema.

HEPAR.

- ℞. Spec. Triasandali
Diarrhod. Abb. añ. ℥ s.
Sandali albi. Citrini. Rubri

Ros. rub.

Sem. Cichorij

Lactuce

Endiuix

Scariolæ ana ℥ s.

Cinnamomi ℥ s.

Sacchari albißimi ℥ 2. s.

Misce, & fiat tritura.

Depulueribus, Cap 42.

Pulueres Arabibus suffus, & Alcohol vocantur. Ex varijs medicamentis simplicibus cōmiscentur, ijq; diuersis corporis partibus administrantur, veluti, qui à vulgo Medicorū, & phar macopæorum epithemata cordalia, & hepatica vocantur. Alij sunt vtiles ad vulnera, & vlcera, idq; in varijs corporis partibus, & varias ob causas, vt pulueres capitales adstringētes, sarcotici, erodentes, &c. Sed formulis res clarior euadet.

PVLVIS CAPITALIScalidus.

℞. Maiorana

Betonice

Pulegij

Calaminthæ

Stoechados

Cort. mali citri

Caryo-

Caryophyllorum

Gummi iuniperi ana ℥ 2.

Commistis omnibus, fiat puluis, capiti
inspergendus.PVLVIS CAPITALIS TEM-peratus.

℞. Stœchados ℥ i. s.

Rosarum rubrarum

Balaustiarum

Masticis. Macis

Olibani. Myrtorum ana ℥ i.

Nucum cupressi ℥ i. s.

Santalorum ℥ i.

Fiat puluis tenuissimus, commissuræ co-
ronali aspergendus.PVLVIS AD VVLNERAcapitis.

℞. Aristolochiæ pulerizate

Iridis. Panacis

Mannæ thuris. Farinæ erui

Squammæ ærisana ℥ i.

Misce, & fiat Puluis.

PVLVIS PRO EXITV ANI.

℞. Masticis. Thuris

Nucum cupressi. Antimonij

Malicorij

Glandi-

Glandium

Baulaustiarum añ. ʒ 2.

In puluerem radafta asperge.

PVLVIS AD PRÆGNANTES.

℞. Masticis. Thuris ana ʒ s.

Sanguinis draconis

Myrrillorum. Boli armeni

Granorum tinctorum ana ʒ s.

Tere, & huius drachma dactylum ossis loco
 replē, vino madefacito, & papyro inuolutum,
 sub calidis cineribus calefac. Da abortum ti-
 mentibus.

De pulueribus purgantibus,

Cap. 43.

Pvlueres purgantes fiunt ex simplicibus me-
 dicamentis purgantibus, vel speciebus com-
 positorum, additis semper ijs, quæ vehementiā
 eorum remittunt, & saccharo. Singulorum verò
 simplicium medicamentorum purgantium pon-
 dera ex libro 4. petenda sunt. Qualitas vero ab
 ipsa morbi causa sumenda. Dantur in vino, vel
 absynthiaco, vel iusculo, aut alio liquore conue-
 niente, idq; ieiunis. Sed formulis res clarior erit.

I.

℞. Rl barbari electi ʒ 2.

epicæ Indicæ

Cinna

Cinnamomi ana ʒ s.

Sacchari ʒ 2.

Misce, & fiat pulvis purgatorius.

I I.

℞. Rhabbarbari albi, siue mechoaca ʒ

Gentiana

Cinnamomi ana ʒ s.

Fiat pulvis purgatorius, in vino
absynthiaco sumendus.

III.

℞. Fol. senæ ʒ s.

Hellebori nigri ʒ s.

Zingiberis

Masticis ana ʒ s.

Tritis omnibus & commistis,
fiat pulvis purgatorius.

I V.

℞. Rhabbarbari albi ʒ 2.

Foliorū laureolę ʒ i.

Spicę Indicę gr. s.

Misce, & fiat pulvis, sumendus
cum vino absynthiaco.

V.

℞. Specierum elect. de psyllio

Diaphœniconis

Sacchari ana ʒ s.

Commisceantur singula, fiatq; tritura.

V I.

℞. Rhabarbari albi ℥s.

Fol. fenæ ʒ i.

Rad. esulæ

Zingiberis

Gentianæ ana ʒ s.

Misce, & fiat puluis purgatorius.

De Dentificijs, Cap. 44.

Dentificia, Græcis ὀδοντορρημματα, vel odontica dicuntur, ad candidos & immobiles dentes reddendos, expoliendos, extergendos, ad las-
 res reddendos, expoliendos, extergendos, ad las-
 cas gingiuas comprimendas, ad halitus graeco-
 lentiam, diuersimodè etiam ad alia præparantur,
 vel in tenuissimum pollinem affricata, vel liqui-
 da ad abluendum, vel crassiora effecta, & circu-
 titur: vt sequentibus formulis patebit.

I.

℞. Cornu ceruini vsti

Corallium rub.

Ossis sepia

Masticis ana ℥s.

His exquisitissimè puluerizatis, dentes

& excarnes gingiuas affricato.

II.

℞. Aquarum menthae

Saluia. Hyssopi añ. ʒ 7.

Alumina

320 PRACTICÆ GENERALIS

Aluminis scissi affati, & vino austeri

extincti ℥ 2.

Nitri ℥ 3.

Salis affi ℥ s.

Misce, & distilla per alembicum, liquor
que ad vsu seruetur.

I I I.

℞. Gallarum Balauftiorum

Aluminis rupei

Thuris. Myrrhæ ana ℥ s.

Corall. rub. Ossis sepiæ

Masticis. Sanguinis draconis ana ℥ s.

Trita & cribrata excipiantur oxymelite, scyl
litico, & vsu exigente illinantur.

De pomis odoratis, Cap. 45.

Pomum odoratum, est medicamentum
quod citra ignis accessionem naribus adhi
betur, cerebrum odore suo alterans, in orbicu
lum pomi coactum. Componuntur ex ambra
moscho, lasere odorato, styrace, stacte, spica, ni
gella, maiorana, caryophyllis, ligno aloe, lada
no, rosis, santalis, caphura, & id genus alijs, vt
quentibus formulis videre licebit.

I.

℞. Styracis ℥ i.

Caryophyllorum ℥ 2.

Lasce

LIBER V.

325

Laseris odorati ℥ s.

Moschi gr. 15. Ambra ℥ s.

Cum aqua rosarum, & stacte vniantur,
singanturq; orbiculi odorati.

I I.

AD CATHARRVM.

℞. Ladani. Ligni Aloes
Stiracis. Costi. Spica ana ℥ s.
Thuris

Gallia moschata

Myrrha ana ℥ s.

Nucis cupressi. Gummi iuniperi

Nucis moschata ana ℥ i.

Cinnamomi. Caryophyllorum

Nigella ana ℥ 2.

Moschi gr. 4. Ambra ℥ i.

Cum aqua rosarum, & vino odorato, &
modica, cera, formetur pomum.

I I I.

AD PESTEM.

℞. Caphura. Ligni aloes

Styracis

Flo. buglossa ana ℥ 2.

Caryophyllorum

Trium san'alorum

Recn albi, & rubri

Myrrha Calami odorati

Spica. Nucis moschata

X

Thuris

Thuris

Gummi iuniperi ana ʒ i.

Succini. Croci

Corall. rub.

Antispodij ana ʒ s.

Sem. acetosæ ʒ 3.

Succi portulacæ

Succi mal. aurantiiorū añ. ʒ 4

Nymphaeæ

Coriandri torrefacti ana ʒ 2.

Terræ sigillatæ ʒ 2.

Boli armeni ʒ s.

Ambræ

Moschi ana ʒ s.

Ladani, aqua ros. & aceto infusi

Terebinth. in aqua ros. lotæ

Syr. ex cort. mali citri ana q. s.

est ad pomi figuram inducendam.

De suffummentis, Cap. 46.

Suffimenta, vel suffitus, alijs suffumigia
 suffumigationes, Græcis Thymiamata
 dicamenta sunt ignitis carbonibus injici
 vel in trochiscos coacta, vel puluerata, ad o
 gratiam, ad tetros halitus expurgandos, ad
 tis in subiectas partes defluxus, ad infarct
 mnes, aurium tinnitus, & frigidas, quascu

Veni.

oxas: q̄ qdē si ad vterinos affectus parētur, vel
no muliebria ducāt, vel q̄a euagātē vterū stabī
ent, diuarcatis crurib⁹, super infundibulū fra-
gis, circū datum, euaporatorio intus occluso, et
muliere pānis diligēter succincta, ne ad caput ef-
ferantur vapores, accipienda sunt. Si autem pa-
lo ore, aurib⁹ sue accipienda sunt, per tubum,
tulamue, capite propenso efferantur, vel per
idem perforatam. Fiunt autem ex rebus odora-
s. vt moscho, zibetto, belzoino, ambra, styra-
ladano, thure, gallia, mastiche, &c. aut foeti-
s, videlicet castoreo, galbano, bdellio, bitumi-
e, lapide gagate, & id genus alijs. Odorata orbi-
culari forma, nunc maiore, nunc minore, inter-
um glandes repræsentant: interdum auiculas,
ut vulgō cypria vocantur: aliās pastillorum, vt
ex alipta, vel moscho, vel galliā moschata in-
tribuntur: aliās pulueris crassi modo fiunt, quæ
formulis cognoscent studiosi.

I.

- ℞. Laferis odorati ℥ 2.
Galliæ moscharæ
Cinnamomi
Caryophyllorum ana ℥ 1.
Ligni aloes
Fol. lauri ana ʒ 1.

X 2

Trina

PRACTICÆ GENERALIS Trita excipiantur stacte, & in formen- tū pastilli pro suffimento odorato.

I I.

- ℞. Galliz moschata ℥ i.
Maiorana. Salvia
Rorismarini ana ℥ i.s.
Maceris ℥ i.
Cinnamomi
Caryophyllorum ana ℥ i.
Fol. lauri ℥ s. Ligni aloes ℥ i.
Moschi gr. 3.

Terantur singula, & commixtis omni-
bus fiat puluis, qui exigente vsu carbo-
nibus viuis inspergatur.

III.

SYMPLECTVS VTERINVS.

- ℞. Asæ foetida. Galbani
Myrrha. Castorei
Seminis rutæ ana ℥ i.
Cinnamomi.
Vnguis odorata ana ℥ 2.
Sem. foeniculi ℥ i.s.

Crassiusculum puluerata, prunis inspe-
ge. Ori ad motus, uteri praefocationem
repente depellit. Vulua adhibitus, men-
ses prouocat, & eorum dolores paulo
post sedat.

De linimentis, Cap. 47.

Linimenta sunt, quæ liquida inunguntur. Fiunt ex oleo, adipe, butyro, seu liquefactis, vel alijs, quæ olei spissitudinem habent, ut styrace, liquida, myrrha liquida. Aliquando additur Terebinthina, vel mucilago, vel medulla, quæ adipis temperaturæ, & consistentiæ similis est. Hoc autem nulla certa quantitas describitur, communiter tamen Medici ad vnciam vnam olei, recipiunt butyri, adipis, cremoris ana ℥ 2. Qualitas oleorū ab ipso affectu desumenda est. Proprietas verò ab ipsa parte affecta accipitur. Vtitur his valide duabus vel tribus horis ante cibum.

OLEA CALEFACIENTIA
VENTRICVLVM.

Oleum nucis moschata.

Oleum de absynthio.

Oleum mentha.

Oleum Mastichinum.

Oleum nardinum, &c.

℞. Olei mastichini

Nardini ana ℥ s.

Succi mentha ℥ 2.

Cera parum

Commistis omnibus fiat linimentum.

X 3

PECTVS

326 PRACTICÆ GENERALIS
PECTVS.

Oleum amygdalarum dulcium
Oleum amygdalarum amararum
Oleum irinum. Liliorum.
Oleum cheirinum, &c.

℞. Olei amygdalarum dulcium.
Irii ana ʒi.

Butyri recentis

Pinguedinis gallinæ

Cremoris sem. lini ana ʒss.

Commisceantur, & fiat linimentum.

HEPAR.

Oleum amygdalarum amararum

Oleum nardinum.

Oleum de absynthio.

Oleum mastichinum.

Oleum nucleorū perficorū, &c.

SPLENEM.

Oleum de capparibus.

Oleum liliorum. Oleum spicz.

Oleum de behen.

UTERVM.

Oleum anethinum.

Oleum irinum.

Oleum cheirinum.

Oleum spicz.

Oleum de castoreo. &c.

ART

LIBER V.
ARTICVLOS.

327

Oleum nardinum.
Oleum rutaceum.
Oleum nucum.
Oleum nucis moschatæ, &c.

NERVOS.

Oleum costinum.
Oleum mastichinum.
Oleum lumbricorum.
Oleum de euphorbio.
Oleum de piperibus.
Oleum anethinum, &c.

OLEA REFRIGERANTIA

CAPVT.

Oleum de papauere.
Oleum mandragoræ, &c.

PECTVS.

Oleum violarum.
Oleum nenupharinum, &c.

VENTRICVLVM.

Oleum cotoneorum.
Oleum myrthinum.
Oleum myrtillorum.
Oleum rosaceum.
Oleum omphacinum, &c.

HEPAR.

Oleum rosaceum.
Oleum myrtinum.

X 4

Oleum

PRACTICÆ GENERALIS

Oleum cotoneorum

Oleum lentiscinum, &c.

RENES.

Oleum nenupharinum, &c.

UTERVM.

Oleum nymphææ.

Oleum lentiscinum.

Oleum myrtillorum.

Oleum cotoneorum, &c.

OLEA SICCANTIA.

Oleum nucum.

Oleum nardinum.

Oleum ricinum, &c.

OLEA HVMECTANTIA

Oleum comune recens.

Oleum amygd. dulcium.

Oleum violaceum.

Oleum sesaminum, &c.

OLEA ASTRINGENTIA.

Oleum mastichinum.

Oleum menthæ.

Oleum de absynthio.

Oleum rosaceum

Oleum myrtinum.

Oleum œnanthinū, &c.

OLEA EMOLLIENTIA.

Oleum lini. Oleū narcissinum.

Oleum styracis, &c.

OLEA

OLEA LAXANTIA.

Oleum amygdalarum dulcium.

Oleum oliuarum.

Oleum iasininum.

Oleum sesamin m, &c.

RAREFACIENTIA.

Oleum anethinum

Oleum chamomelinum, &c.

OLEA DIGERENTIA.

Oleum amygdalarum amararū.

Oleum nucum.

Oleum oliuarum antiquum.

Oleum rutaceum, &c.

DETERGENTIA.

Oleum tartari.

Oleum myrrhæ.

Oleum de frumento.

Oleum ouorum.

Oleum sambucinum

Oleum balaninum.

Oleum ricinum.

Oleum raphaninum, &c.

GLVTINANTIA.

Oleum myrrhæ.

Oleum nicotianæ.

Oleum balsaminæ.

Balsamum, &c.

PRACTICÆ GENERALIS
SOMNV M INDV CENTIA.

Oleum de papauere.
 Oleum mandragoræ.
 Oleum malorum aureorum.
 Oleum nenupharinum.
 Oleum hyosciaminum, &c.

DOLOREM SEDANTIA.

Oleum anethinum.
 Oleum chamæmelinum.
 Oleum laurinum.
 Oleum cheirinum.
 Oleum sambucinum.
 Oleum liliorum alborum.
 Oleum moschelinum.
 Oleum lini.
 Oleum malorum aureorum, &c.

℞. Olei anethini
 Chamæmelini
 Liliacei
 E semine lini ana ℥ 2.

Adipis caponis

Anatis

Cremoris sem. altheæ ana ℥ 2.

Commistis omnibus fiat linimentum.

De vnguentis, Cap. 48.

Vnguenta crassioris consistentiæ sunt, quàm linimenta, & valentiora, quæ vnguinoso suo corpore partibus illis, & cereo quodam lentore crassitudinem adepta inhaerent. Fiunt ex oleis, pulueribus, & cera: interdum etiam adipe, butyro, mucilagine, lacrymis, & gummi, &c. Species & olea iuxta affectum, quibus adhibentur vnguenta, diuersitatem variantur. Sic quoque eorum proprietates, pro locorum affectuum varietate immutanda est. Cera, vt conuenientem nanciscatur consistentiam, adijcitur. In his autem componendis hodie plerique obseruant, vt vnciæ vni oleorum, drachmam vnā specierum, & drachmas duas ceræ cōmiscant. Sed præstat ceræ quantitatem eius qui componit arbitrio, ac iudicio relinquere, vt is scilicet addat, quantum ad iustam vnguenti consistentiam satis est, vt in sequentibus formulis patebit. Porro vtimur his ca-
lidè duabus, vel tribus horis ante cibum.

I.

- ℞. Olei mastichini
Nardini ana ℥ s.
Nucis moschatæ. Macis
Caryophyllorum ana ℥ i.
Ceræ quantum sufficit.
Fiat vnguentum.

I L

II.

℞. Olei cotoneorum

Rosacei

Myrtini ana ℥s.

Balauftiorum

Sanguinis draconis

Boli armeni

Rosarum rubrarum ana ℥i.

Cere albæ, quod satis est.

Misce, & formetur vnguentum.

III.

℞. Olei de capparibus

Liliorum alb.

Iriani ana ℥s.

Cremoris althææ

Foenigraci

Sem. lini ana ℥2.

Pinguedinis gallinæ

Anseris

Taxi ana ℥s.

Medullæ cruris bubuli ℥2.

Cort. rad. capp.

Tamaricis ana ℥s.

Centaurij minoris ℥i.

Costi ℥s.

Ammoniaci ℥i.

Galbani

Bdellij ana ℥i.

Dissolutis gummi in aceto, cum cera
quantum satis est, formetur vnguentū.

VNGVENTA VSUALIA CALIDA.

Vnguentum Arrogon.
Vnguentum Marciaton.
Vnguentum stomachicum.
Vnguentum Philagrij.
Vnguentum dialthea.
Vnguentum ex bdellio
Vnguentum Bernardinum, &c.

FRIGIDA.

Vnguentum rosatum.
Vnguentum violatum.
Vnguentum refrigerans.
Vnguentum populeon.
Vnguentum caphuratum, &c.

ASTRINGENTIA.

Vnguentum comitisia.
Defensium magistrale, &c.

EMOLLIENTIA.

Vnguentum dialthea.
Vnguentum resumptiuum. *Cyclamen*
Vnguentum de artanita minus.
Vnguentum ex bryonia, &c.

ABSPERGENTIA.

Vnguentum apostolicum.
Vnguentum album.
Vnguentum de minio.

Vnguentum

Vnguentum basilicum.

Vnguentum Ægyptiacum.

Vnguentum viride.

Vnguentum citrinum.

Vnguentum rubeum.

Pfericum.

Vnguentum de lichargyro.

Vnguentum de tutia.

Vnguentum ad pediculos.

Vnguentum inmercuriatum, &c.

SARCOTICA

Vnguentum aureum.

Vnguentum diapompholygos.

Vnguentum ceraseos.

Vnguentum apostolicum, &c.

GLUTINANTIA

Vnguentum potabile.

Vnguentum aureum.

Vnguentum citrinum.

Vnguentum desiccatiuū. Rub. &c.

ERODENTIA

Pfericum.

Vnguentum Ægyptiacum.

Vnguentum apostolicum.

Vnguentum ex cantharidib. &c.

EXTRAHERENTIA

Vnguentum fuscum, &c.

DOLO-

DOLOREM SEDANTIA.

- Vnguentum anodynum.
- Vnguentum D. Gereonis.
- Vnguentum ad hæmorrhoides.
- Vnguentum pectorale.
- Vnguentum ad oculos, &c.

SOPORIFERA.

- Vnguentum populeum.
- Vnguentum somniferum, &c.

PURGANTIA.

- Vnguentum Agrippæ.
- Vnguentum de artanita maius.
- Vnguentum ad vermes, &c.

De Fomentis, Cap. 49.

Fomenta, hoc est, decocta partibus applicata, illas suo calore fouentia, & flatus dissipantia, vel per halitus digerentia, humectantia, lenientia, atq; alia ex vi coctorum præstantia, in vesica excipi, vel spongia, linteæue filo duplicato, aut laneo panno crassiore imbuto, & expresso, adhibentur, & liquida vocari possunt. Fiunt aut vel ex aqua calida, vel vino, vel oleo, vel decoctis herbarum, florum, & seminum, ad tertias, vel dimidias interdum etiam ex decoctis cataplasmatū. Adhibentur aut oculis, thoraci, vētri, iecori, lieni, renib⁹, vesicæ, vtero, etc. Vtimur
his

his fæpe ante quàm vel cataplasmate, vel vnguentis vtamur, quo pori aperiantur, partes relaxentur, & quodammodo viam muniant alijs remedijs. Ante tamen corporis euacuationē nō sunt remerè adhibenda: tūc enim plus humorum a calefactam partem traheretur, quàm id sit, quod discutitur. Præterea in febribus ante accessionem ipsis vtendum, sed nō statim per initia, neque cum copia humorum in toto corpore superat. Quod ad ingredientium quantitatem attinet, pro singulis manipulis vel duobus herbarum libra vna humoris addenda est. Sed formulis re-
clarior erit.

I.

- ℞. Florum chamomillæ
Meliloti. Anethi
Althææ. ana M. s.
Sem. lini. Fœnigræci
Anisi. Fœniculi ana ℥ s.

Coquantur in sufficiente quantitate aquæ vsq; ad consumptionem medietatis deinde spongia, vel linteo duplicato adhibeatur parti.

II.

- ℞. Maluæ M. l.
Flor. chamomillæ
Meliloti. Anethi ana M. s.
Sem. lini. Fœnigræci ana ℥ 3.

Co-

Coquantur in lib. 2. aquæ ad medietatē vsq; ,
atque fomentum, quod vel in vtre, vel vesica,
vel pāno laneo, vel linteo duplicato adhibeatur

I V.

℞. Rutæ M. s.

Lingux ceruinæ

Centaurij min. ana M. i.

Rad. altheæ ℥ i.

Semen. lini ℥ s.

Cort. capparorum ℥ s.

Coquantur in aqua, & aceto q. s. ad tertias,
inde spongia in iure decocti madefacta leni
plicentur.

De epithematibus, Cap. 50.

Epithemata, id est liquida medicamēta, com-
ponuntur, ex aquis destillatis, affectui, & par-
tibus affectæ proprijs, adiectis pulueribus, vel ipe-
ribus aliquot, interdum etiam vino, & croco,
interdum aceto, pro partis affectæ natura. Qui-
bus omnibus simul mixtis, & agitis, intingun-
tur panni linei tepidi, & madefacti, leniterque
pressi parti applicantur, & subinde murantur,
calefacti corpus calefaciant. Nunc si indone,
laneo panno ex chermes infectis, iisdemque
mergis admouentur. Admouentur sæpius ien-
ti & cordi: rarius autem fronti, pectori, ven-
triculo,

Y

triculo, lieni, renibus, & testibus, His quæ cord
 applicantur, aliquid vini optimi, & croci misc
 tur: ijs verò, quæ iecori, vel lieni, aceti parum, &
 astringentia aliqua: quæ autem ventriculo, a
 stringentia aromatica, ad robur parti inducen
 dum. Applicantur autem post euacuationem
 factam, vel post sanguinis missionem, & potissi
 mum in febrium statu, in quo omnia sunt sa
 uissima. Frequenter ijs vtendum, serò & manè
 In summa, quoties pars aliqua inflammatur, au
 alia calida affectione afficitur, mensura epithe
 matum libram non excedit: communiter autem
 selibram, vel 3 10. continet. Sic autem ea magn
 ex parte miscntur, vt libræ vni liquorum 3 i.s.
 aut 3 2. specierum respondeant. Quæ vinum, &
 crocum (vt cordialia epithemata) recipiunt
 eum modum in illis miscendis seruant, vt libra
 liquorum vncia vna vini, & croci aliquot grana
 adiiciantur. Quæ verò acetum (vt in epitHEMA
 tis hepaticis, & splenicis) exposcunt, ijs pro li
 bra vna aquarum vncia semis aceti sufficiet, vt in
 formulis patebit.

Vtimur autem his in febribus hecticis, &
 squalidis, ardentibus, pestilentialibus, visce
 rum inflammatione, & totius corporis in
 cendio: item in cordis palpitatione, cordia
 ca passione, erysipelate, & virium imbecil
 itate, &c.

EPITHEMA PRO FRONTE. I.

℞. Aquæ rosarum ℥ 4.

Acetialbi ℥ 2.

Olei rosati ℥ 1.

Misce, & hoc linteis duplicatis imbutis
fronti tepidè admoueat.I I. PRO CORDE.

℞. Aquarum rosarum ℥ 4.

Borraginis

Buglossæ

Melissæ ana ℥ 3.

Vini odorati ℥ 1.

Aceti ℥ s.

Spec. diagemmæ ℥ 1.

Ligni aloes

Cort. mali citri

Offis de corde cerui

Eboris ana ℥ s. Croci gr. 6.

Commistis omnibus fiat epithema.

I I I. PRO HEPATE.

℞. Aquarum endiuivæ ℥ 4.

Cichorij

Lactuce

Absynthij ana ℥ 2.

Acetosæ ℥ 3.

Solani ℥ 1.

Aceti ℥ s.

Spec. diarth. Abb. ℥ 1.

Y 2

Dria

Drisantali ꝑ i.

Santali rubri ꝑ s.

Mistis omnibus, formetur epithema.

De Sacculis, Cap. si.

Sacculi fiunt aut sicci, siue aridi: aut liquore aliquo madidi, ex herbis, floribus, radicibus feminibus, & id genus alijs, concisis, & leuiter contusis, quadrati frequentius, vel ad membrorum patientium formam figurantur: ex serico videlicet cordi & capiti admouendi: alij vero e panno lineo: consuunturque acu transuersim missa, ne scilicet ea, ex quibus constant, in vnam omnia parrem labantur ac declinent. *Sicci* vero ante admotionem, testa calente superponi, vino, aut aceto irrigata, ad vnciam vnam, vel vnciam vnam & mediam, ac subinde cōtracto calore partibus adhiberi. *Humidi* autem locis dolentibus applicantur, ad dolores sedandos, humores crudos concoquendos, ad mollificandum, ac discutiendum. Prius autem cōprimendi sunt, quàm loco dolenti admoueantur. See formulis res clarior erit.

CAPITALIS I.

℞. Maiorana

Florum chamomilla

Stœchados ana M. s.

Malicia

Masticis. Macis
 Cubebæ
 Nucis moschatæ
 Cort. mali citri
 Ros. rub. ana ℥ i.
 Corall. rub. ʒ i.
 Salis vsti ʒ 4.

Contusa in sericum demittantur, formeturq;
 culus, siue cucupha.

II.

℞. Lauendulæ
 Rosmarini. Betonicæ
 Chamomillæ añ. M. i.
 Saluæ. Maioranæ
 Meliloti ana M. s.
 Rosarum rub. M. i. s.
 Stœchados M. s.
 Fol. senæ ℥ 2.
 Caryophyl. Macis
 Nucis moschatæ ana ʒ 2.

Contusis omnibus, fiat è serico sacculus ca-
 lis.

III. CORDIALIS.

℞. Florum borraginis
 Melissæ
 Buglossæ
 Santalorū omnium
 Ben. albi, & rubri

Y 3

Boli

342 PRACTICÆ GENERALIS

Boli armeni

Oſſis de corde cerui ana ℥ i.

Ros. rub. ʒ 2.

Flor. chamæmeli

Rorismarini ana ʒ i. s.

Corall. rub.

Sem. acetosa

Cort. mali citri ana ʒ s.

Ligni aloes

Antispodij ana ʒ 2.

Croci. Serici crudi ana gr. 10.

Caphura ʒ s.

Contritis omnibus fiat è serico facculus

IV. CORDIALIS CALIDVS

℞. Florum borraginis

Buglossæ

Rosarum

Melissæ ana M. i.

Cinnamomi electi

Caryophyllorum

Macis ana ʒ s.

Ligni aloes ʒ i.

Cort. mali citri

Spec. diambra ana ʒ i.

Oſſis de corde cerui ʒ s.

Croci ʒ i.

Terantur omnia, & fiat è serico facculus
di admonendus.

V. CORDIALIS FRIGIDVS.

℞. Rosarum rubrarum
 Flor. buglossæ
 Borraginis ana ℥ 2. s.
 Fol. myrthi. Cort. citri
 Coral. alb. & rub.
 Coriandri præparati
 Santalorum omnium ana ʒ i. s.
 Caphuræ ʒ 2.

Misce, & fiat sacculus cordialis.

VI. CORDIALIS TEMPERATVS.

℞. Santalorum alborum
 Ros. rubrarum
 Corall. amborum
 Antispodij. Caphuræ
 Fol. myrti
 Flor. borraginis ana ʒ i.
 Ben albi, & rubri
 Cort. mali citri
 Nucis moschatæ
 Serici vsti. Spicæ
 Ossis de corde cernui
 Granorum tinctorum
 Fol. lauri
 Caryophyllorum
 Ligni aloes
 Rosismarini
 Melissæ. Cubebarum añ. ʒ i.

344. PRACTICÆ GENERALIS

Moschi gr. 4.

Ambra. Croci ana gr. 3.

Contritis omnibus, fiat sacculus cordialis.

VII. SACCVLVVS AD FLATVS

Vent. icul.

℞. Sem. anisi

Apij. Fœniculi

Seseleos. Olusatri

Rutæ ana M. s.

Calaminthæ. Origani ana M. l. s.

Hyssopi. Pulegij ana M. l.

Rutæ siccæ. Stœchados

Chamædryos

Chamæpirhyos ana M. l.

Absynthij M. 2.

Cinnamomi

Caryophyllorum

Calami aromat. ana ℥ 2.

Macis ℥ 3.

Tritis omnibus, fiat sacculus stomachalis.

VIII. SACCVLVVS HYMIDVS AD

fluxum ventris.

℞. Myrtillorum. Rhois

Coriandri

Chamomillæ

Origani

Balaustiarū añ. M. l. s.

Conti

Cort. granatorum

Hypocistidis

Sem. rosarum ana M. i.

Rad. verbasci

Dipsaci

Cort. & rad. mori ana M. 2.

Concisus & tritis, fiat sacculus, in vino nigro
iustero coquendus, cui expresso superfedeat æger.

X. SACCVLVS HYMIDVS AD DO-

lores, mollificationem, & disci-
tionem.

℞. Florum chamomillæ P. 2.

Sūmitatum anethi

Origani

Meliloti ana P. i.

Foenigræci

Sem. lini ana. ʒ i.

Maluæ. Althææ

Violariæ ana M. s.

Contusis omnibus, fiant sacculi duo, in aqua
el lacte vaccino coquendi, qui expressi alter-
atim loco dolenti applicentur.

De Cataplasmatibus, Cap. 52.

Ataplasmata fiunt ex herbis viridibus, radi-
cibus, floribus, fructibus, & seminibus, ad

℞ ;

mol-

246 PRACTICÆ GENERALIS

mollitudinem vsque coctis, in aqua, oleo non adiecto.

Uss.

Fiunt autem cataplasmata, ad varias intentiones, quandoque ad doloris sedationem, ad remolitionem duritiæ, ad resolutionem, ad maturationem, ad exiccationem, & consumptionem humorum, & vaporum, in promiscuis affectibus promiscuæ intentiones in cataplasmata cõmifcentur: vt remollientia cū discutientibus, & discutientia cū remolliētibus, vt fequentibus formulis videre licebit.

Cauteh.

Porro cataplasmata supra omnes partes dolētes aut inflammantes applicari possunt. Quod si hypochondrijs calefacientia, & discutientia cataplasmata applicanda sint, nisi antea vacuato corpore, adhiberi minimè debent. Attahunt enim totius corporis excrementa.

I.

R. Maluæ. Altheæ
Violariæ. Chamomillæ ana M. i.
Rad. altheæ ʒ i.
Fœnigræci
Sem. lini ana ʒ s.

Coquantur in aqua donec mollescant, deinde contendantur, & fiat cataplasma.

II.

R. Rad. altheæ
Liliorum alb. Ileos ana ʒ i.

Flor.

LIBER V.

347

Flor. chamomillæ

Meliloti. Anethi ana P. i.

Maluæ. Bifmaluæ

Violariæ ana M. i.

Sem. lini

Fœnigræci ana ʒ s.

Baccarum lauri ʒ 2.

Croci ʒ s.

Coctis, & contusis, fingatur cataplasma.

III.

ʒ. Plantaginis. Polygoni

Bursæ pastoris. Numulariæ

Saniculæ

Consolidæ mediæ. Viridiū ana M. i.

Coctis & contusis omnibus, formetur
cataplasma.

De emplastris, Cap. 53.

Emplastra hodie dicuntur, quæ ex herbis, floribus, radicibus, fructibus, seminibus, & farinis in aqua coctis componuntur, additis axungijs, vel oleis, prout res exposcit.

Plantarum autem, vel alterius materiæ singulis fasciculis olei, vel adipis singulæ uncia, vel fescuncia misceri debent.

Posiunt autem supra omnes partes dolentes, aut inflammatas applicari, euacuato prius

*Al. Mj. linc.
varia,
et adipis.*

348 PRACTICÆ GENERALIS

prius corpore, & quidem ante cibum.

Doloribus leniendis, tumoribusque concoquendis, vel digerendis maximè accommodata sunt.

℞. Maluæ. Altheæ
Meliloti
Chamomillæ ana M. i.
Rad. altheæ ℥ s.

Contusa coquantur in aqua vsque ad iustam crassitudinem, cui adde

Olei chamomelini
Liliorum alb. ana ℥ 2.

Iterum bulliant, fiatque emplastrum.

II.

℞. Flor. anerhi
Chamomillæ
Verbasci añ. M. i. s.
Meliloti M. s.
Farinæ fœnigræci
Sem. lini ana ℥ s.

Contusa bulliant in aqua, donec in crassitudinem iustam coeant, deinde adde

Olei anethini
Chamomelini ana ℥ 2.

Ebulliant iterum, & formetur emplastrum.

III.

℞. Maluæ. Bismaluæ
Violariæ ana M. i.

Rad.

Rad.altheæ

Liliorum alb.ana ℥ i.

Flor.anethi

Chamomillæ

Meliloti ana ꝑ. i.

Farinæ hordei

Fœnigræci ana ℥ s.

Crocij s.

Contusis, & coctis, adde

Axungia Anatis

Anseris ana ℥ i.

Medullæ cruris vituli

Butyri recentis ana ℥ s.

Olei liliorum alb.

Irini ana ℥ i.

Bulliant iterum, fiatque emplastrum.

TV.℞. Mica panis in lacte remollita, & in-
cocta quantum sufficit,

Virellorum ouorum N. i.

Olei de papauere q. s.

Crocij gr. iij.

Misce, & fiat emplastrum.

De Cerottis, Cap. 54.

Cerotum olim à cera nuncupatum, hodie ex
pulueribus, oleo, cera, resina, pice, & id ge-
nus

350 PRACTICÆ GENERALIS

nus alijs concinnatur. In huius compositione idem, quod in vnguentis, pondus nonnulli obferuant Medici, vt ſcilicet vñcia vna oleorum, drachmæ vni, aut drachmæ vni & ſemis ſpecierũ respondeat. Cera verò quarta pars olei eſſe debet: vt pote ſi acceperit olei ζ 2. cera ſit vñcia media. Si verò ſcribatur cera parũ, ſit eius ſexta pars, aut ſeptima. At ſi liquidum ceratum, vt in fracturis paretur, duplicatum: ſi ad emplaftri figuram, olei & cera tantundem: atque iuxta ambientis & cera naturam, idq; magis & minus, pro Medici ſcopo, id quod in pice, refina, terebinthina ſeruandum. Porro ſpecierum, & oleorũ qualitas, ab ipſo affectu deſumenda eſt. Adhibentur ventriculo, hepati, lieni, pectori, vtero, & oſſibus fractis, ita tamen, vt eorundem figura parti, cui admoventur, ſimilis ſit: vt ventriculo ſcutiforme: iecinori, lunatum: lieni, ſoleatum, ce ratum effingatur. A cu etiam tranſueſim trãſmiſſo, conſuuntur: atque ante cibum ſtomacho ieiuno applicantur. Stomachica cibi tempore ſeponuntur.

I.

- R. Calami odorati
Cinnamomi ana ζ i.
Macis
Caryophyllorum ana ζ s.
Nucis moſchata ζ i.

Roſa-

Rosarum rub. \mathfrak{z} 2.

Masticis

Ladani ana \mathfrak{z} 1.

Olei absynthini

Mastichini ana \mathfrak{z} 1.s.

Menthæ

Cotoneorum ana \mathfrak{z} 1.Cera \mathfrak{z} 10.

Resinæ terebinthinæ, parum.

Commistis omnibus, fiat cerorum ventriculo adhibendū, & serico obducatur.

I I.

℞ Croci

Chrysocolle ana \mathfrak{z} 1.s.Piperis albi \mathfrak{z} 1.

Ammoniæ, succo rutæ soluti

Medullæ cruris vituli ana \mathfrak{z} 1.

Pinguetinis gallinæ

Anseris

Anatis ana \mathfrak{z} s.

Olei de capparibus

Cotoneorum

Nardini ana \mathfrak{z} 6.

Cera quantum satis est, misce & fiat cerorum pro splene.

III.

℞ Artemisiæ

Sabina. Abrotani ana \mathfrak{z} 1.

Nucis

352 PRACTICÆ GENERALIS

Nucis moschata
Calam. aromatici
Cinnamomi ana ʒ 2.
Serapini
Opopanacis añ. ʒ 1. s.
Olei nardini

Irii. Liliorum alb. ana ʒ 1.

Dissolutis gummi in vino, cum cera, quod satis est, formetur ceratum vtero applicandum.

De scutis. Cap. 55.

SCuta ex pulueribus medicamentorum siccorum conficiuntur. Pulueres autem non debent excedere vnciam vnam & semis, ad summum: sæpe sufficit vncia vna, aut drachma sex, vt ex formula sequenti patebit. Fiunt autem pro stomacho, ad intemperiem aliquam corrigendam, & ad robur illi addendum. Vires suppleant vel vnguentorum, vel emplastrorum.

R. Absynthij. Mentha
Maioranz. Siccorum ana ʒ 2.
Caryophyllorum
Galanga
Xyloaloes ana ʒ 2.
Cumini
Corallorum rub. ana ʒ 1.
Cinnamomi. Rosar. rub. ana ʒ 1.

Fiat

Fiat pulvis, ex quo fiat scutum, cum pauca bombice, acu transuersim confuto, inter duas sindones.

De embrochis, Cap. 56.

Embrocha, Latinis irrigatio dicitur, est, ubi ex alto pluuiæ instar in partem aliquam fit destillatio. Differt à fomento humido, quòd hoc *est tracta fomento humido.* sponsia, vel pannis densis, in decoctione madefactis utamur: illa verò pars ex alto irrigetur.

Componitur ex herbis, floribus, radicibus, seminibus, & id genus alijs, decoctis in aqua, aut vino, aut lixiuio, vel oleo.

Adjicitur autem magna ex parte ad manipulos duos plantarum, libra vna liquorum, atque quoad medietas absumatur, decoquitur. Vtuntur ijs calidis, ad somnum conciliandum, ad dolores capitis finiendos, aliarumque partium fracturas, & contusiones.

I.

℞. Lactucæ. Violarum.

Saluiæ

Rosarum.

Anethiana M. 3.

Cort. rad. mandragoræ ʒ 6.

Flor. nymphaeæ

Cucurbitæ ana M. 2.

2

Sent.

354 PRACTICÆ GENERALIS.

Sem. papaveris albi ℥ 2.

Lactuca. Portulacæ

Cucurbitæ ana ℥ s.

Coquantur in lib. 10. aquæ fontanæ vsq; ad dimidij consumptionē, fiatq; irrigatio somnifera.

I I.

R. Florum rosarum

Violarum

Nymphææ ana M. s.

Fol. salicis M. r.

Sem. Lactucæ

Portulacæ

Cucurbitæ ana ℥ i.

Papaveris ℥ s.

Coquantur in lib. i. s. aquæ fontanæ ad tertiam partem vsq; consumptionem, fiatq; embrochia.

I I I.

R. Betonica. Maiorana

Lauendulæ. Chamomilla

Origani. Hyssopi ana M. r.

Coquantur in tribus lib. aquæ ad consumptionem partis dimidiæ, fiatq; irrigatio.

De Balneis, Cap. 57.

Semicupium.

INsessio, in sessus; Græcis ἐνὸς ὕδατος, vulgò semicupium, balneum particulare est, cui ægri ad ventriculum vsque tantummodo insident cruri-

cruribus & brachijs exemptis. Fiunt ex decoctione herbarum, florum, radicum, & seminum, quæ omnia pro morbi natura variantur. Herbarum autem quantitas sit à manipulis quinq; ad octo, vel decem: radicum ab 3 2. ad 3 4. seminum à 3 6. ad 3 5. vel 3 6. aquæ verò, quantum pro infessu sufficere videtur. Imponuntur medicamēta sacco, & in aqua ad tertias vsq; coquuntur.

Vtuntur his in renum, vesicæ, coli, ani, & vteri *Quibz aff. confortat.* malis: & quidem temperatè calidis, duabus, aut tribus horis ante cibum, corpore prius purgato, vel saltem alui, & vesicæ excrementis depositis: non autem vbi crudis & malis humoribus corpus est refertum. Mora autem in eo, ad horam esse debet, plus minusue, tum pro affectus vehementia, tum virium imbecillitate, capite operito, ne eo oppleatur.

I. PRO DOLORE NEPHRITICO.

℞. Maluæ

Althææ

Parietariæ ana M. i.

Chamomillæ

Meliloti

Anethi ana M. i.

Betonicæ

Origani

Calamenthi

Abrotani ana M. i.

Z 2

Rad.

356 PRACTICÆ GENERALIS

Rad.altheæ ꝑ 3.

Sem.lini

Fœnigræci

Anisi

Fœniculi ana ꝑ 2.

Furfuris ꝑ 4.

Ponantur omnia in sacco, & fiat decoctio
in sufficiente quantitate aquæ, pro semicupio.

I I.

R. Saxifragiæ

Maluæ. Parietariæ

Altheæ ana M. i. s.

Cicerum rub. ꝑ 2.

Sem. petroselini

Lini

Fœnigræci ana ꝑ 2.

Coquantur singula in aqua iustæ quantitati
ad tertias, pro infusione.

II. PRO DOLORE COLICO.

R. Chamomillæ

Anethi. Origani

Calamenthi ana M. i. s.

Maluæ. Parietariæ ana M. 2.

Sem. lini

Fœnigræci ana ꝑ 1.

Sem. anisi

Fœniculi. Carui

Cumini ana ꝑ 1.

Baccarum lauri ζ s.

Quæ omnia inclusa sacco, coquantur in aqua ad tertias, pro semicupio.

III. PRO MENSIBVS RETENTIS.

\mathfrak{z} . Arthemisiæ. Sabinæ

Calamenthi. Marrubij

Chamomillæ. Meliloti

Pulegij. Saluiz

Matricariæ ana M. i.

Rad. petroselini

Apij ana ζ i.

Ciperi M. i.

Granorum iuniperi M. 2.

Coquantur pro infessu.

IV. PRO FLVORE NIMIO

menstruorum,

\mathfrak{z} . Burse pastoris

Plantaginis

Polygoni

Equiseti ana M. 2.

Consolidæ maioris ζ 2.

Malicorij ζ s.

Balaustionum ζ s.

Coquantur omnia in tribus aquæ pluuialis partibus, & quarta vini nigri austeri pro infessione.

V. PRO DOLORE ARTHRITICO.

\mathfrak{z} . Betoniz

Z ;

Ma-

Maiorana
 Rorismarini
 Stœchados
 Saluia. Hyperici
 Chamædryos
 Chamæpityos
 Fol. lauri
 Origani
 Serpylli
 Chamomillæ ana M. i.
 Rad. acori
 Althææ ana ℥ 2.
 Foenigræci ℥ 4.

Omnibus in sacculo positis, coquantur ad
 tertias. pro balneo.

De collutionibus & ablutionibus,

Cap. 58.

Collutionibus utimur in doloribus dentium :
 Ablutionibus verò ad prouocandū somnum,
 & lassitudinem discutiendam.

Abluuntur caput, pedes, manus, & axillæ. Ca-
pitales ablutiones, ex herbis, & floribus capita-
 libus, in lixiuio coctis, componuntur: axillarum,
 ex astringentibus: vt oleastro, lentisco, additis
 quibusdam odoratis, vt rosis, in lixiuio. Pedum
 verò, ex herbis, floribus, vel calidis vel frigidis,
 in aqua,

in aqua, vel lixiuio coctis. Horum autem quantitas communiter à manipulis 4. ad manus octo, vel decem. Qui frigidi & humidi natura sunt, capitalibus lotionibus, rariùs: qui verò calidi & ficci, frequentius vtiuntur.

Capitis autem lotiones calidæ exhibendæ manè ante cibum, corpore recrementis vacuo, sic tamen, vt statim caput abstergatur linteis calidis, & exiccetur. Pedum verò lotiones, manè vel vespèri ante cibum, vel etiam ante somnum: non autem pedes rursus abstergendi, sed linteo humido inuoluendi sunt.

Porro collutiones fiunt ex herbis, radicibus, corticibus, speciebus aromaticis, & alijs, id genus, in vino, vel aceto decoctis, vt in sequentibus formulis patebit.

I.

℞. Piperis albi

Longi

Cubebarum

Pirethri ℥ 2 s.

Sem. hyoscyami ℥ s.

Cort. rad. capp.

Mori

Mandragoræ ana ℥ i.

Contundantur subtiliter, & in vino nigro coquantur ad dimidij consumptionem: teneatur in ore, & cum in frigidari ceperit, expuatur.

Z 4

II. ℞. Hyf-

360. PRACTICÆ GENERALIS

II.

- ℞. Hyssopi M.s.
Absynthij M.l.
Masticis
Malicorij
Zingiberis ana ℥i.
Macis ℥s.

Contusis omnibus, coquantur in aceto, vel
aqua & aceto, æquis partibus, ad dimidij vsque
consumptionem.

III. ABLVTIO CAPITIS. IN

materia frigida.

- ℞. Origani
Calamenthi
Pulegij ana M.i.s.
Saluiz
Rorismarini
Maioranz ana M.i.
Chamomillæ M.i.
Baccarum lauri M.i.s.

Coquantur in lixiuio ad tertias, fiatque capi-
tis ablutio.

IV. PEDVM ABLVTIO

ad somnum.

- ℞. Fol. salicis
Viris. Maluz
Violariæ

Flor.

Flor. chamomillæ

Nenupharis ana M.℞.

Cort. papaueris ʒi.

Fiat decoctio cum aqua, qua lauentur pedes,
 & brachia bis, vel ter, ante cœnam.

De Ponderibus, et mensuris, Cap. 59.

Pondera, quibus hodie Medici vtuntur, hæc
 sunt:

LIBRA, vncias duodecim pender, & hæc est
 officinis vsitata: huius autem hæc est nota, lib.

DEVNX, vnciam vndecim.

DODRANS, vnciam nouem.

BES, quasi bis triens, vnciam octo.

SEPTVNX, vnciam septem.

QVINCYNX, vnciam quinque.

TRIENS, quatuor vnciam.

QVADRANS, tres vnciam.

SEXTANS, duæ vnciam.

SESCVN CIA, seu sescunx, vncia vna, &
 semis. Nota ʒi.s.

SEMIS, vel Semissis, id est dimidium. Sic
 scribitur S.

VNCIA, duodecima pars libræ, constat
 drachmis octo, cuius talis est nota ʒ.

AVREVS Arabum, & Denarius Romanus,
 pender drachmam vnam, & insuper septimam

Z 4

cuius

362 **PRACTICÆ GENERALIS**
eius partem, unde septem denarij, vel aurei, con
stituunt vnciam. Sic notatur, χ .

DRACHMA, pendet grana sexaginta, se
scrupulos tres, & est octaua pars vnciæ. Huius
hæc est nota, ζ .

SCRVPVLVS, pendet obulos duos, se
grana viginti. Sic notatur, θ .

OBVLVS, pendet grana decem, seu scrupu
lum dimidium. Sic autem scribitur, φ .

GRANVM, minimum pondus est, quo uti
mur. Sumimus autem grana piperis albi, si ali
pondera defunt, quorum, viginti scrupulum
sexaginta drachmam constituunt: atque eius
hæc est nota, Gr.

ANA idem potest, quod singulorum tan
tundem, vel partes æquas: cuius nota est, α
vel ana.

Quod ad mensuras attinet, sunt vel liquido
rum, vel aridorum.

ARIDORVM mensura.

MANIPVLVS, qui dicitur fasciculus her
barum, aut similium, qui manu comprehend
potest. Sic scribitur, M.

PVGILLVS, fit digitis simul in extremitat
compressis. Nota eius est, P.

LIQVIDORVM verò mensura est.

LIBRA ciuilis, quæ pendet vncias sedecim

HEMINA Italica, est dimidius sextarii
Atticus

Atticus, & pendet vncias nouem: tantundem
quoque pendet cotyla Attica. Cotyla Italica est
a mensuralis, seu duodecim vnciae.

SEXTARIUS Atticus continet duas he-
minas, seu vncias decem & octo.

CHOENIX, sextarii duo.

CHVS, choenices duo.

CONGIUS, Sextarios sex continet.


BICONGIUS, duodecim sextarios.

TRICONGIUS, octodecim sextarios.

COCHLEARE maximum, pendet drach-
mas quatuor: magnum sesquidrachmam: par-
um drachmam vnam: minimum drachmam
mediam.

Sed haec de ponderibus, & mensuris sufficiant.

PRA-





PRACTICAE GENERALIS

LIBER VI.

ARGUMENTVM.

De instrumentis chirurgicis po-
tissimum agit. Eius capi-
ta hæc sunt

De instrumentis chirurgicis, Cap.

De cauterijs, Cap.

De instrumentis incidentibus, & exciden-
tibus, & primò de scalpello, phleboto-
mia & scarificatione, Cap.

De nouaculis, forficibus, serris & osium
sectione, Cap.

De instrumentis extrahentib. videlicet for-
cipibus, tenaculis, & volfellis, Cap.

De specillis, Cap.

D

De acubus, cannulis, & sutura vulnerum,

Cap. 7.

De instrumentis ad deligationem aptis,

Cap. 8.

De fascijs, & ligaturis vulnerum, & fracturarum,

Cap. 9.

De splenijs,

Cap. 10.

De puluillis,

Cap. 11.

De penicillis, seu turundis,

Cap. 12.

De ferulis,

Cap. 13.

De fibulis,

Cap. 14.

De instrumentis extendentibus, Cap. 15.

IPRA-



De instrumentis chirurgicis, Cap. I.

Communia

Quamuis hodie chirurgia à medicina separata esse videatur, est tamē Medicō Phyl-
 sum opere necessaria. Quoniam medicinē p-
 chirurgia est. Quare Medicū non tantūm Ph-
 cum (vt hodie loquuntur) esse oportet, ver-
 etiam chirurgum, non quidem, vt manu ope-
 tur, sed vt tanquā imperator, alios monere p-
 sit. Instrumenta autem chirurgica, quādam-
 munita sunt, quādam propria. Ex communib-
 quādam medicinalia, quādam ferrea. Medi-
 nalia sunt tum Diata, tum pharmacia. Verūm
 instrumentis diatiticiis, libro tertio, de pharn-
 ceuticiis verò, libro quarto, & quinto egim-
 restat nunc, vt de ferreis, alijsq; quib. chirurg-
 munitus esse debet disseramus. Itaq; ferrea
 strumenta quādam ad incidendum: quāda-
 ad vrendum: quādam ad extrahendum: qu-
 dam ad probandum, seu explorandum: qu-
 dam ad suendum sunt apta: Sunt & alia inst-
 menta non ferrea, quorum alia ad ligandum i-
 uenta sunt, vt fasciæ: alia ad vniendam carne-
 vt acus, fibula, cannula, splenia, puluilli: a-
 ad vnienda ossa fracta, vt fetula: alia ad exte-
 dendu

endum vt habenæ, scalæ, aliæque id genus machinæ. Sic capiti proprium instrumentū est molis: sed, falx: matrici, speculum: de quibus omnibus nunc ordine agemus, ab ijs, quæ vreni vim habent, exordium sumentes.

De cauterijs, Cap. 2.

Cauterium duplex est, actuale videlicet, & potentiale. Actuale fit metallo ignito: auro, auro, & argēto, lenius: ferro verò acrius existit. potentiale fit ex medicinis causticis, & erodentibus. Sed actuale, potentiale melius & securius est. Variant autem pro locorum, & morborum iuversitate. Aliud enim punctuale est: aliud rotundum: aliud planum, & longum: aliud cultellæ, ad formam cultelli factum: aliud oliuare: aliud triangulare: aliud dactylare: aliud ab aculeale: aliud circulare, &c. Porro cæsim, punctim cauteria imprimuntur. adiguntur longius, & latius, & in circulum circumferuntur: vno loco vel pluribus: semel ac sæpius, vt natura parum sustinet, & vitia requirūt. Fiunt cauteria in capite contra epilepsiam, maniam, melancholiā, dolorem capitis diurnum, hemicranium, oculorum lachrymas, &c. Que in humeris sunt cauteria, cōtra humerorū & spatularū dolorem valent. Circa radicē verò gutturis facta, asthmati, & pulmonū vitijs conferūt. Contra dolorē, & vitia hepatis.

Actuale.

Potentiale.

hepatis, supra ipsum hepar cauteria sunt faci-
da: contra vitia splenis, supra lien: contra lu-
borum dolorem, sub ipsis, in fontanella: con-
ischiadam passionē, in coxendice: contra arth-
riticam passionem sub genu, &c. Caterum ca-
uteria tempore matutino sunt adhibenda, corp-
re nō repleto, sed prius euacuato. Locū igni c-
cunscribere oportet, nucali testa, vel re simi-
quæ suis marginibus constans pateat in med-
Cerato rosaceo, lana vino tincta muniendæ su-
partes vicinæ, ne iusto latius euadat ignis viol-
tia. Alioqui splenijs, imbutis oui candido, mi-
cagine psyllij; cerussa; è rhodostagmate, lo-
refrigerante succo, & ijs omnino quæ *deprexy*
vovra Græci vocant. Crusta non statim det-
henda, sed nutare prius oportet, ac veluti ma-
ritate sua excidere. Alioqui vis afferri solet, p-
fundum vlcus relinquitur: dolor, fluxio, phlo-
mone irritantur. Tempestiua deduci potest b-
tyro, & rhodostagmate loto, farina tritiei in p-
ri, vel ruti succo, &c. Postquam ceciderit esca-
mundificetur. Porro cauteria per dies quadra-
ta, aut tribus mensibus aperta maneant. Ser-
buntur autem aperta cum tentis, & nodis, ex-
ra simplici factis: vel piso, vel gentiana. Et de-
per ponuntur folia caulium, aut hederæ, sup-
panni triplicati, bis in die mutati. Potentia
cauteria ab octo horis vsque ad duodecim rel-
que

*Cuo tempore
adhibenda.*

*Quibz quæ de-
trahenda.*

quo modo.

*Quibz sedentes
aperta.*

uenda sunt: & postea remouenda. Vesicæ verò,
vesicantibus cauterijs eleuatæ, incidendæ, &
periendæ sunt, cum forficibus, aut cum acu. Et
postea supra folium caulis, & panni applicandi
& sicut placebit remutandi.

De instrumentis incidentibus, excidentibus, scalpello, phlebotomia, & scarificatione, Cap. 3.

Instrumenta chirurgica ferrea, ad incidendū,
& excidendum, sunt forfices, nouacula, ferra,
& scalpellum, quod phlebotomō appellant. Ve-
rum de phlebotomo hoc loco dicendum venit,
de reliquis verò tribus instrumentis sequenti ca-
pitulo agetur. Scalpellorum itaque tria sunt gene-
ra: oliuare, myrtinum, & cultellare. Cultellare
quod Italis *Lancetta* appellatur, vel latum, vel
subtile est, pro venarum amplitudine, & strictu-
ra. Myrtini forma lata est: & conuenit ad incidē-
das venas concauas, plenas, procedentes, appa-
rentes, magnas, illasq; quæ sanguinem crassum
continent. Forma verò oliuaris phlebotomi est
minoris latitudinis, & subtilioris extremitatis:
& conuenit ad venas paruas incidendas, & quæ
sanguinem tenuiorem continent. Cultellari uti-
tur in venis incidendis, quibus vel nerui, vel
arteriæ subiacent, quò securius, & minori cum

*Scalpellor-
um.*

370 PRACTICÆ GENERALIS

periculo sanguis extrahatur. Quomodo autem phlebotomia sit perficienda, & quantū sanguinis sit extrahendum: item quibus conueniat, quibus non: & quæ venæ, & quibus in morbis sint incidendæ, & quo tempore, libro tertio abundè diximus. Porro scalpellis quoque vtimur in abscessibus suppuratis aperiendis, vt libro sequenti docebimus.

*Scarifica-
tio*

Cæterum balneatores apud nos quoque scalpellis ad scarificandum vtuntur, verum non tæcuminatis & subtilibus vt in venarum sectione, sed latioribus, & rotundioribus in aciei extremitate. Cucurbitula aut prius vacua applicanda est, & tandiu relinquenda, donec pars rubescat & attollatur: qua deinde ablata, pars secundum cutem scarificanda est ordinatè, semel atque iterum, scarificationibus paulo profundioribus factis, præsertim si sanguis fuerit crassus, & æge robustioris naturæ. Quibus autem scarificationes conueniant, & quibus non: item quos morbos iuuent: & quæ partes scarificandæ, & quo tempore, ex libro tertio petenda sunt.

De nouaculis, forficibus, ferris, & ossium
sectione, Cap. 4.

Forficis.

Forficibus & nouaculis maximè indigent chirurgi. Forficibus namque vtuntur ad incidendas telas.

as télas, fascias, fila, pilos, capillós, yngues, cutem, coria, membranas, ligamenta, & quæ in fauibus, & gula adnascuntur, vel putrescunt, & id genus alia, &c. Nouacula verò culter rasorius dicitur à Nouo, quod faciem nouare, id est, nouam quodammodo, & iuniorem, facere videatur. His vtimur ad pilos, qui vlcerum, vulnere, & tumorum sanationem impediunt, radendos: item ad cutem denudandam: carnem putridam excidendam cutem (vt in Gallia, & Italia fieri solent) scarificandam, & id genus alia exhibenda. Ferrò ferra est instrumentum dentatum, quo ossa, & membra putrefacta secantur. Serrarum, quibus ossa corrupta secantur, pro vario situ ossium, crassitudine, magnitudine, duritie, & caritate, varix quoque existunt differentiæ. Quibus verò extrema membra corrupta adimuntur: unicum genus ferræ commune est: Verum non omnibus quibus membrum aliquod computruit, huiusmodi sectio facienda est. Senes enim, pueri, debiles, & quibus iam vltra genu corruptione progreditur, morti potius relinquendi sunt, quam secandi.

Fortiores verò, & robustiores matutino tempore sunt secandi, & quidē in hunc modū. Pars brachium videlicet, vel crus) inferius & superius ligamento constringenda prius est, deinde caro intra duas has ligaturas spatium lato ad os vsq;

Nouacula.

Ferræ.

*Sectionis
modus.*

372 PRACTICÆ GENERALIS

os vsq; separanda, & denudanda mox ferra, ac id genus ordinata, os abscindendum. Cauendum tamen ne ferra carnem sanam tangat, dolorem & inflammationem inferat, quod facile impeditur, si pannus linteus ab omni parte interponatur. Abscisso membro, pars vulnerata ligamento conuenienti liganda est, & curanda, donec omnino perfanetur. Quod si inter operandum, fluxus sanguinis vehementer irruat, velociter locus cauterizandus, vel ora venarum filo liganda, vel pulueribus astringentibus fluxio impedienda erit.

De instrumentis extrahentibus, forcipibus, seu tenaculis, & vossellis,

Cap. 5.

DE instrumentis vrentibus, & secantibus, tribus precedentibus capitibus diximus, nunc de attrahentibus, videlicet forcipibus siue tenaculis, & vossellis dicendum videtur, quæ pro rerum extrahendarum & particularum affectarum diuersitate plurimum etiam variant. Sunt namque, forcipes, quibus dentes exesi, vel putrefacti eradicari solent: alij ad spinas è gutture extrahendas fabricari: alij, quibus sanguis fugas: alij, quibus lapides ex vesica: alij quibus foetum mortuum, vel

Forcipes.

am, vel secundinam ex utero extrahimus: alij sagittas, tela, & spicula: alij globulos ferentarios ex corporibus nostris extrahunt. Verum, licet multa sint instrumenta, telis, atq; infixis alijs rebus extrahendis accommodata, octo tamen apud recentiores chirurgos sunt magis communia.

Primum, sunt forcipes, seu, ut vulgò loquuntur, tenaculæ, quæ denticulatæ sunt, & capita habent ad instar limæ.

Secundum sunt forcipes Albucasis, in modum rostri avis, etiam denticulatæ.

Tertium, sunt forcipes in modum cannæ, siue arundinis, aut scriptorij calami, concavæ, quas vulgò tenaculas cannulatas appellant, ad sagittas spiculis cinctas & globos ferentarios (quas barbatulas nominant) extrahendos accommodatæ.

Quartum est, terebellum inuersum, quod in ferri infixi tubulum (quam doliam appellant) imponitur: ubi autem sic tubulo immissum, ferrum apprehenderit, leuiter ferro sequaci educitur.

Quintum instrumentum, est terebra in longum porrecta, dilatandis ossibus (quibus tela firmiter inhaerent) apprimè idonea.

Sextum, est incisorius culter, ad amplificandam carnis vulnera, quod facilius infixæ eximantur.

Septimum est propulsatorium instrumentum, quod geminum est, nempe cauum, & solidum, siue surdum: illud sceminam, hoc marem appellant.

lant. Ijs tela protūdinus, donec ab altera par
apprehendi, & extrahi possint.

Octauum est in modum arcus illius, quem t
listam vocitant. Hoc autem, ictum telum excu
tur.

Forcipes autem, pro eradicandis dentib
sint subtiles, longarum, extremitatum, breu
manubrij, crassi. vt non duplicentur, quando
eis premitur. Sint autem ex ferro optimo faci
directarum extremitatum. Et in eorum extre
tatibus sint dentes, quorum quidam ingredia
tur in quosdam, & stringant decenti & forti c
strictione. Quandoq; sunt extremitates, sic
forma rostri auis, quæ ciconia nominatur, q
fortis sunt constrictionis.

Ad spinas de gula extrahēdas, quidam instr
menta ex plumbo conficiunt, Radio similia, p
lo tamen maiora, & in extremitate curua.

Instrumentum verò sanguisugis, quæ sub v
sum cadunt extrahendis idoneum, simile est
debet forcipibus rostri auis, quæ ciconia appe
latur, in quo lima tamen asperitas insit.

Fœtus autem mortuus extrahitur vncinis,
forcipibus accommodatis, matrice prius aper
Aperitur verò instrumento, quod antiqui Ver
ginem vocitant.

Porro Volsella instrumenti chirurgici genu
est, quo caro ex vlcēribus putrida præcidend
appreh

Volsella.

apprehenditur. Sed hæc de instrumentis attrahē-
tibus nobis sufficiant:

De Specillis, Cap. 6.

Specillum, quibusdam proba, tenta, & intro-
missum vocatur, instrumentum est teres, &
paruum, quæ chirurgi ad scrutandum, siue ten-
tandum vulnere, & fistularum viâ, & profun-
ditatem vtuntur, quod cum notissimum sit, de
hoc pluribus agere non est necesse.

De acubus, cannulis, & sutura vulne- rum. Cap. 7.

Acus, & cannula vulneribus suendis accom-
modata sunt. Acus autem longa, ac levis es-
to, cuspide triangulari, cauda verò excavata, vt
in ea filum recondatur, & trāsitum acus non re-
mouetur. Ita enim mitius corpori insidet. Cate-
rūm cannula habeatur fenestrata cui incūbat,
ac innitatur altera pars labij vulneris, ne scilicet
huc atq; illuc euagetur, dum acus intromittitur
& vt per fenestellam videri possit, quando acus
pertransierit. Atq; vbi iam acus traiecta fuerit,
vnâ cum filo trahatur: sed interim vulnere
labrū, quod prope filum est, specillo huic parti
applicato, veluti fulcimento, & adminiculo

Acus.

Cannula.

376 PRACTICÆ GENERALIS
innitatur, ne dum filum extrahitur, labrum eti
consequatur. Ligetur autem primò duabus in
lusionibus, secundo vna duntaxat, deinde filum
scindatur, aliquantulum remotè à nodo.

Sutura :

Sutura autem fiat filo forti, æquali, & læui, c
iusmodi est sericum in communibus saltem vu
neribus, primùm punctum faciendo in medi
diuisionis vulneris, deinde alterum in medi
spacio vtriusq; lateris, & ita deinceps procedē
do, vt inter duo quæcunq; puncta, punctum in
tercedat, donec vulneris labra ritè commissa fu
erint. Itaque nec nimis rara, neq; nimis crebra
sutura esse debet. Si enim nimis rarà est, nō cō
tinet: si nimis crebra est, vehemēter afficit. Qui
quò sæpius acus corpus transiit, quoque plur
loca iniectum vinculum mordet, eo maiores in
flammationes oriuntur. - Sic igitur futura ora
iungat, vt ne ipsa quidem inter se ex toto con
tingant. Quod scilicet, si quid intus humeris cō
creuerit, fir quā emanare, ac effluere possint. So
lent autem communiter vnius digiti transuer
salis spacium interiecta vincula relinquere.

De instrumentis ad deligationem
aptis, Cap. 8.

IN deligandi arte veteres quàm plurima vsu
diuersa suis etiam nominibus distinxerūt. lin
theola,

icola, fascias, hypodesmidas, splenia, ferulas,
 pathulas, habenas, laqueos, pulvinas modò
 corteos, modò molliusculos, nodos, & id ge-
 us alia, de quibus quoq; dicendum venit.

*De Fascijs, & ligaturis vulnerum, &
 fracturarum, Cap 9.*

Fascijs utimur in vulncribus, vlceribus atque
 fracturis. At fascia ad vulnus deligandum, lin-
 ea aptissima est, quæ nec nimium mollis, nec ni-
 mium dura sit. Quod enim molle nimium est, &
 gæ ritu fragile, non tutò continet. Quod verò
 urū nimis est, premendo offendit. Sit igitur ex
 ano veteri, nō tamen nimis detrito, suauī, leni,
 mundo, eaq; latitudine, & longitudine, quā
 atura partis desiderat. Vt si humerus tibi deli-
 andus sit, fasciam, quæ latitudinem sex digito-
 um habeat assumes; at si femur, quinq; si tibia,
 quatuor; si brachium, trium digitorum. Si verò di-
 tus ligari debeat, vnus digiti latitudine fascia
 sumenda erit. Eius verò longitudo sit, pro rari-
 ae numeri iniectionum. hoc est, pro necessi-
 te reuolutionum. Sed & ad hoc non parum cō-
 ert cognitio conformationis ipsius particule la-
prantis. Quod ad fracturarum deligaturam at-
 net, tuta non erit deligatio, si vel nimis arcta,
 el laxa nimis fuerit. Quandoquidem per laxio-

*Vulncrium
 ligatura*

*Fracturæ
 ligatura.*

rem ossibus moueri licet: per arctiorem verò, & vehementius adstringentem, & alimenti in loco cum affectum distributio prohibetur, & dolor (qui humorum in ægram partem affluxus euocat, & phlegmonas creat) exciatur. Danda itaque opera est, vt vtrunq; excessum declinemus. Constrictio igitur mediocris esto, tum nostri sensus tum ipsius ægrotantis iudicio. Ac si quidem æqualis esset crassitudinis membrum quodque vtiq; latissima fascia commodissima esset, vt pote quæ totum æqualiter, continenterq; ex omni parte fractum os complecteretur. Sed quoniam id non est, quod deest nobis, ex fasciarum latitudine, circuituum numero pensabimus, vt in artubus ipsis, qui omnium maxime fracturæ transuersum factæ, expositi sunt. In talibus namque utilior est angusta deligatura, quàm valde lata & remissa. Quippe quæ nec rugas, vt ea, quæ latiore fascia fit, contrahat, & totius membri, cui circumdata est, cutem contegat. Eò igitur vsque augere tibi latitudinem fasciæ licet, quoad nulla eius pars laxior efficiatur. Cæterum in eiusmodi deligatura, quæ fracturis (in medio præsertim brachii, vel tibiæ, aut femoris existentibus) adhibetur, duabus fasciis lineis mollibus, opus est. Hanc autem Hypocrates hypodesmidas, id est subligamina seu malis subfasciatores appellauit. Primæ fasciæ initiū super fracturam injici debet.

bet, ac circa eam bis, tēue conuoluta, sursum
versum ferri, & quasi in cochlea serpere, at-
que illic desinere. Id tamen perpetuò obseruā-
dum est, vt multum partis sanæ fascia hæc com-
pletatur. Ita enim fiet, vt & firmitus reposita, ac
conformata ossa contineantur, & magis ab affe-
cto loco in circumuicinas partes humores elidā-
tur, magisq; ne hi à superiori parte eò defluant,
impediatur. Altera etiam super fracturam de-
bet incipere priori aduersa, deorsumq; (vbi pri-
mos complexus super fracturam fecit) tendere,
atque inde iterum reducta in superiore parte
ultra priorem fasciam desinere. Quocirca di-
mīdio longior priore esse debet. Terminus au-
tem longitudinis earum fasciarum, non vnus ac
certus statui potest, sicuti nec etiam latitudinis,
sed pro magnitudine fracturæ, & perfracti mem-
bri crassitie, vtraque dimensio varianda est.
Sunt autem eiusmodi fasciæ dux prælongæ,
nempe quatuor, aut quinque, aut sex cubi-
torum, & circa tres quatuorue digitos latæ, a-
qua aut postea potius madefactæ, & postea ex-
pressæ, præsertim si fractura inflammatione
vacet, recensque sit. Si verò dolor vehemens,
aut inflammatio adest, lanis tenuibus molli-
búsque, aut stupis læuibus, oleo, vel oxycra-
to imbutis, membrum contegendum est, &
non ita arctè deligandum. Satis enim fuerit
tunc,

tunc si deligatura adhibeatur, quæ & membrum
utrunq; fulciat, & admota medicamentâ, ad hæc
symptomata profliganda idonea, contineat.

De Splenijs, Cap. 10.

Splenium ab oblonga splenis figura nomen
habet. Varijs corporis partibus, potissimum
verò ossibus fractis, carnibusq; exulceratis, ac-
commodatur, & pro earum diuersitate plurimū
variatur. Splenia namq; pro vlceribus, pannorū
lacinia sunt, in linamenta formata, vnguēt
albo Rhasis illita, aut vnguento, quod sextâ par-
tem lithargyri recipiat, vel vnguento, quod dia-
pompholygos nuncupatur, supra vlcus ipsum
posita. Verum supra eiusmodi linamenta vlcus
imposita, putuillus, quem plumaceolum vocant
(de quibus deinceps dicemus) posca aquosū
imbutus, adhibendus erit: deinde cōueniens d-
ligatura. Cæterum splenia, à splenis forma ita ap-
pellata, ad fracturarum tutelam, stabilimentūq;
plurimum faciunt, maxime si huiusmodi plagu-
læ vnâ cū exterioribus fascijs, quas epidesimas
id est, superligamina appellant, desuper adhibe-
antur. Splenia enim eiusmodi siue plagulæ, dua-
rum primarum fasciarum, quæ peculiari nomi-
ne hypodesmidæ, id est subligamina appellantur
firmamenta sunt. Non mediocriter præterea auxi-
lium

ium ferunt splenia in magnis ossium abscessi-
bus, præsertim vino nigro, subaustero insuccata
quæ deinceps atq; continenter, hinc inde adhi-
benda sunt, non vt hoc illi infideat. Longiores
sunt, quàm quæ solum ambitum membri com-
prehendant. Nā si quadrantalis circulus est par-
tis, paulò longiores splenes trientalibus esse o-
portet. Oblique iuferuntur membro, & aduersa
parte decussantur.

De puluillis, Cap. II.

Puluilli, qui vulgaribus chirurgis plumaceo-
li nuncupantur, ad multa utiles sunt. Quan-
doquidem dissolutas, ac diductas partes fulci-
unt, & comprimunt: membri, quod suæ vnionis
inortium patitur, geminum calorem fouent, &
conseruant. Deniq; à graui molestoq; vinculo-
rum, ac fasciarum pondere, vulneratam particu-
lam tuentur. Fieri autem quondam solebant ex
lana inter duos pannos candidos & mundos
confuta, vnde & nomen illi à veteribus inditum
est. Verum quoniam eos subinde mutare & in-
nouare (quod valde tediosum erat) cogebat ne-
cessitas, magis postea placuit eiusmodi puluil-
los ex stupis canabinis conficere, præsertim di-
genter, ac studiosè pexis emundatisq; Fiunt e-
iam interdum ex lana, vel xylo, quod cottonem
appellant

Ufus.



382 PRACTICÆ GENERALIS

appellant. Pleriq; autem hodie loco piluillor:
panniculos admovent leues, duplicatos, aut tri-
plicatos: alij verò spongiam adaptant. Porro du-
vel tres, pluresue, prout res exposulat, appo-
nuntur. Quandoq; quidem sicci, ac nullo ma-
dentes liquore: nonnunquam verò imbuti ou-
candido, vel vino, vel posca, aliquoties etiam o-
leo, iuxta ipsius dissolutionis exigentiam. Inue-
niuntur autem huiusmodi puluilli, ex tripli-
differentia, quod ad figuram attinet. Alij eni-
triangularein, alij rotundam, alij verò quadrat-
habent. Qui figura constant triangulari, gluti-
nandis vulneribus sunt dicati. Ita autem dispo-
ni debent: vnus ex vtroque latere orarum, seu l-
brorum vulneris, constituatur ita, vt super pla-
gam, inter seiungantur lateribus. Qui rotundi
habent figuram, sicci alijs superponuntur, nat-
ui caloris particulæ læsæ conseruandi gratia, &
vt saniosam proluuiem ac sordidos ichores in l-
recipiant. Sed qui quadrati sunt, ideo apponun-
tur, vt partem læsam à fasciis & vinculis
iniurijs vindicent.

De Penicillis, seu turundis,

Cap. 12.

Turundas seu penicilla, & linamenta, qua
vulg

legò tentas appellant, maximo esse vsui in curandis vulneribus, & præcedentia luce clarius ostendant, & omnibus in aperto est. Proinde quando, quomodo, & ad quos fines illis sit utendum, chirurgo haudquaquam est ignorandum.

Ad hæc ex qua materia, & qua figura formari debeant. Itaq; illis utimur, in ijs octo præsertim vulnerum generibus.

Primo cum vulnera vel amplianda sunt, vel detergenda, vel cum aliquid ab eorum fundo vacuandum est: vt in profundis vulneribus, in quibus necessum est alibi vulnus aperire, vt ex fundo, & sinu ipsius ichores, id est saniosa colluuiæ, inibi collecti vacuentur.

Secundo illis cogimur uti, in cauis vulneribus in quibus necessaria est carnis deperditæ regeneratio.

Tertio in vulneribus alteratis ab aëre, & fordidis, quæ deteritione egent.

Quarto in vulneribus contusis.

Quinto, prædictorum vsus vtilis est in vulneribus, quæ cum phlegmone, aut quouis alio tumore præternaturam fatigant.

Sexto in vulneribus, quæ per morsus fiunt. Talia namque vulnera non sunt festinanter agglutinanda, & ad cicatricem perducenda. Quin potius longo tempore aperta & hiantia

hiantia manere debent . Quandoquidem mor-
sus ferè omnis quoddā virus habet, quod foras
semper euocandum est, non intrò repellendum
nec occluso vulnere intus relinquendum.

Septimò turundis, & linamētis vtimur, in vu-
neribus, in quibus persanandis circa ossa manu
ad mouenda est.

Octauò in vulneribus, quæ iam vetustate in v-
cera defluxionibus scaturientia degenerauerūt
Porro in omnibus alijs reliquis vulneribus , in-
ducenda cicatrici studemus, absq; eiusmodi tu-
rundis, & linimentis: Aduertendum autem est
in ijs diuersitatem non paruam esse, pro rationis
finis, cui gratia sūt & admouētur. Fiūt autē inte-
dū, vt diximus, ad detergendas sordes vulnerū
atq; tum ex panni nō asperi, & præsertim vete-
ris, lacinijs, vel floccis euulsis, formantur. Non
nunquam verò ideo fiunt, & in vulnus immitti-
tur, vt ipsum hians, & apertum maneat. At tunc
quidem ex stupis benè pexis, & à sordibus riti-
emundatis, vel ex prædicti panni frustulis; effor-
mantur: vel etiam ex xylo, quem cotonem vocā
Sed & ex canna ænea, vel argentea perforata fi-
unt penicilli ad eundem finem: vt verbigratia
in naribus, ad aëris inspirationem: & in altis vu-
neribus, vt sanies, & purulenta colluuiū, per hāc
velut emissarium feratur, non autem intus reti-
neatur. Quandoq; etiam hæc linamenta inquā
& pe-

penicilla, plagæ inferuntur, ut ipsius os magis
 chifcat, & ampliatur, fiuntq; tunc, aut ex spon-
 iolis vehementer compressis, & intorritis, aut
 ex radice gentianæ: hæc enim dum multum hu-
 morem, quo scatet vulnus, combiberint, turge-
 runt, & ita magis hiantem plagam reddunt.

Cæterum forma linamentorum æqualis esse
 debet. turundarum verò inæqualis, in modum cla-
 iculi lignei, quem Latini impagem vocant, ne
 scilicet intrò labantur. Hæc autem aliquoties
 uidem sicca, quandoq; verò quopiam delibuta
 nguëto admoventur, prout res ipsa exigit. Re-
 qua quæ ad eiusmodi operationes spectant,
 medentis consilio, & solertiæ committuntur.

De ferulis, & quomodo in fracturis adhibeantur, Cap. 13.

Ferulis ad membra perfracta chirurgi maxi-
 mè utuntur. Nam ut perfracta membra in na-
 turali figura immota prorsus (quoad expediet)
 existant, recentiores chirurgi secundum deli-
 aturam protinus ferulas etiam circumponunt,
 has quidè constringentes, prout sensus, & tu-
 mor ex inflammatione (si qua adsit) postulat. Ve-
 res autem à die tantum septimo, vel etiam
 nono, & vndecimo ferulas accommodabant. Ve-
 ram non abs re factum putamus, si statim

B b

ab ini-

186 PRACTICÆ GENERALIS

ab initio post deligaturam, ferulæ injiciantur
modò nimis premendo dolorem non excite-
ant aut phlegmonē (quæ maximè arcenda erat) a-
cerlant, vel præsentem (si adsit) exacerbent. Qu-
igitur à principio adhibentur à recentioribus
ferulæ, non eo nomine adhibentur, circum-
nuntur, ut astringant, sed ut adaptationis
guram contineant, & ossa in suam sedem rep-
sita utcunque fulciant. Primis namque di-
bus cum phlegmones, deuitandæ consiliū v-
ceret, tutum non erat perfractum membru-
ita ferulis premere. Cum verò nullus iam an-
pius futuræ inflammationis metus sit, aut e-
quæ prius fuit discussa, membrum aliquan-
gracilius quàm pro naturali habitu apparuerit
(quòd intra septimum diem ferè solet conti-
gere) tum licebit ferulas circumponere, et e-
(ut fracturam stabiliant) validè satis astringere.
Ferularum enim vsus idem est, qui & plagul-
rum, seu spleniorum, nempe ut fractum os co-
tineant, & deligationem stabiliant, ac firmen-
Sunt autem ferulæ, ut rectè præcipit Hippo-
crates, leues, id est, leuigatæ & planæ: æquabiles,
est, neque in latus, neque in superiorem, a-
inferiorem partem, distortæ: in summis pa-
tibus, id est, extremitatibus, resmæ, id est, leu-
ter deorsum ac reuersa: minores hinc inde, quæ
deligatio est: & ea parte crassiores, id est, lati-
res,

es, & valentiores, quā fractura eiupit. Leues
ntem ferulas, id est, non asperas, adhibendas
se censet Hippocrates, ne sua asperitate, &
æqualitate fractis partibus negotium faces-
ant. Vtroque enim modo comprimunt. Cate-
um quoniam fieri potest, vt ferulæ leues sint,
non tamen æquabiles, ideo non solum leues,
ed etiam æquabiles, id est, non distortas assumē-
las esse ferulas, monet. Quæ enim distortæ
unt, similiter, vt aspera, laidunt, ac illud insuper
fficiunt, quod deligationem simul distortuēt:
qua distorta, pars etiam fracta distortueatur
ecessē est. Simas præterea in extremis par-
ibus eas deligi voluit, id est, leuiter derasas,
ic retusas in extrema parte, ne sua acu-
ie articulum lauant, & æqualiter vbique
partem fractam, propter æqualem suam cras-
itudinem, comprimant, quod certè fieri nul-
o modo debet. Vult enim Hippocrates vt supra
ocum fracturæ, hoc est media parte, ferula de-
ligationem magis astringāt. Hinc ea parte cras-
iores esse iubet. Quia scilicet locus is potis-
imum compressione ipsarum indiget. Vult itē
minores eas esse longitudine, id est, aliquantū
breuiiores, quam sit ipsa deligatio, ne cutem
ultra deligationem attingant: quæ sapenu-
mero ex eo, quod humores à fascijs expressos
inscipit, paulo altius turgescit, atq; extat. Sed &

388 PRACTICÆ GENERALIS

breuioribus ferulis vtendum præcepit, ne pars
 eminentior, id est gibba, & carne nudata, attrin-
 gatur, vt circa cubitum, & malleolos, vbi ossium
 extuberationes sunt. Porro ferulæ ex ligno abi-
 etis, vel salicis, vel medietate cannæ latæ, vel de
 vaginis gladiatorum, vel de cornu: vel ex ferro, vel
 corio constare debent. Modus autem ac ratio ad-
 hibendi ferulas, talis esto. Splenia triplicia, au-
 quadruplicia oleo delibuta, super fascias simili-
 ter atq; æqualiter, si membrum in crassitie fuerit
 æquale, circumdato: si verò inæquale partibus ma-
 gis cōcauis, per splenia repletis, membrum vndiq;
 æquale ferulis accommodandis efficitur. Deinde,
 ferulas lana, aut stappa mediocriter inuoluta
 in orbem, non minore, quam vnius digiti spatio inter
 se distantes fracturæ circumdato, easque leniter
 ac moderatè constringito. Sed & in hac ferula-
 rum accommodatione summo opere cauetur
 quatenus fieri potest, ne articulus aliquis, &
 præcipuè interior flexus pars, ab eis attingatur
 Vlcera siquidem in ipsis nonnunquam, & ner-
 uorum inflammationes pariunt. Itaque illic
 hoc est, iuxta articulos ipsos deligatione, ali-
 quantò (vt diximus) breuiiores, tenuiores, laxio-
 res, & magis flexibiles ferulas esse oportet
 quemadmodum valentiores, quam fractura exci-
 dit, atque inclinatur. Caterum si nulla prurigo
 nulla inflammatio, nulla suspecta exulceratio

*Ferulæ
 materis.*

*Modus adhi-
 bendi.*

nullus

ullusue dolor adest, & ossa rectè commissæ
erint, fracturæque rectè procedat: sic mane-
ferulas & ligamenta, ad decimum, vsque
iem, vel quintum, & decimum, aut etiam
gesimum, vtile est. Si verò in membro per-
acto præter solitum cooperto, vel dolor exci-
tur, vel pruritus creetur, vel eius, quod iam
fixum fracturæ est, perspiratio prohibeatur,
propter quam non modò noxius pruritus qui-
usdam accidit, sed etiam erosa à saniei acri-
monia nonnunquam cute, exulceratio conci-
tur non abs re feceris, si tertio quoque die,
iussit Hippocrates, deligationem solueris, &
membrum ipsum aqua temperata perfuderis,
c. foveris. Hac enim perfusione, & acrem atque
rodentem sanie discuties, & dolorem miti-
abis, & prurigini pulchrè medeberis.

De Fibulis, Cap. 14.

Fibulis, quas Græci ἀντρίπας vocant, in vulne-
ribus interdum chirurgi vtuntur, præsertim
s, quorum labra nimium sunt diducta. Si nam-
que in carne vulnus est, hiatque, neque
in vnum ora facile attrahuntur, sit ura quidem
liena est, imponenda verò fibulæ sunt, quæ o-
s paulum tamen contrahunt, quò minus la-
a postea cicatrix sit: ferè autem fibulæ latus
vulnus

PRACTICÆ GENERALIS

vulnus esse patiuntur. Sinto autem fibulæ ipsæ, vel maiores, vel minores, pro ratione partitis vulneratæ: ab utraque verò parte recurua, figuræque hamus vnus in altero vulneris labro, & versus alterum ducatur, in quo & alter hamus infigatur: vt facere solent, qui pannos tundendo apparant. Hæ autem (fibulæ inquam) quibus hiantis plagæ oras sic contrahimus, nullam vim desiderant, sed eâtenus viles sunt, quatenus cutis ducentem quasi sua sponte subsequitur. Adhibentur autem fibulæ in vulneribus maioribus. & rectis: in transuersis verò futuris, & fibulis opus est. Porro præputium assuitur, & infibulatur, vt & carnosum genus, vbi nimium dehiscit vulnus, nec oræ facile coniunguntur.

De instrumentis extendentibus, Cap. 15.

Luxata membra, in solitam sedem extensione reduci à chirurgis solent: Verum non vna eademque in omnibus extendendi ratio est: sed alia atque alia pro natura scilicet partis luxatæ, prout nerui ac tendines valent, aut ossa huc illucue sederunt. Modò enim manibus solis, modò habenis iniectis vtendū est, modò verò quædam alia machinamenta adhibenda sunt, vt ex vno Hippocrate lecto libro de luxatis & fractis discere poteris.

PRACTICAE GENERALIS

LIBER VII.

ARGUMENTVM.

De morborum curatione potissimum agit. Eius capita hæc sunt.

- | | |
|---|---------|
| De morborum curatione. | Cap. 1. |
| De curatione morborum similarium, | Cap. 2. |
| De curatione tumorum præternaturam, | Cap. 3. |
| De abscessuum curatione, | Cap. 4. |
| De curatione morborum instrumentalium, præsertim in conformatione, secundum figuram vitiatam, | Cap. 5. |
| B b 4 | De cu- |

De curatione morborum in compositione,
 tione, secundum cavitatem vitiatam
 Cap. 6

De curatione morborum in compositione
 ex superficie aspera, uel leui, Cap. 7

De curatione morborum in compositione,
 ne, secundum numerum, Cap. 8

De curatione morborum in compositione
 secundum magnitudinem, Cap. 9


De luxationum curatione, Cap. 10.

De curatione uulnerum, Cap. 11.

De curatione ulcerum, Cap. 12.

De curatione fracturarum, Cap. 13.

PRA-



PRACTICAE GENERALIS:

LIBER VII.

De morborum curatione,

Cap. 1.

Superioribus libris breuiter admodum, & quantum instituto nostro sufficere arbitratum sumus, causarum cognitionem, quae per signa habetur, perstrinximus, nunc reliquum est ut in postremo hoc libro curandorum morborum praecepta tradamus. Itaque curatio id quod *Curatio quilibet perficitur.* praternaturam in corpore est, contrario illius tollit. Contraria enim contrariis curantur. Sunt autem in corpore nostro tria praternaturae, Morbus, Causa, & Symptoma: & morbus quidem sui curationem: causa, sui ablationem, symptoma correctionem postulat. Morbus ille est, qui primo & per se actionem laedit: quare illi ante omnia incubendum, Causa vero morbifica est, ~~et~~ morbum fouet. Quare ante morbum est remouenda. Symptoma post morbi extirpationem corrigatur, nisi vehementia sua Medici curam ad se trahat. Verum cum morborum alij sint partium simularium alij partium instrumentalium: alij utrisque partibus communes, prius de simularium morborum curatione agere instituimus: deinde etiam de reliquis.

De curatione morborum simi-
larium, Cap: 2.*Intemperies
analogous
scilicet.**Intemperies
indications.**ca. 1. 1. 1.**ca. 1. 1. 1.**Intemperies
simpliciter**Intemperies
composita*

Similium partium proprius morbus vitium temperaturæ est. Vitiata igitur temperatura curari debet. Curatio vnam præcipuam, ac communissimam habet intentionem, ad id, quod est dispositioni auferendæ contrarium: indicationes verò habet varias, prout varijs consideratur modis. Quæ namque intemperies causas suas habet antecedentes vel procatarticas, quæ ipsum morbum fouere possunt, prius quam morbus curetur, causa remouenda est, alioqui morbus subinde recrudescet: quæ cum sit & ipsa præternaturam, non nisi contrario suo tolli potest. Quod si verò intemperies causas suas non amplius habeat, totus ad morbum auferendum incumbe. Quare intemperies simplex simplici contrario curanda erit: composita verò, contrario mixtæ facultatis corrigenda. Curabitur enim id, quod ad calidius est conuersum, refrigeratione: quod ad frigidius inclinatum, est, calefactione. Pari modo quod ad siccius est alteratum, humectatione: & quod ad humidius est versum, siccatione. Rursus quoque siccabit pariter, ac calefaciet, quod humidum est redditum & frigidum: siccabit pariter, & refrigerabit, quod humidius simul & calidius euasit, & sic in reliquis

reliquis duabus coniugationibus. Semper enim
 pro eo, quod exuperat inducendum eò usque cō-
 trarium est, quoad particulam in symmetriā, &
 naturalem habitum vindicaueris. Caterum si *Intemperies*
 intemperies materialis fuerit: qualicunque hu-
 mor, vel qualitate, vel quantitate sua peccet, nō
 solū alteranda, sed etiam euacuanda erit, vt se-
 quenti capite docebimus. Porro quantum sit
 agendum indicat morbi quantitas. Refrigerat ū
 quinque gradibus, totidem calidis reducetur.
 Quomodo verò, seu quo instrumento agendum
 sit, indicat morbi qualitas, causarum varietas,
 corporis situs, &c. Quando & quo tempore sit
 agendum, indicat morbi tempus tum vniuer-
 sale, tum particulare. Vbi denique agendum sit,
 locus affectus promptè indicabit. Atque hæc
 quidem omnis ægritudinis, quæ in similaribus
 consistit, methodus medendi existit.

Quantum
agendum.

Quomodo.

Quando.

Vbi.

De tumorum præternaturam cu-
 ratione, Cap. 3.

Tumor præternaturam, incrementum est, na-
 turalem statum in corpore excedens, & læsi-
 onem actionis inducens. Horum differentia ex
 praxi speciali sunt petendæ.

Causæ

Causa verò tumorū, recentioribus medicis & chirurgis geminæ statuūtur generales scil. & speciales. Generales causæ sunt, fluxio, & cōgestio.

Rursus fluxionis causæ quatuor numero constituiuntur. Nempe membri propellentis robur: excipientis imbecillitas: humoris fluentis conditio: & spaciū; per quod fit defluxio.

Caterū fluxio concitatur ratione membri expellentis, vel propter robur facultatis expultricis ipsius, vel propter connexum naturalē, quā habet cum membro excipiēte, vel propter priorum meatuum angustiam.

Pars verò aliqua fluxionem excipit, quia vel dolens, aut calida, vel imbecillior, vel rarior, atque ignobilior, vel in inferiori loco sita.

Porro ratione humoris fit defluxus in aliquā partem, quia sit copia superuacua; qualitate molestus, substantia tenuis.

Spaciū autē fluxionis causā existit, ob meatuum amplitudinem, utpote venarum, artierum, & pororum.

Congestionis verò causæ geminæ assignantur, nempe error virtutis, quæ alteratrix dicitur: & imbecillitas expultricis.

Caterū speciales tumorū causæ, tres vulgò assignantur. Primitiua, quæ & progressa, & euidentes nobis dicuntur: antecedentes: & coniunctæ, siue continentes.

Progres-

Progressæ seu primitiuæ causæ dicuntur, quæ dum aduersam valetudinem seu morbosos affectus creant, separantur, vt casus, percussio, fractura, distensio, luxatio, aut error, qui in victus ratione committitur.

Antecedentes causæ dicuntur, quæ paratæ sunt morbos efficere, vt sunt humores quatuor tam naturales, quàm non naturales.

Causæ verò coniunctæ, seu continentes, sunt materiæ, quæ in particula ipsa laborante aggregatæ, & in fæctæ reperiuntur, quæq; adhuc permanent, postquam tumorem excitarunt: ac dum incrementum tumores ipsi augentur: cum decrescunt, minuuntur: & cum desinunt, finiuntur. Atque hæc de causis tumorum præternaturam dicta sufficiant: nunc postulat ordo, vt eorum signa, & iudicia subijciamus.

Itaq; tumores præternaturæ summa corporis occupantes, iudicio sensus, conspectu, ac manibus contrectata laborante particula, statimprehenduntur. Tumores verò, quæ vera apostemata appellât, tumore, dolore, & calore, magis, vel minus, intensus, dignoscuntur.

Non verò autem præter tumorem, malignitate quoq; & sequestratione etiã maiore, vel minore determinata,prehenduntur.

Sed iam quæ in vniuersum de tumoribus ipsis sumuntur iudicia subijciamus.

Periodi,

398 PRACTICÆ GENERALIS

Periodi, paroxysmi, & crises tumorū, qui præternaturam sunt, humorum, ex quibus constantur, analogiam sequuntur.

Tumores eiusmodi præsertim salubres, & qui ex humorum influxu sunt, quatuor temporibus distinguuntur: principio, agumento, statu & declinatione. Principij nota est, cum pericula incipit distendi, & fluxionis adest initium, cū dolore adhuc exiguo.

Incrementum adest iudicabis, cū videris tumoris molem attolli, locumque affectum impleri, ac symptomata manifestè augeri.

Status verò iudicium est, cū prædicta omnia, tumor scilicet, & symptomata, vigorem suum obtinent, nec amplius possunt incrementum assumere, quin materia faciens tumorem, in alterius generis substantiam degeneret, & transmutetur.

Declinatio autem tunc adest, cognoscitur, cū tumoris moles, & propria ipsius symptomata, imminuuntur: vel materia, qua tumorem facit, in aliam substantiam incipit transmutari.

Porro tumores huiusmodi, qui ex humorum præsertim sunt influxu, nisi fieri prohibeantur, reprimendo materiam influentem, vel sponte, & circa illam manifestam occasionem intrò re-

CURRENTE

currente fluxione deliteſcant, aliquo iſtorum quatuor terminari neceſſum eſt, inſenſibili exhalatione ſeu reſolutione, vel facta ſuppuratione, vel corruptione, vel induratione.

Omniū autem iſtorum modorum optimus iſt eſt, qui per ſenſu imperceptibilem fit diſſolutionem: poſt illum vero, qui per ſuppurationē.

At quæ per indurationem fit terminatio, abſolutè mala dicitur. Quæ autem fit per corruptionem particulæ laborantis, omnium peſſima cenſenda eſt.

Reſolutionis indicia ſunt, leuitas membri, & deficiens pulſatio.

Signa, tumorem verti in ſuppurationē, indicantia ſunt, dolor internus, pulſatio, & caloris incrementum.

Fluxionem viſtricem, eſſe, & particulæ laborantis corruptelam, teſtantur nigror, & liuiditas, quibus nonnunquā & graueolentia accedit.

Tumorem in lapideam abire duritiem, apertè demonſtrat, tumoris imminutio, & cum hac, durities remanens.

Regreſſionis vel deliteſcentiæ nota eſt, ſubſiſta tumoris diminutio, quæ interdum propter nimiam refrigerationem, nonnunquā verò propter venenolitatem accidit. Ad hanc autem ſubitam atque aſſatim factam tumoris imminutionem.

tionem, febris statim consequitur, ac multa alia praua symptomata. Hactenus de signis & iudicijs eorum tumorum, quos vulgò apostemat nuncupant: tempestiuum nunc est, vt ad eorum curationem accedamus.

Principium itaq; curationis tumorum, ex humorum influxu procreatorum, ab inuentione occasionis ipsius affectus, desumemus, vt scilicet quæ eum excitant causæ abscindantur: quòd verò in eo iam factum est, tollatur. Quare ex omnibus his, tres colliguntur recentiorum chirurgicorum turbæ, curandorum tumorum, qui ex defluxione ortum habent, intentiones.

Prima est, fluxionem auertere; ac eam omnino intercipere.

Secunda est dólorem demulcere, atque eam occasionem, propter quam particula fluxionem excipit, vel etiam attrahit, in totum summouere.

Tertia est, totum eum humorem, qui in partem affectam confluit, vacuare.

Quomodo autem prima intentio perfici debeat, appositè docuit Galeus lib 13. methodi medendi, ad hunc modum scribens. Vbi magna sanguinis copia in toto corpore appareat, vt in phlegmonosis tumorib; sæpenumero fieri cōtingit, sanguinis missione succurrim⁹. Curatur etiā plenitu-

lénitudo, tum frequenti balneo, tum exercitatione, tum multa frictione. Præterea digerentius medicamentis, modò febris non adsit, & præter hæc omnia inedia, ac proba victus ratio. Cum verò flava bili, vel atra, pituitaue, aut cerosis humoribus refertum corpus est, purgatione, quæ cuique suppuranti succo sit accommodata, vacuatio molienda est.

Cæterum in contrarium reuulsio, commune est in omnibus huiusmodi tumoribus auxilium, cum fluxio adhuc valenter irruit: utpote in principio morbi, & in augmento. In fine verò status, in ipsa declinatione, dum scilicet iam fluxio cessat, atque in membro inhæsit, & corpus totum abundè vacuatum est: vel ab ipsa, quæ affigitur particula, vel à maximè vicina vacuatio molienda est.

Secunda intentio completur anodynis re-
medijs, item astringentibus, & intercipientibus
fluxionem: Ad hæc relaxantibus naturales me-
as, per quos membrum affectum consuevit
repergari.

Tertiam verò intentionem assequemur, ijs,
quæ materiam, tumorem excitantem à loco af-
fecto euacuant. Euacuatur autem contenta
in loco materia non solum medicamentis
soluentibus, sed etiam repellentibus. Itaque
intercipiuntur tumoribus, qui ex influxu hu-

morum procreantur, magis vtendum est reprimentibus, quàm euaporantibus, nisi tumor eiuſmodi fuerit in emunctorijs: vel materia fuerit venenosa: vel crassa, & repulsioni inobediens, vel vehementer impacta. tunc enim repellere non licet, sed potius discutientibus lenibus ac moderatè calidis, & humidis vtendum. In augmento verò ipsis repellentibus, non nihil eiuſmodi, quæ discutiunt, admiscendum.

At in statu, & paulò ante statum, æquis portionibus miscenda sunt reprimentia discutientibus.

Cùm autem declinatio, vel finis status adfuerit, solis resoluentibus, & relaxantibus vti licebit. Breuiter quandiu humor adhuc affluit, repellendum est: vbi verò iam restitit fluxio, digerendum. Verùm si medio modo res sese habeat mixtis auxilijs vti oportebit.

Porro hæc omnia sanè intelligenda sunt, vt pote si tumor præternaturam resolutione terminari debeat. Auxilia autem, quibus singulas modò dictas intentiones exequimur, pro varia materia tumorem excitante, in praxi specialiter describentur.

De abscessuum curatione,

Cap. 4.

Abscessus, qui Græcis apostemata, & vulgò exitura dicuntur, sunt dispositiones, in quibus abscedunt, atque inuicem distant, quæ prius se contrinebant corpora. Materia enim quæ eiusmodi tumores excitat, extra carnem musculi propulsa, continentia à subiectis diducit, & abscedere facit. Duplex autem est eiusmodi abscessuum genus: Vnum quando inflammatione pus versa, pus ipsum tanquam in sinu aliquo est collectum: alteram cum nulla præcedente inflammatione, humor aliquis, vel spiritus aliquis vaporosus, aut substantia ex utrisque mixta, in parte aliqua colligitur. Quod bifariam accidit. Nam vel in spacio ipso eiusmodi substantia, sine præuia fluxione generatur: aut aliunde in ipsam laborantem particulam confluit. Spatium autem sibi molitur eiusmodi substantia, quæ abscessum creat, vel inter duas tunicas, vel sub quibusdam membranis. Abscessuum vero iudicia, ac signa, quæ vel statim eos futuros denunciant, vel iam præsentem adesse demonstrant, hæc sunt. Cum videris pulsationem, aut duritiem, non longum iam tempus productam, vel caliditatem, aut dolorem incrementem, tunc

404. PRACTICÆ GENERALIS

existima proximum esse, ut apostema in suppurationem vertatur, & fiat abscessus. Cum autem deprehenderis leuitatem quandam affecta particula, & doloris sedationem, ac remissum calorem, quodque tumentis loci pars aliqua cæteris emineat, atque in mucronem subducatur: ad hæc cum premendo digitis velut inundationem perceperis, viderisque gibbi illius seu mucronis colorem iam albescere, tunc iudica, pus eò loci subesse, & tumorem iam abscessisse.

Cæterum in pure ipso cognoscendo, ac diiudicando, maxime te attentum esse oportet.

Quandoquidem suppuratio ipsa seu puris in loco aliquo comprehensi notitia, sapius occultatur, ac Medicum latet, ob loci scilicet, & puris crassitudinem.

De abscessuum autem iudicijs hæc à veteribus, & recentioribus tradita sunt.

Abscessus, qui iuxta membrum aliquod nobilite, vel prope iuncturas sit, atq; adeò in venosis aut nervosis ipsis partib. quiq; in imbecilli particula, & nativo calore propemodum destituta, prædura quoq; & densa cute oblecta, consistit: ad hæc qui crassiore materia, & ad motum tardiore constat: planus etiam, seu æquabilis, & in conii formulam non subductus, suspectus admodum est, ægreque ac tardè maturatur. Qui vero huic ex aduerso responder, boni moris est, & lauda-

laudabilis. Itaq; si abscessus tendit in acutiem, & puris substantia tenuis fuerit, & acris, nec prädura, aut densa cutis extiterit, natura, sua facultate alienorum expultrice, & citra aduentitium aliquod subsidium, conceptum humorem foras propellet, nisi quis facta incisione, protinus ipsam spontaneam apertionem anteuertat. Quæ autem à natura fit apertio, multò tutior est, ea quæ manus opera fit: quòd si arte molienda sit, securius multò, & melius scalpello illam efficies, quàm adurente medicamento, quod ruptorium appellant. Caterum pus optimum illud censetur, quod album, æquale, leueque, & quàm minimè foetidum est. Quod verò huic maxime contrarium apparet, pessimum est. Sed hæc de signis, & iudicijs abscessuum sufficiât. Quod ad eorum curationem attinet, ea per initia præstatur per mitigatoria auxilia, quæ Græci chalafrica vocant, id est, relaxantia, cuiusmodi est tetrapharmacum, molle quidem, & anodynum.

Procedente verò tempore, ad ea, quæ concoquendi, seu maturandi, ac suppurandi vim habent, transeundum est. Auxilia autem quibus mouere pus expedit, ex libro quarto perenda sunt.

Però suppurato iam abscessu, aut transmutato, vel valenter impacto, si pus, aut alia quæuis materia ibi contenta non discutatur, vel si tem-

406 PRACTICÆ GENERALIS

pore conuenienti, & dum iam tempeſtiua adeſt
occafio, citra manus operam, nō aperiatur, ſeca-
re exitum ei, quod digeſtioni non ceſſit, opor-
tet. Communiter autem eiufmodi tumores ſcal-
pello inciduntur. Apertio verò ipſa, pro ratione
tum copię materię ibi collectę: tum etiā ipſius
loci affecti, fieri debet. Fiunt autem huiufmodi
ſectiones, myrtaceum foliū imitantes, in ijs po-
tiſſimū tumoribus, qui in axillis, & bubonibus
ſuppurant. Et in ijs quidē longitudo per trāſuer-
ſum ducta eſſe debet, non aut per cruris, aut cor-
poris rectitudinem. In alijs verò locis incifione
ſimplici ferē ſemper vtimur. In ipſa aut apertio-
ne, ſiue incifione, ſeptē potiſſimū ſunt attēdēda.

Primum, vt ſectio fiat eo loco, quo materia
contineatur.

Secundum, vt fiat in loco inferiori, quò me-
lius purulenta illa vacuari poſſint.

Tertium, vt fiat ſecundum rugas, & proceſ-
ſum muſculorum.

Quartum, vt vitentur nerui, venę, & arterię,
quoad fieri poterit.

Quintum, vt non tota materia ſemel, atque
affatim educatur, præſertim in magnis abſceſſi-
bus, ne ſcilicet ex nimia ſubitaq; inanitione, &
ſpirituū reſolutione, virtutis ſequatur ꝑſtratio.

Sextum, vt blandius, & minimo quā fieri
potest, dolore, locus tractetur.

Septimum, vt facta aptione, locus detergeatur, carne impleatur, & ad cicatricem perducat. Auxilia autem deterforia accommodata, sunt mollia tomenta, vel lintea, concerpta linimenta, emplaftra, & vnguenta, quæ in speciali praxi censentur. Primis diebus sufficit vitellus oui alumine Zuccharino inspissatus. Postea verò deueniendum est ad mel rosatū, & mūdificatiuum ex apio: & postremò, ad vnguentū Apostolorū, & Aegyptiacum, si res ita desideret. Supra verò admouenda vnguenta, basilicum, diachylum, & diaphoenicū vulgò nūcupatū, atq; alia id genus, quæ ad vlcera instituuntur. Sed & mitigare prius incisam partē, quātū poscere videbitur, oportebit: fomentis primū, deinde cataplasmatibus, mox humectante aliquo medicamento, aut non siccatē, singulis scilicet extrinsecus impositis. Nam in ipso vlcere tum manna, tū ex præsijs, quæ lintulis excipiūtur, primū quidē ea, quæ pus mouent, deinde ea, quæ expurgant, sunt imponēda. Post quæ si cauitas etiam maneat, quæ impleant, adhibenda sunt: sin aliter ea, quæ cicatricē inducunt. Porro si laborans, scalpello sectionem fieri præ mollietie, non admiserit, medicamentis adurentibus erit emolliēda aptione. Ad hoc autē conducit semē lini, fermentū, & sterco columbinum. Hæc præstantiora efficies, si cum sapone molli, aut mucagine seminis sinapis miscueris.

Quod verò ex calce; & sapone fit ruptorium, in hac re principatum obtinet.

*De curatione morborum instrumenta-
lium, præsertim in confirmatione,
secundum figuram vitia-
tam, Cap. 5.*

POst morborum simularium curationem, succedunt morbi in compositione vitia-
ta, quarum Instrumentalium partium propria est. Verum
cum variæ sint compositionis differentiæ, pri-
mum de ijs morbis agemus, qui conformatio-
nem vitiant. Hæc autem in cavitate superficie,
potissimum verò in figura posita est. Membri
itaque figura vitatur, vel in utero matris, vel post
generationem, à causa aliqua vel interna, vel
externa, ut Medico, vel obstetrice. Quod in ute-
ro matris vitiatum est membrum, ante augmen-
ti finem, cum corpora adhuc crescunt, emenda-
ri potest, in aliquibus partibus, non in omnibus.
Verbi gratia vari quidam, aut valgi: post augmen-
tum verò corrigi nequit, præsertim cum iam ob-
duruerunt membra. Quod verò ab obstetricis, vel
chirurgi incuria, os fractum malè coaluit, ita ut
figura sit vitia-
& intorta: & siquidem callus
obductus fuerit recens, corrigi potest, si os de-
nuò

nuò perfringatur, & tum demum per cōuenientis calli superinductionē curetur. Si verò callus obductus fuerit antiquus, & inueteratus, morbus erit desperatus.

Porro pro curatione vitiatæ figuræ, tres nobis intentiones considerandæ erunt: quid scilicet sit agendum: quibus instrumentis: & vbi sit agendum.

Quid sit agendum, indicabit morbi natura. Conformatio secundum figuram vitiata est. Restituenda ergo, siue curanda suo contrario: hoc est, contraria figura ei, quæ nunc est, molienda erit, ut à figura non naturali in naturalem commutetur siue transferatur.

Quibus autem instrumentis figura vitiata corrigatur, ars chirurgica docebit: utpote ligaturis, ferulis, puluillis, vinculis, frictionibus, &c.

Vbi verò sit agendum, locus affectus indicabit, qui sensui oculorum subiicitur.

*De curatione morborum in composi-
tione, secundum cavitatem viti-
tam, Cap. 6.*

Cavitates vitiantur, quia vacuum tollitur. Tollitur verò obstructione, vel angustia, à quibus actio immediate læditur. Fit autem obstructio à materia aliqua replente. Angustia ve-

410 PRACTICÆ GENERALIS

rò in eatuū à materia distendente. Curantur cō-
trario: angustia quidem dilatante: obstructi-
verò aperiente aliquo. Sic ergo quinque nobis
indicationes sunt perpendendæ: videlicet Quid
sit agendum: Quantum sit agendum: Quomo-
do: Quando: & Vbi.

Prima indicatio præcipua est. Quoniā à mor-
bi causis sumitur: atq; ad illam reliquæ quatuor
indicationes veluti famulæ referuntur. Cavitas
enim necessariò à materia aliqua obstruitur, aut
repletur. Qualiscunq; ea fuerit, auferenda est, vt
ad naturalem habitum pars affecta redeat. Hoc
autem fiet, si id quod obstruit, remoueatur per
euacuationē, & educationē extra corpus. Vt lapis
in vesica per sectionē aufertur: stercus durum,
intestina obstruens, pharmaco leniēte educitur.

Quantum autem sit agendum, indicabit no-
bis, virtus, ætas, anni tempus, morbi natura, &
causa, &c.

Quomodo verò, quibus instrumentis agen-
dum sit, indicabit nobis tum causa morbi, an vi-
delicet pharmaco, an phlebotomia commodius
educi queat: tum pars affecta. Intestina namque
tum per clysteres, tum ijs, quæ per os sumuntur,
euacuari possunt. Vterus verò pessis, & clysmat-
ibus. Caput apophlegmatissimis, & errhinis: tho-
rax eligmatis: renes, & vesica, diureticis, &c.

Porrox tempus oportunum agendi erit, cū

nihil

nihil impedit actionem istam, nec ratione materiae nec ratione viarum. Vt si materia fuerit crassa, prius incidenda: viscida detergenda: bitis acrimonia prius retundenda: sterminus durum prius emolliendum: viae, per quas educenda est materia, prius lubricandae: obstructae, prius aperandae, &c.

Per quas autem vias, materia sit educenda, anatomie ipsa nobis demonstrabit. Nam cerebrum per nares, & os purgatur: ventriculus vomitu, & ecesu: thorax, & pulmo, tussi: intestina per secessum: hepar, & renes, per urinam: lien, per haemorrhoides: cutis, per sectionem, per cauteria, &c. Atque haec de obstructione in vniuersum nobis sufficiant.

De curatione morborum, in compositione, ex superficie aspera, & le-

ui, Cap. 7.

Quemadmodum superficies partis instrumentalis, vel levis, vel aspera, pro membri prius usu, à natura primum conformata est, ita quoque vitatur, & praternaturam efficitur superficies ista, quia vel mutatur naturalis illius leuitas, vel asperitas.

Causae asperitatis sunt vel internae, vel externae. Internae causae sunt humores acres, & erodentes

edentes, qui cuticulam exteriorē imperforantes, illam erodunt. Potest itidem melancholicus, & adustus, aut pituitosus & falsus aliquis humor ad cutim protrudi, vt in senib. fieri videre licet, qui idcirco scabie frequenter laborant: præterea in ijs, qui elephantia tenentur. Interdum à capite in pulmones huiusmodi humores destillant, atque sic guttur, & asperam arteriam exasperant.

Externæ causæ sunt, medicamenta abstergentia, erodentia, & astringentia, puluis, fumus, secantia, frangentia, &c. Leuitatis verò causæ sunt, humor pinguis, vel viscosus.

Signa manifesta sunt, cum oculis & tactu deprehendantur.

Iudicia verò ab ipsa parte affecta sumuntur. Siquidem in osse caries periculosior: & ob id difficilius, quàm in cute asperitas curatur.

Quod ad curationem attinet, curatiuæ eliciendæ sunt indicationes, vt sciamus tum Quid sit agendum: tum Quomodo seu quibus instrumentis curatio sit aggredienda: tum Quantum Quando: & vbi sit agendum. In asperitate itaq; Quid faciendum sit indicat primò morbica causa: deinde morbus ipse. Morbi causa, siue interna, siue externa fuerit, indicat sui ablationem. Morbus verò ipse, indicat nobis, id quod exasperatum est, esse denuò leniendum.

Quo-

Quomodo autem, seu quibus instrumentis sit agendum, nobis ostendet particula affecta, & morbi causa. Siquidem cutis ab astringentibus aspera reddita, tollitur ijs, quæ eam laxare, & tenacitatem frigiditatem leuiter remittere possunt, qualia sunt oleosa, & pingua omnia. Humore uero acri, vel erodente inæqualis facta, qualifcunque is fuerit, per pharmacum conueniens auferendus erit: deinde cutis asperitas, per lotiones, vel munctiones, remouenda. Sic os, quod ex vulnere, aut fractura inæquale, aut ab humore acri cariosum est redditum, abradendum erit. Ad eundem modum aspera arteria lenienda erit medicamentis liquidis, quæ non mordeant, sed lentorem habeant, &c.

Porro Quantum sit agendum, indicabit morbi ipsius magnitudo, deinde etiam affecti loci natura, prout magis, vel minus leuis pars antea erat.

Quando uero agere oporteat, indicabit morbi causa, & instrumenti qualitas. Siquidem morborum causæ semper prius auferendæ erunt: deinde topica administranda. Sic lotionibus, balneis, sudoribus, frictionibus, &c. ante cibum uendum erit.

Vbi denique sit agendum, oculorum sensus demonstrabit, in parte scilicet affecta.

Ceterum interdum naturalis superficiei asperitas:

414 PRACTICÆ GENERALIS

ritas vitiat, & levis fit, ab ijs, quæ leuitatem non naturalem inducere possunt: cuiusmodi sunt humores viscosi, & pingua omnia. Pro huius curatione, Quid agendum sit; constat: videlicet causas prius esse auferendas: deinde id quod lenigarum est, denuò esse exasperandum. Hoc quidem ijs fieri poterit remedijs, quæ leuiter incidant, & detergeant. Reliquæ indicationes à præcedentibus fontibus perantur.

De curatione morborum in compositione, secundum numerum,

Cap. 8.

IN numero morbus accidit, cum pars instrumentalis, vel integra & tota, vel aliqua illius particula, deficit, aut excedit numero.

Quod numero superabundat, vel Secundum naturam est, vel præternaturam. Secundum naturam est sextus digitus: caput geminum, &c. Præternaturam vero, ut calculus in vesica, lumbrici in intestinis: varicæ, tuberculæ, pterygion in oculo, &c.

Causæ numeri superabundantis, & quidem naturalis, utilis materiæ multitudo est: præternaturalis verò, inutilis materiæ copia.

Causæ numeri deficientis, sunt, vel vstio, refectio, putrefactio, vel refrigeratio.

Signa

Signa numeri abundantis, vel deficientis manifesta sunt.

Iudicia verò, ab ipsius morbi & particulæ affectæ naturæ, & tempore sumuntur. Caput enim geminum citra vitæ periculum curari nequit: suffusio, citra oculi lationem vix adimitur. Pars, quæ à primo ortu deficit, restitui nequit. Ad eundem modum spermaticæ partes non restituuntur verè, sed substantia diuersi generis, quam callum vocant.

Quod ad curationem attinet, ea secundum indicationes suas dirigenda est. Quare in numero abundante, Quid sit agendum, morbus indicat. Numerus superadditus est: itaque suo contrario tollitur, ablatione videlicet, quæ prima est, & potissima intentio in hoc morbo.

Quomodo verò, seu quibus instrumentis auferenda sit pars, ferro, igne, an caustico, docebit particulæ naturæ, & dignitas. Vbi sit agendum, partis affectæ constructio indicabit.

Porro numerus deficiens, siue integra pars, siue partis particula fuerit, restituenda est. Restituitur autem pars, & quidem carnosa, per substantiam similem: spermatica verò per ea, quæ callum generant.

De curatione morborum in compositione, secundum magnitudinem,

Cap. 9.

Magnitudo partis, interdum præter modum naturæ à prima generatione increfcit, vel minuitur, vt actionem impediat. Nonnunquam post ortum animalis augetur plurimum, vt in priapismo, carne supercrescente vlcerum: mammis, & testiculis auctis videre licet: interdum verò minuitur, vt in tabe, atrophia, phthisi oculorum, &c.

Causæ autem, ob quas partes augentur, sunt vtiles materiæ multitudo, vel virtus valida. Imminutæ verò magnitudinis, vtiles materiæ defectus, vel virtus imbecilla.

Signa visui manifesta sunt.

Iudicia verò à morbi tempore desumuntur. Nam quæ à prima generatione plurimum auctæ videntur partes, vel imminutæ, diuque ita permanferint, curationem non recipiunt: quæ verò post animalis ortum originem traxerūt, magnitudines, vel imminutiones, curari aliqua ex parte possunt. Porro similes ferè habent intentiones curatiuas, morbus in magnitudine, & numero vitiat. Vtrobique enim est vel excessus, vel defectus: quare etiam vel additio, vel ablatio.

Differe-

Differunt tantum, quod in numero aucto interdum tota pars auferenda est: at in quantitate aucta nunquam tota pars, sed id tantum, quod in parte redundat. Sic ergo in magnitudine aucta indicationes eliciendæ sunt: Quid videlicet agendum sit: Quantum: Quomodo, seu quibus instrumentis: Quando: & Vbi.

Prima, & præcipua intentio est Ablatio: quæ eadem quoque erat in numero aucto.

Porro quantum sit auferendum, indicabit partis magnitudo naturalis.

Quomodo verò, Quando, & Vbi, partis atque morbi natura demonstrabit.

Cæterum magnitudo partis imminuta est. Reficienda igitur est, per generationem similis, aut certè dissimilis substantiæ. Cuius eadem est ratio, & idem medicamentorum usus, quæ etiam in numero erant deficiente.

De curatione luxationum, Cap. 10.

Luxatio inter morbos compositionis refertur: quoniã situs mutatus est. Luxatio enim est articuli è nativo positu, seu proprio acetabulo, in alienam, atque insolitam sedem prolapsus, quo motus arbitrarius impeditur: Græci exarthrema vocant.

Causæ luxatorum ossium, sunt vel intrinsecæ, vel extrinsecæ. Extrinsecæ sunt casus, percussio,

Dd

& vio-

& violenta, atque incongrua membri alicuius extensio, aut distortio, seu peruersio. Interni sunt, vt cū mucosus aliquis humor, & pituitosus, in articulis, seu iuncturis aceruat, qui articulationis ipsius ligamenta primū in adefacit, deinde laxiora reddit, & tandem ob eius multitudinem, sua sede os ipsum protrudit.

Signa sunt, tumor ea parte, qua os prorumpit, & sinus, seu cavitās insolita ea, à qua recessit dolor: motus priuatio aut difficultas, &c.

An verò curari valeat, indicabit nobis pars affecta: symptomata: ætas: & tempus. Nam caput si in posteriorem partem prolabitur (vt inquit Celsus) nunquam in suos sinus compellitur, sed mortem statim adfert inēuitabilem. Sic neque in spina vertebræ cū toto loco mutatae sunt: neque etiam maxilla, quæ vtraque parte prolapsa est, & antequam reposita sit, inflammationem concirauit. Genu vt facile prolabitur, sic non magno impendio in suam rursus sedem compellitur. Digitorum luxatio nullum etiam facessit negotium. Cubitus verò vt tardius quidem, ac difficiliter excidit, ita prolapsus negotij plurimum exhibet. Humerus autem, vt neque difficulter admodum præsertim in macilentis, elabatur, sic nec difficillimè in sedē suam reponitur. Porro quibus luxationibus inflammatio, aut vulnus, aut dolor ingens, & acris accedit,

cedit, hæ præterquam quòd curatu admodum
difficiles sunt, periculo quoque non vacant. Lu-
xatio præterea, in qua ossium margines frāgun-
tur, pessima iudicatur. Articuli qui neruorum, ac
ligamentorum vitio prolapsi sunt, & postea in
suas sedes repulsi, iterum excidūt. Quæ loco suo
non sunt, caro ea increscit, magisque in proxi-
mo membro, quàm in vltiore. Quibus in pue-
ritia articuli exciderunt, neque repositi sunt,
minus, quàm cæteri crescunt.

Vetustæ omnes luxationes, & quæ spatio tem-
poris iam callo obduruerunt, vel difficillimè,
vel nunquam consanescunt. Proinde statim, si
fieri potest, reponi luxata debent.

Indicium autem evidens ossis in suam natu-
ralem sedem reducti, est, cum veluti strepitus a-
liquis auditus est, dum in natium suum aceta-
bulum ingrediebatur: & membri nuper luxati
figura, & conformatio, suæ ipsius, aut alterius
paris figuræ, quàm similima tum visu, tum atti-
ctu deprehenditur.

Quod verò ad curationem attinet, tres luxa-
tionis intentiones curatiuæ nobis occurrunt.

Prima, luxati articuli in naturalem sedem re-
ductio. Secunda, conseruatio articuli in suâ sede,
ne amplius excidat. Tertia, symptomatum cor-
rectio, quæ impediunt scopos prædictos, siue an-
te repositionem ossis, siue post repositio-

nem accidant. Porro vt scopum, seu intentionem primam assequaris, luxatum membrum in diuersas partes decenter extendendum est, donec spatium inter ossa liberum sit. Tum id os, quod suo loco excidit, ab ea parte, in quam prolapsum est, in contrariam impellere oportet, atque ita in germanum suum acetabulum restituere: vt sinus seu cavitatis insolita vacuitas impleatur. Hæc autem leniter, & sine dolore, quatenus fieri licet, agenda sunt. Cæterum non vna eademq; in omnibus extendendi ratio est: sed alia atque alia pro natura scilicet partis luxatæ, prout nerui, ac tendines valent, aut ossa huc illucue federunt. Modo enim manibus solis, modo habenis iniectis vtendum est, modo verò quædam alia machinamenta adhibenda sunt, vt ex vno Hippocrate discere poteris.

Secundus scopus est, vt membrum, quod exciderat, & iam repositum est, non amplius deinceps sua sede plabatur, sed inibi præstet. Repositi igitur articuli iunctura, modis omnib. statim firmada ac roboranda est. Firmabitur aut optime, si rosaceo perlinatur, ac postea pannus aliquis lineus gracilis, vetus, & lenis rhodino delibutus, ipsi applicetur: deinde si stupæ lenes, ac panni multiplices, ouorum candido perfusi, super accommodentur, & postremo, si fascijs posca madentibus, pro ratione particula lōgis latisq; subligen-

subligetur. Quinetiam ferula ex corio, aut densa papyro facta, si necessitas requiret, circumdanda sunt. Nec verò ante diem septimum, aut decimum, ipsum resolvere oportet, sed ita sinere.

Porro luxato in suam sedem reposito, ipsum à dolore, & inflammatione vindicandum est: qui tertius est scopus in curandis luxatis, medenti propositus. Hunc igitur consequeris, si quæ roborant & repellunt, parti luxata adposueris: si præterea tenuem ab initio probamque victus rationem agro imperaueris, illique venam, si nihil prohibeat, secueris: & ventrem, si opus est, purgante medicamento subdlexeris. Verum si ante quàm ad curationem, voceris luxata pars iam dolore infestetur, aut inflammatione occupetur, non priùs eam in locum suum, à quo excidit, reponere tentabis, quàm dolor finitus fuerit, & inflammatio conquieverit. Caterùm si luxatis ossibus vulnus quoque accessit, multa diligentia opus est. Si verò cum fractura luxatio euenierit, hæc primùm si fieri possit: illa verò secundò curanda erit. At si ante fracturæ administrationem luxatum commodè reduci non possit, fracturam ipsam primùm curabimus, deinde cùm fractura callo iam obfirmata fuerit, luxationis Curationem aggrediemur. Quod si luxatio inueterauerit, & callosa inibi durities contracta fuerit, ea decocto malue & altheæ perfundenda

denda est: deinde vnguento dialthea collinenda: post hæc emplastrum diachylon super apponendum erit: vel eius loco lana succida mucilagine quapiam emolliente delibuta: vel id genus alia emollientia. Loco verò sufficienter emollito, luxatum in suam sedem dandum est.

De curatione vulnerum, Cap. 11.

HAtenus de morborum simularium, & instrumentalium curatione: reliquum est, ut quomodo soluta vnitas sit curanda, doceamus, initium à vulneribus sumentes. Itaque vulnus solutio est continuitatis, recens, cruenta, sine pure, in particulis mollioribus extrinsecus incidens. Continui autem solutio, morbus communis est tum partibus simularibus tum instrumentalibus: primò tamen ac magis propriè simularibus partibus conuenit, atque attribuitur, quàm compositis.

Causæ verò recentium vulnerum sunt, quæcunque extrinsecus aduentitia vulnerare, perforare, incidere, abrumpere, contundere, ac distendere possunt: cuiusmodi sunt, ensis, baculum, lapis, globulus plumbeus vel ferreus, tela, sagitta, morsura, &c.

Signa vulnerum non aliunde petenda sunt, quàm ex iudicio sensus, sed visus maximè.

Iudicia verò, seu signa prognostica, desumuntur ex

tur ex substantia, usu, atque actione affecta cuiusque particula. Et præterea ex propria ipsius affectus essentia: item ex symptomatis, quæ vulneribus ipsis accidunt. Sunt enim quædam læthalia ex necessitate, quædam verò non ex necessitate, sed magna ex parte talia esse cõsueverunt: contrà verò quædã omnino sanabilia: quædam vt plurimum. Ex necessitate læthalia sunt, quæ cordis substantiam penetrant: item vulnera magna, ac profunda substantiæ cerebri, iecinoris, diaphragmatis, stomachi, ventriculi, asperæ arteriæ, pulmonis, lienis, cystis, fellis, renum, & tenuium intestinorum. Vulnera verò ea, non ex necessitate, sed secundum plurimũ mortalia dicuntur, quæ ad regionem prædictarum partium perueniunt, vel eas leuiter ac superficialiter duntaxat attingunt, non autem præalè adiguntur, nec affatu digna sunt. Ad hæc quæ in capite musculorum accepta fuerũt, Spasmus ex vulnere, læthalis est, id est, valde periculosus. Membra autem particularia ex accepto vulnere iudicantur emortua, quando principes, ac maiores venæ, arteriæ quoque & ossa, a quibus vitam, nutricationem, & sulcimentũ accipiebant, penitus excisa sunt, & destructa. Iudicantur itidem membra ad vsum à natura institutum fore inepta, & perpetuò impotentia, quando nerui, tendones, & ligamenta penitus sunt abscissa, &

424 PRACTICÆ GENERALIS

destructa: suamque, protinus actionem perdunt.

Porro vulnera ea omnium tutissima sunt, quæ in boni succi corporibus, & in locis carnosissimis accepta sunt, ubi & nervi pauci, & venæ, & arteriæ non multæ reperiuntur. Ad hæc quæ diuisionis magnitudinem non habent. Vulnera autem, quæ ut plurimum sanabilia dicuntur, mediâque inter duo dicta extrema (nempe omnino sanabilia, & ex necessitate lethalia) naturam sortiuntur, ea sunt, quæ in capite musculorum carnosorum longè à iuncturis & temporibus: item quæ in caluaria, thorace, & ventre incidunt, &c.

Cæterum vulneris communis curandi indicatio, vnio est. Contraria enim contrarijs curantur. Hæc autem prima ac generalis indicatio perficitur partim à natura, partim à Medico, partim ab vtrisque. Sic ergo ut propositum finem assequamur, quinque nobis intentiones obseruandæ sunt,

Prima, ut ea, quæ vnionem impediunt prius amoueamus.

Secunda, ut solita vnitas reficiatur, seu colligatur.

Tertia, ut ea in vnum iam commissa, & coacta ita conseruemus.

Quarta, ut ipsam partis læsæ substantiam tueamur, ac salubrem seruemus.

Quinta,

Quinta, vt accidentia; vulneribus succedere consueta, corrigamus, ac propulsemus.

Primam intentionem assequemur dilatando vulnus, si non satis dehiscat, aut si eius labris aliquid intercidat extraneum, vtpote pili, sordes, vel ossis particula aliqua pungens, & aspera, aut telum aliquod infixum, vt sagitta: vel mucro, vel aliquod aliud extrinsecus incidens, cuiusmodi est spina, vel harundo. Atque vbi satis diducta fuerint labra vulneris, digitis aut volsella, vel forcipe, aut alio id genus instrumento, quod infixum est, aut labris vulneris intercidit, apprehendi debebit, & leuiter, ac (si fieri possit) citra dolorem euelli.

Secundam intentionem in curandis vulneribus (quæ est commissio dissidentium, seu distantium partium coniunctio) assequimur per orarum adductionem, seu labiorum vulneris inuicem distantium attractionem, & applicationem, membrum ipsum læsum quam fieri poterit lenissimè tractando. Quæ autem diducta sunt in idem adducuntur, aut fascia sola, orbiculatim circumdata, præsertim si vulnus fuerit paruum: sin magnum, aut suturis, aut fibulis opus est, impositis simul glutinatorijs remedijs. Huc etiam puluilli possunt referri. Quomodo autem vulneris sutura, deligaturaq; item puluillorum applicatio, fibularumq; affigatio sit perficienda, lib. 6. cap. 7.

9. II. & 14. dictum est. Facta hac coniunctione laborum à Medico, natura ipsa per se coalitum, & conglutinationem molitur, expellitq; per pus ea, quæ obstant. In actione enim chirurgica manifestè mutua opera chirurgi & naturæ conspicitur: in reliquis duobus instrumentis, in diæta videlicet & pharmacia, non item. Quoniam nō pure agentes sunt causæ, sed patientes quoque, & primā sui ratione opus habēt naturæ auxilio.

Tertius scopus, qui in curando simplici vulnere chirurgus proponitur, est, vt diductorum ora, ita vt in vnum per adductionem coniuncta sunt, conseruentur, & maneant. Conseruatur autem, si rantis per labia vulneris coniuncta seruetur arte, donec natura cōglutinauerit. Terminus huius cōglutinationis incertus est, p diuersitate partium, temperaturarum, regionum, constitutionis anni & aeris, omnium deniq; causarum, tam externarum, quàm internarum, quæ morbū vel fouere, vel augere possunt. Conseruabuntur autē optimè huiusmodi extrema, quæ in vnum coacta sunt, iisdem ferè auxilijs, quibus & in idē adducta sunt: nempe decenti ligatione, appositione mēbri situ, & suturis, si necessaria videbūtur.

Quarta intentio est, particulā laxā substantiam conseruare ac prohibere ne ipsa dolore, vel phlegmone, aut aliquo alio prauo symptomate infesteretur. Hunc autem scopum assequemur, si
primum

primum dolorē partis mitigemus, calorē partis
restringamus, ne humores attrahantur: secūdo, vt
plenitudinē tollam⁹, vt vitiosos humores purge
mus, ne humores trāsmittantur. Hac ratione fiet,
vt cū nullū terminū habeat humor, nec à quo
fluat, nec ad quē fluat, fluxio omnino tollatur,
& proinde partis rēperatura conseruetur. Dolo
rem autem partis mitigabimus, caloremq; par
tis restringemus emplastris, & linamentis ex o
ui candido, & alijs huiusmodi refrigerantibus
primis saltem diebus. Postea verò vino styptico
particula perfundēda, & figura aptissima collo
canda est. Sed & proba victus ratio in primis est
obseruanda, si quartū hunc scopū cupis assequi.

Quinta & postrema intentio est, vt omnia ea,
quæ post factam vnionem superuenire possunt
symptomata, tam in toto, quam in parte vulne
rata, siue a principio statim, siue post comitētur,
ex affluxu nimirum alicuius humoris: quem natu
ra ad partem vulneratā expellit, vel è contrā
à parte vulnerata in reliquum corpus, & ad par
tem aliquā principem propellit, remoueamus.
Symptomata autem, quæ consueuerunt eueni
re post accepta vulnera, hæc ferè sunt: Dolor,
phlegmone, febris pruri⁹, cōuulsio, paralyfis,
syncope, delirium, duntis, & impotentia mem
bri vulperati. Nisi enim symptomata ista prius
abigantur, vulnus rectè curari nequit. Sympto
mata

mata enim, quæ magnitudine superant suas causas, ordinem curationis sæpe peruertunt, immutant, atque interpellant. Abiguntur autem triplici instrumento, diæta, pharmacia, chirurgia, vel omnibus simul, vel certè aliquibus. Porro compositorum morborum (ex solutione vnitatis, & cõpositione vitiata, & ex cõpositione, vnitatis, & temperie) curatio, ex simplicium morborum curatione elici poterit.

De curatione vlcærum, Cap 12.

PRæcedēti capite de cruentorum vulnerum, quæ in carnosa parte sũt, curatione dixim⁹, nunc transeundum ad id vnionis diuortium, quod nec recens est, nec cruentum: sed iam inueteratum, & in quo vna, vel plures consistunt dispositiones, quæ vnionem remorantur, atque impediunt, ex quibus saniosa, & purulenta quædam colluies, putredoque excitatur. Vocant autem vulgares chirurgi talem vnionis solutionem, communiter vlcus. Horum causas in vniuersum geminas chirurgi statuunt: nempe antecedentes, & cõiunctas. Antecedentes vlcærum causæ sunt, cacochymia, id est, succorũ vitiũ, quod corporis ipsius particulas arrodere, & tandem corrumpere possit. Causæ verò coniunctæ sunt, intemperies illæ quas malignas complexionum vocant, in vulne-

ratis

ratas particulas, ex causis antecedentibus vel etiam ex ipsis vulneribus aut abscessibus, aliisque praternaturam tumoribus, ruptis, & apertis, excitata.

Porro vlcera quæcunque diuturniora sunt, os abscedere necessariū est, & cicatrices cauas fieri. Vlcers dura mala iudicantur, & quæ ad virorem, aut nigritiem vergunt. Vlcers, quæ alijs morbis succedunt agrè sanabilia sunt. Vlcers circumglabra prana sunt. Vlcers, in quibus post longam saniei fluxionē, pus laudabile apparere incipit, bonū nobis portēdūt. Vlcers, quæ in extremitatibus musculorū dorsi, vel tibiārū, aut brachiorum sunt, periculo non vacant. Quibus vlceribus ante absolutam deterfionem sarcotica medicamenta administrantur, mala, ac superflua caro in illis generatur. Quæcunque verò probè, & oportune expurgata semper ad siccius promouentur, his caro magna ex parte non supercrescit. Vlcers in orbem circumducta, pessima esse solent, ac tardè magnoque negotio ad cicatricem perducuntur. Artuum siue extremarum partium vlcers, sæpenumero phlegmonas in adenosis partibus accersunt. Cū medicamēta vlceribus adhibita conferunt, argumentum est, ea ritè administrata esse: cum verò noxæ aliquid adferūt, & vlcus humidius reddunt, aut siccius, calidius, aut frigidius, indicium est, ea non esse præsentī

430^m PRACTICÆ GENERALIS

præsenti morbo idonea. Cæterum si vlcus eroditur, & profundius efficitur, sedulo aduertendum est, num id ex acrimie succorum vitio, & vlceris malignitate accadat, an ex facultate medicamentorum. Porro inter cætera, quæ magis efficiunt vlceribus, ventus est meridionalis, atque aeris ambientis humiditas caliditati adiuncta. Cæterum in vlcerum curatione duo nobis spectanda proponuntur, nempe ipsius vlceris, quâ vlcus est contemplatio, & vlceris cum sua causa, aut symptomate aliquo, aut alia quavis dispositione complicati, aut etiam hanc, vel illam occupantis consideratio. Sic ergo quatuor curandi intentiones erunt.

Prima vitæ rationem, sanandis eiusmodi vlceribus accommodatam, præscribit.

Secunda, materiam antecedentem, auertit, & intercept.

Tertia symptomata, & dispositiones, quæ cum vlceribus complicantur, corrigit.

Quarta correctis, & profligatis ijs dispositionibus, quibus vlcera complicantur, ea more vulnerum concavorum sanare præcipit.

Primam autem & secundam intentionem assequimur, humores, copia aut praua qualitate noxios, tum corrigendo tum vacuando & auertendo, fluxionemque istam interceptiendo. Porro auxilia quibus commodè succorum abundanti-

tiam,

tiam & vitium tollimus, corrigimus atque auer-
timus, sunt venæ sectio, purgatio, proba victus
ratio, cauterium, vomitio, & id genus alia. Flu-
xiones vero intercipimus ligaturis, perfusioni-
bus, & epithematis: item vnguentis ex bolo Ar-
meno, atque alijs refrigerantibus, atque astringen-
tibus. Deligatio verò inchoanda est, à labo-
rante ipsa particula, deducendaque versus sa-
liam. Tertia intentio, quæ symptomata, & di-
positiones, quæ cum vlcere complicantur, cor-
rigit ac summovet, perficitur prout cuiusque
symptomatis, & affectus cum vlcere complicati
natura requirit, ac desiderat.

De curatione fracturarum, Cap. 13.

Q Vandoquidem duobus præcedentibus ca-
pitibus de continuitatis solutione, quæ in
carnosis & mollioribus corporis partibus acci-
dit, abundè satis dictum est, ordo iam postulat,
ut de solutione continui, quæ ossibus contingit,
hoc est, fracturis, disseramus. Est enim fractura,
unionis solutio quæcunque in osse, quam Græ-
ci catagma vocant. Fracturarum autem alia est
transversalis: alia per longitudinem, quæ fissura
dicitur.

Causæ verò fracturarum sunt omnia ea, quæ
contundere, vel dividere ossa possunt.

Signa

432 PRACTICÆ GENERALIS

Signa autem ossi fracti, & præsertim per transversum atque in artubus, hæc ferè sunt.

Tactu ossis partes disiunctæ separatæque, ac variæ reperiuntur, membri figura inæqualis percipitur: dum membrum dimouetur, & manu variè tractatur, ossa colliduntur, & veluti crepitus quidam ex ea collisione auditur. Pars affecta cōtacta dolet, corpus membro fracto haudquam inniti potest: causæ quæ frangunt, aut contūdunt, præcesserunt. In ossè verò, quod per longitudinem fractum est, substantia eius crassities non naturalis tactu percipitur: cætera signa nō adsunt præterquā quod dolor, & inæqualitas iudicio sensus etiā deprehenduntur. Prognostica ab ipsa particula affecta, morbo, symptomatibus, ætate & tēpore sumūtur. Ossa siquidē minimè periculosè media frāgūtur in humeris, brachijs, femoribus, cruribus & digitis. Si tota cōsta p̄fracta est, casus asperior est. Nariū fractura peior est, vbi aut ossi, aut cartilagini fracta, cutis quoq; vuln⁹ accessit. Cranei fractura malū portēdit. Fractura trāsuerſa maximè tolerabilis est. Obliqua peior: acuta verò pessima existit. Fractura cum dolore, vel inflammatione, aut carnis contusione, mala est. Fractura senibus inprimis, biliosis, conualescētibus difficillima est: decrepitis verò, & valde senibus, impossibilis. Porro fractura quò vetustior, eo deterior est. Caluaria

35. diebus glutinatur brachium, & tibia, si rite
curètur, diebus circiter 40. coalescunt: cubitus
firmatur plurimum diebus 30. os in naribus per
fractum 18. dierū spacio consolidescit: costa post
21. maxilla, iugulum, scapula, os tali, calx, manus
planta ferè inter decimum, quartum, & vnum &
vigefimum diem sanescunt: humeri, & femina
inter 27. & 40. coxa diebus 50. coalescit: pes se-
xaginta dierum spacio, si quiescat, consanescit.
Quod ad curationem attinet, fracti ossis soluta
continuitas est, quare eius sanatio, vnitio est. Vt
igitur hunc assequamur finem, 4 intentionibus
opus erit.

Prima intentio est, vt fracti ossis partes re-
ctè committantur, & in naturalem situm coe-
ptentur.

Secunda, vt rite commissæ ossis perfracti ex-
trema, coniuncta atque immota maneant.

Tertia, vt callo interueniente disiectæ ossis
partes agglutinentur, coalescantue.

Quarta est, symptomatum, quæ fracturam se-
qui consueuerunt, correctio.

Primam autem intentionem assequemur, si
fracti ossis partes, in figuram pristinam, natura-
lemque situm reduxerimus. Id autè fiet, si mem-
brum perfractum, decenter intendatur, vel ma-
nibus, aut habenis: deinde os depressum attol-
latur, & eleuatum deprimatur, atque id quare-

Ec

nus

aus fieri licet sine dolore, donec ossis fracti fines rectè concurrant, & in naturalē situm coaptentur. Ossis autem repositi certum indicium est, dolor sublatus. Ossibus fracturæ iam sic probè coaptatis, membrum deligandum erit, modo eo, quo supra libro sexto, cap. 9. diximus.

Secundus scopus est, ut ossibus iam sic probè coaptatis, & à directo admotis, eorum positura seruetur, & exactè coniuncta maneat. Os fractum propter duritiem, siccitatem, & paucitatem alimenti difficulter vnitur. Quare ne dilabantur denuò partes commissæ, oportet per fractum membrum prorsus immobile consistere. Quod quidem præstabitur deligatura opportuna per fascias, & ferulas, quæ consentiat adamusum cum rectissima figura membri, quam ei natura indidit. Tantisper deligatura hæc seruetur, donec natura callum induxerit firmissimum.

Tertius scopus ad calli generationem pertinet. Nam cum nec ferulis, nec deligatione, nec figura sitive membri appposito, diuisæ ossis partes citra glutinum, aliquod coire, ac concrecere possint, maxima calli gignendi sollicitudo habenda est. Ad hunc igitur gignendum cōcrescere aliquid proprij ossium alimenti, crassi terreniq; oportet, quod in labris fracturæ coalescit. Crassa autem hæc terrenaque substantia, ex gemino, maximeque idoneo ossis alimento redundans

dundans, diem circiter duodecimum, aut decimum quintum ab ossis fractura fere gigni, atque accrescere incipit. Adiuuabitur autem maxime victus ratione, secundum qualitatem, quantitatem, & tempus administrationis, probè instituta.

Alimenta autem talia sint, ex quibus non solum succus bonus provenire soleat, sed etiam tenax, ex quali fieri callum, maximè expedit. Quippe cum ex serosa humiditate, & tenui gigni, prorsus nequeat, ex crassa verò, sed quæ fragilis sit, ac pinguitudinis expers gigni quidem poterit. Circa initium fracturæ usque dum callus gignitur, ægram tenuissimè cibato. Venam interdum, cum scilicet res postulat, secato, & per ventrem superuacua expellito. Carne, & vino usque ad dies decem, abstineto. Magnitudo calli nec minor quàm par est, nec maior iusto sit, sed mediocritatem ad vnguem seruet. Cæterum huius generatio ijs fere notis deprehenditur. Dolor, qui prius aderat, sedatur: nullus amplius inflammationis, aut tumoris alicuius metus adest, in membro perfracto bonus ac nativus color efflorescit, &c.

Quartus & ultimus scopus est remotio symptomatum, quæ fracturam comitari solent, & particula affecta accidunt: cuiusmodi est inflammatio, pruritus, vulnus, immoderata siccitas, aut humiditas.

miditas, callo gignendo obfistens: gangrana, durities, calli magnitudo excedens, vel deficiens. Quare si inflammatio, aut dolor adit, deligatio solvenda erit, & lana, oleum, & acetum vel id genus alia parti dolenti admouenda. Sedata inflammatione, & dolore sublato, deligationes, & ferula iterum adhibenda. Si pruritus acer, ita quam temperatam superinfundere oportet, vel aquam salſam, vel oleo populeo membrum illini. Cum vulnus quoq; accessit, ut ossium fragmenta, & ea, quæ pungunt eximantur. Si carnes contusæ sint, partem affectam scarificato. Si gangrana iam occupavit, convenienter occurrito, ut in speciali praxi docebitur. Cum valenter nimis siccantur ossa, callus ægre provenit: expedit igitur istis tertio, vel quarto die modicè aquam calidam infundere. Si verò humiditas calli generationem impediat: ibi hanc siccare convenienti deligatura, & perfusione aquæ conabimur. Porus seu callus augetur vel minuitur victus comoda ratione. Siquidem ex ossis proprii alimenti superfluitate, a natura generatur, observata quantitate, qualitate, & tempore administrationis debito. Porro augetur quoq; medicamentis, vim emplasticam habentibus, cuiusmodi est emplastrum ex pice: minuitur verò ijs, quæ vim digerendi habent. Quod si indecens membri figura fuerit, ea immutanda erit: quod fiet, si callus

us prius frangatur, deinde commodè membrū
restituatur. Frangitur autem medicamentis
emollientibus. Sed de fractis ossibus hæc nobis
sufficiant.

HACTENVS uiam quandam ac ra-
tionē uniuersalem perueniendi ad praxim, quā
breuissimè potuimus, septem perstrinximus libris.
hæc potissimum ratione, ut medicina studiosis ac
candidatis prodessemus. Precamur itaq; Deum
opt. max. ut is noster labor quamplurimis usus
esse possit. Quod cum intellexerimus, specialem
quoq; praxim, in qua non solum Hippocratica
uerum etiam Theophrastica, quorum iam per mul-
tos annos certam habuimus experientiam
breui, Deo uolente, in lucem
dabimus.

PRACTICA GENERALIS

P I N I S.



Fe s

**Examen seu restitutio ponderum quinti
libri ob exiguitatem typorum ope-
rarum diligentiam
elapsorum.**

~~Fol. 240. linea 15. columna 2. Myrobal. citri-
norum 3. lege 3 s. Fol. 232. lin. 11. col. 1. Violati
s. lege 3 s. Fol. 233. lin. 11. Specierum vero ab
3. lege ab 3 s. Fol. 245. lin. 1. col. 2. laxatiue 3 s.
lege 3 s. Eadem col. & fol. lin. 23. Agarici añ.
3. lege añ. 3 s. Fol. 244. lin. 3. col. 2. Agarici
3 s. lege 3 s. Fol. 236. lin. 15. col. 2. papaueris albi
3. vel 4. leg 3. vel 4. Fol. 242. lin. 4. col. 2. Syr-
ros lax. 3. leg 3. Eodem fol. lin. 11. col. 1. Rad.
Foeniculi 3. leg 3. Fol. 254. lin. 1. de succo
ros. 3 s. lege 3 s. Eodem fol. linea ultima. syr. ros.
lax. 3. leg 3. Fol. 281. lin. 6. Melioli leg. Melilori.~~

Ad nobilem & prælustrem vi-
rum D. IO. IACOBVM
VVECKERVM, Cæsarij

Palatij Comitem, & ME.

DICVM Colmariensem.

ELEGIA

IOACH. ROSALECHII, à nou.
Treptouio Pomeranorū

Maxime sumorum uictor VVECKERB.
dolorum,

Quo medicante fugit morbus & ægra lues:
Quem magnis titulis decorat regesq; scolaq;
Quæq; Palatinū CÆSARIS aula vocat,
Vt tua perpetuò te fama superstitute crescens,
Plus sensim veteri lumine lucis habet.
Sic studiosorum iuuenunq; scientia crescens,
Fit magis ex libris ingeniosa tuis.
Vtq; senex, nomenq; tuum miratur & artes
Sic colit & laudat teq; tuosq; libros.
Et, tua cū fructu perdocta volumina versas,
Plurima, quæ nusquam viderat antè, videt.

Ec 4 Nunc

Nūc quoq; post multos alios summoq; labores
Promis ab ingenio Practica Scripta tuo.
Quæ mala sanandi monstrant feliciter artē,
Et ducunt medicas instituuntq; manus.
Utq; feruntur apes in mellea pascha florū:
Sic hæc lectores in tua scripta ruunt.
Et veluti dulces succos in floribus ipsis
Quærit, & inuentos sedula carpit apū:
Sic quoq; te lector relegēs hūc auspice librū,
Carpit de studijs commoda multa tuis.
Quam benè diuinus sus munera cōtulit in te
CÆSAR, vt ingenij sint monumenta tui.
Sic decorat nostri Domini clementia doctos,
Sic noster sapiens REX sapienter agit.
Tunc artes et tunc veneranda scientia floret,
Tunc sunt celebres magnificaq; scholæ:
Cū Reges, placidiq; Duces, Proceresq; beni
Artibus & studijs ingenijsq; fauent. [gni
Dignus es illorū summo VVECKERE fauore:
Debetur meritis gratia tanta tuis.

Tu medicinarū graui es possessor: et herbas;
Et vires harum, certus in arte, doces.

Tu quoq; nunc certam subtili pectore praxin
Edis: & hæc multum dexteritatis habet.

Cum tua te pareret genitrix feliciter, & diem
Aspiceres primum, luce fauente, diem,

Tunc in te magnum clementer & vtile donū
Humano generi præbuit ipse DEVS

Tunc promisit opem morbis, ægriq; salutē:
Nunc, quæ promisit, te medicantē facit.

Perge tuas magnū meritis extendere laudes,
Perge tuum posthac multiplicare decus.

Si modò laus fieri poterit tua maior: & id si,
Quod summum nunc est, altius esse potest.

Vive diu, pergatq; fauens, te sospite Parca
Nere tibi fufis staminalonga suis.

Sis felix, huius decus admirabile terræ,
Vir meritò clavis annumerande viris.

Per te p̄q; tuā sint p̄spera pharmaca dextrā,
Pareat arbitrio qualibet herba tuo.

Atq;

Atq; tuis absint malefida pericula tectis,
Et desint domui gaudia nulla tua.
Cumq; satur mundi fueris, dāduq; sepulchro,
Contingat tumulo pax requiesq; tuo.
Egrediensq; tuo sursum de funere, coetu
Ductus ab angelico, Spiritus ostra petat.
Plura tuo posthac de nomine carmina scribā,
Nam cupio tanto charior esse viro.
Hæc nūc sufficiant, & si placet, accipe finē,
Vtq; piē claudam tam pia vota, vale.



EIVSDEM
AD MEDICINÆ CAN-
DIDATOS.


Grex iunior, leætorq; candidissime,
Hippocratiq; cohors, & huic Galeni proximi,
Quæ sedulis & impigris laboribus
Quæris habesq; modum morbis medēdi languidis.
Post cognitæ herbasq; resq; plurimas,
Quas medicina solet aptare vestri vsibus,
Nihil absq; Praxi, quod fateris, proficis,
Nil medicina iuuat, quæ praxim ipsam non tenet.

Hanc

Hanc ecce nunc VVECKERVS optatissimus
Edit, & ingenij fœtus nouos gignit sui.
Hanc maximo nunc accipis cum gaudio,
Assidueq; legis hanc plurimis cum fructibus
Hac te regit, manumq; prosperat tuam.
Deniq; te medicus parem facit clarissimis
Sic noster, omnia s'ns scientia, Deus
Unius arte viri prodest terris omnibus
Potest, & unus sic Deo vtr' auspice
Commoda tanta potest præbere mundo maximo.
Sed plura mox hic dabit: viuat modo:
Viuat ut ergò diu, Patrem precare cælitum.

INDEX





INDEX.

Capitulum & rerum in hoc opere præcipuarum.

A

<i>Abscessus Gracis</i>	<i>Aposte</i>	<i>Agarici electio. fol.</i>	206
<i>mara folio</i>	403	<i>Agarici infrenatio, & do-</i>	
<i>Abscessus quid sit fol</i>	403	<i>sis. fol</i>	207
<i>Abscessus genus duplex</i>		<i>Alcohol Arabibus quid</i>	
403	pag.	355	
<i>Abscessuum signa dupli-</i>	<i>Alexiteriorum genus fol.</i>		
<i>cia.</i>	403	159	
<i>Abscessuum iudicia vete</i>	<i>Alexiteriorum usus.</i>	149	
<i>rum & recentiorum</i>	404	<i>Albes electio, usus & no-</i>	
<i>Abscessuum cura.</i>	405	<i>xa fol.</i>	203
406		<i>Anodyna qua. fol.</i>	186
<i>Abscessu aperto quomodo</i>	<i>Anodynorum diuisio.</i>	187	
<i>procedendum. fol.</i>	47	<i>Anodyna reuera qua. fol.</i>	
<i>Ablutionu forma, usus,</i>		186	
<i>& exempla. fol.</i>	359	<i>Anodyna nomine tantum</i>	
<i>Acus ad suturam qualis</i>		<i>qua</i>	187
<i>esse debeat</i>	375	<i>Anodynorum veroru co-</i>	
<i>Ager num seruatus aut</i>		<i>gnitio</i>	187
<i>moriturus</i>	30. 31	<i>Apophlegmatismoru com-</i>	
<i>Ager quo tempore sanan-</i>		<i>positio, usus</i>	286
<i>du. fol.</i>	33. 34	<i>Apostematum apertiones</i>	
<i>Eru ratio et qua circa eu</i>		<i>quales optima</i>	405
<i>Medico considerata</i>	64	<i>Apostematum apertiones</i>	
65		<i>quomodo fieri debeant</i>	
<i>Affectus Animi.</i>	91	<i>pag.</i>	406

INDEX

In Apoftematū apertione

ſeptem ſpectāda. 406.

407

Apoftemata quid. 236

Aqua cōcoquētes bilem

flauam. 225

Aqua concoquētes pitui-

ram. 227

Aqua concoquētes bilem

atraam. 229

B

Balanos ſine glans. 277

Balnea quibus noceant

89.

Balnea quibus conducant

89.

Balnea inſeſoria quid &

quomodo ſiant. 353

Balneorum uſus & exem-

pla. 356, 357

Balneorum genere. 90

Bolus quid & quomodo

ſiat. 260

Boli qualitas, quantitas

& aſumendi tempus

260

Boli exempla varia 261

262

C

Cacoehymia quid. 88

Cannula quid. 475

Cannula uſus 475

Caput purgia quid & quo-

modoſi ant eorūq. uſus

284.

Carrami preparatio 208

Carrami uſus. 208

Caffia nigra quid ſit. 203

Caffia nigra quomodo eli-

genda. 204

Caffia nigra doſes 204

Cathartica qua. 156

Cataplaſmatum conſectio

& uſus. 345, 346

Cataportia quid. 262

Cauſa quando ante mor-

bura remouenda. 394

Cauſa moriendi. 35, 36

Cauterium eiꝯq. genera

modi, adhibitiones, &

operationes. 367, 368

Ceroti conſectio, uſus &

exempla. 350, 351

Chirurgia pari Medicina

366

Cibi

INDEX.

Cibi temperati.	67	Cibi laxantes.	78
Cibi calidi.	68	Cibi astringentes.	78
Cibi frigidi.	69	Cibi urinam mouentes	79
Cibi humidi.	69	Ciborum qualitas qua cuius	
Cibi sicc.	70	us affectui conueni-	
Cibi boni succi.	70	at	69
Cibi mali succi.	71	Ciborum quantitas in ge-	
Cibi lenes & acres	71	nere.	79. 80
Cibi crassi & subriles.	72	Ciborum ordo in genere	81
Cibi mediq inter attenuan		Ciborum quantitas	791
ria & iurassantia.	73	Ciborum ordo generalis.	81
Cibi stomacho idonei.	73	Cibationis tempus.	81
Cibi stomacho alieni.	74	Citrinorum Myrobalana-	
Cibi capiti nocentes.	74	rum electio dosis.	206
Cibi inflariui.	75	Citrinorum correctio My-	
Cibi flatu soluentes.	75	robalanarum.	206
Cibi facili corruptionis.	75	Clyster unde dicatur	267
Cibi difficilis corruptionis.	75.	Clysteris compositio & do-	
	75.	sis	262
Cibi velocis concoctionis.	76. 81	Clysteris exhibendi modus	
	76. 81		268
Cibitarde digestionis.	76.	Clysteres alterantes.	269
	81		270. 271. 272
Cibi humoribus abundan-		Clysteres purgantes.	273
tes.		Cnci cum pituita simili-	
Cibi superfluitatum ca-		tudo.	202
rentes.	77	Collutionu forma, usus et	
Cibi pauci nutrimenti.	77	E e s exempla	

Y

INDEX.

& exempla	359	agendum.	99
Collyria quid, corrigenda, forma & compositiones	39	Crisis futura precognitio.	39. 40. 41
293		Crisis prænatio per fluxum sanguinis narium.	43
Colocynthis electio, correctio, & dos	208	Crisis per vomitum.	44
Colutea electio, dos, & correctio	211	Crisis per deiectionem alui.	45
Congestionis causa gemina	396	Crisis per mēstruorum purgationem et hemorrhoid.	45
Contraria contrariis curantur	393. 424	Crisis per sudores.	46
Contrarium pro eo quod exuperat quousque inducendum	395	Crisis per abscessum.	46. 47
Convalescendi ratio	35. 36	Cura quantitas, qualitas, modus, tempus et locus	395
Corpus quomodo efficiatur durum	134	Curandi indicationes impropria	57
Corporis obstructionis cura uniuersalis	410. 411	Curandi instrumenta.	62. 63
Corporis figura vitiosa cura generalis	401	D	
Corporis superficies id est cutis laesa, quomodo in genere percuranda	412	Decocta quid & quomodo fiant.	236
413		Decocta alterantia.	238
Corpori tria prater naturam accidunt	393	Decocta alterantia et purgantia bilem fluxum	239
Corpori agro in genere quod		Decocta alterantia & purgantia pituitam.	242
		243. 244. 245	
		Decocta alterantia & purgantia	

INDEX.

Gaia melancholiā. 247	exempla. 298. 299. 300
Decocta alterantia & purgantia humores mixtos 249. 250	Electuaria frigefaciētia exempla. 303. 304
Decocta exhibēdi tēpus eorūq; vires in genere. 235	Eligmata quid. 233
Deleteriorum usus. 146	Eligmatum dosis, usus & qualitas. 233
Deleteria genere. 145	Eligmata quo tempore exhibeantur 234
Deleteria quantitate. 146	Ellebori usus. 217
Deleteriorum series. 147	Embrocha quid. 353
De dentificijs. 319	Embrocha cum fomentis humido differentia. 353
Detergentiā p̄stas. 139	Embrocharū confectio, usus et exempla. 353
Diara quot modis perficia tur. 64	Emplastrum quid. 342. 343
Dies Indicatorij. 47	Epidesima quid. 380
Dies decretorij. 48	Epithemata quid, & quomodo fiant. 336
Digestio quid. 48	Epithematū variatio. 336
Digestio in humoris substantia. 190	Epithematum usus & exempla. 338. 339
Digestio in humoris qualitate. 191	Epithymi dosis eiusq; correctio. 217
E	Errhina quid eorumq; cōpositio & usus. 283
Electerij quid eiusq; dosis & usus. 209	Esiharotica quid. 139
Electuaria quid. 296	Euphorbij usus. 209
Electuaria qualitas & exhibendi tempus. 296	Es. Fascia
Electuaria calefacient.	

INDEX

F

Fascia ad fracturas deli- gandas.	179	Ferulas adhibendi mo- dus ac ratio ibidem.	388
Fascia qualis esse debeat ad deligandum.	377	Fibula quibus in vulneri- bus adhibeantur.	300
Febrientes quemodo ciban- di.	81	Fibularum forma qualis.	390
Ferula quomodo in fractu- ris adhibeantur.	285	Fibularum usus.	390
Ferula post deligaturam inciendi.	386	Fibulas Graci ancterus vo- cant.	389
Ferula in quem finem à recentioribus adhibean- tur.	386	Fluxio qua ratione conci- tetur.	396
Ferula quamdiu manere debeant	389	Fluxionis causa quæ.	396
Ferularum materia.	388	Fluxionem quare pars ali- qua excipit.	396
Ferularum usus idem qui et plagularum.	386	Fomentorii compositio, usus exhibitio.	335.336
in Ferularum accommodati one quid cauendū	388	Forcipes Albucasi.	373
cas quo tempore anti- qui accommodarint	385	Forcipes dentales.	372
Ferulas quare Hippocra- tes Leues, Equales,		Forcipes ad extrahendos globos.	373
Simas, In media parte cras- siores, Breuitores quam		Forcipes cerebelli inuersi forma.	373
deligatio esse voluerit.	387	Forcipes ad spinas de gula extrahendas	374
		Forcipes ad fractus mortuos extra-	

INDEX.

extrahendos	374	288
Forficum usus.	370	Gargarismatum aliquod
Fracturâ graci Catagma		exempla. 289
vocant.	431	Gaudium nimium quomo-
ob Fracturam figuramē-		do officiat. 91
bri indecens quomodo		Gestationis genera. 83
immutanda	437	Gestationes quomodo ad-
Fractura quomodo deli-		hibenda. 83
ganda.	179	Gladium preparatio. 277
Fracturarū genus duplex		Glandium dosus & cas
431		subijcendi tempus. 278
Fracturarum causa.	431	H
Fracturarum signa.	432	Hermodyli proba, dosus
Fracturarum prognostica.		& correctio. 209
432		Humores digestionis obno-
Fracturas curandi tempus	xij.	192
433		Hypodesmida quid. 380
Fracturas curandi quatu-		I
or interiones. 433. 434		Inanitionis genera. 86
cas quomodo assequa-		Indicationes curandi im-
mur. 435. 436		propria. 57
Fridtionis genera.	82	Infusio quid & quibus ex
Fridtiones ubi adhibenda.		hibeatur. 251
82		Infusio purgans bilem. 252
Fumi terra usus.	211	Infusio purgans pituitam
G		252
Gargarismatum usus, cō-		Infusio purgans bilē atrā
fectio, qualitas & tēpus	253.	Eff: Infusio

INDEX.

Infusio purgans bilem & pituitam	253	linamentorū forma quā	385
Infusiones quomodo praparentur	251	Linimenta quid corū compositio & usus	325.
Infusiones adhibendi rempus & quantitas	252	Loch quid	233
Instrumenta curæ	02.63	Luxatio Gracis est, arthre-	
Instrumenta incidentia & excidentia	369	ma	417.
Instrumenta prentia	367	Luxatio quid sit	fol.
Instrumenta extrahentia	372	Luxatio ante fracturam fieri possit semper curanda	
Instrumenta extendentia	390	Luxatio indurata quomodo emollienda	419
Instrumenta nō ferrea quādam	367	Luxationis causæ, signa	
Instrumenta ad deligationem apta	377	Luxationis restituta indicia	419
Instrumentorum Chirurgicorum diuisio generalli	366	in Luxatione curanda prius inflammatio si ea adsit auferenda	419
Instrumentorum ferreorū diuisio specialis	366	in Luxatione curanda tria attendenda	419
Ita quā noccat	91	Luxationes prorsus insanabiles	418
Kulapū quid	232	Luxationes haud periculose	418
Kulapū dos & usus	232	Luxatio-	
L			
Lapidis armenij usus	212		
Lapidis lazuli usus	212		

INDEX.

- Luxat. difficillima* 419
Luxata statim reponenda 410
Luxatum caput in posteriore partem secundū Celsum incurabile. 418
M
Manna quid 204
Mechosaca quid 207
Medici officium. 366
Medicina lenientes. 256
Medicina soluentes. 256
Medicinas solutivus manūnantibus quatuor consideranda. 254
Medicamēta suppurantis qualitas. 151. *Eius usus* 151. *eorum series.* 152
Medicamenta temperata quoniam. 98
Medicamēta calida in primo gradu quoniam 99
calida in secundo 99
calida in tertio gradu 100.
calida in 4 gradu 100.
Medicamenta frigida in primo gradu 103. *frigida in secundo* 103. *frigida*
- in tertio* 104. *frigida in quarto* 104.
Medic. sicca in primo 105
sicca in secundo 105.
sicca in tertio 107.
sicca in quarto 109
Med. humida in primo 110. *humida in secundo* 110. *humida in tertio* 111
Med. tenuis essetia 111. 112
crassa essetia 113
Medicam. dissimilariū partium 115
Med. acria 117. 118. 119
constringentia 125
aperientia 126. 127. *di*
scutientia 128. 129. 130.
condensantia 131. *rate*
facientia 132. 133. *in*
durantia 134. *laxan*
tia 134. *abstergētia* 135
adurantia 134
atrahentia 140. *cien*
tia 141. 142. 143
Med. emplastica quid & qualia esse debeat. 1524
Med. deleteria quid. 14.
alexiteria quid. 145
pus monentia. 158

INDEX

<i>Med. exoplastica quid.</i>	153	<i>tia</i>	182
<i>eorum enumeratio.</i>	153	<i>Medicamenta calculum</i>	
<i>Med. obstructione liberā-</i>		<i>frangentia.</i>	183
<i>ria.</i>	154.	<i>Medicamenta lac gene-</i>	
<i>Medic. exedentia.</i>	156	<i>rantia.</i>	184
<i>Medicamenta expurgan-</i>		<i>Medicamenta crassos hu-</i>	
<i>tia.</i>	157. 158. 159	<i>mores in thorace & pul-</i>	
<i>Medicamenta extenuan-</i>		<i>monē expurgantia.</i>	184
<i>tia.</i>	161. 162	<i>Medicamenta tussim se-</i>	
<i>incrassantia</i>	163	<i>dantia.</i>	185
<i>Medicamenta flatuum dis-</i>		<i>Medicamenta tussim pro-</i>	
<i>cutientia.</i>	163	<i>uocantia.</i>	185
<i>Medicamenta extrahen-</i>		<i>Medicamenta dolorem se-</i>	
<i>tia.</i>	164	<i>dantia.</i>	186
<i>Medicamenta glutinan-</i>		<i>Medic. soporifera.</i>	188
<i>tia.</i>	165	<i>Venerē excitantia</i>	189
<i>Medic. incidentia</i>	167	<i>Spermatica.</i>	190. am-
<i>Medicamenta repollen-</i>		<i>bustis utilia.</i>	911. di-
<i>tia.</i>	169	<i>gestiva</i>	191. concoquen-
<i>Medicamenta roboran-</i>		<i>tia</i>	191. bilem flauam
<i>tia.</i>	170. 171	<i>cōcoquētia</i>	192. 193. 194
<i>Medic. sarcotica</i>	172	<i>pituitarū concoquentia</i>	
<i>Medic. sistēti vim ha-</i>		<i>195. 196. 197. 198. 199</i>	
<i>bentia.</i>	173. 174. 175.	<i>simp. bilem atram con-</i>	
<i>urinam cientia.</i>	176 177	<i>coquentia.</i>	200. 201
<i>menstrua prauocantia</i>		<i>purgantia in genere que</i>	
<i>179. 180 menstrua sistē-</i>		<i>sint</i>	202. purgantia quo-
<i>tia.</i>	181. sudorem ciē	<i>modo attrahant.</i>	203

Medi

INDEX.

Medicamenta bilem fla-	Morbo unico quomodo oc-
uam purgantia. 203	currendum. 50
purgantia pituitam 206	Morbo cum symptoma-
Medicamenta atram bi-	te quomodo occurren-
lem purgantia. 211	dum. 52
Medic. quantitas. 213	Morbo prasente ipsius cau-
Medicamentorum quan-	sa quomodo proceden-
titas à morbi tum que-	dum. 53. 54. 55
litate rum quantitate	Morbo, eius causa, atq;
desumenda 214	symptomate concurren-
Medicamentorum astrin-	tibus quid medico co-
gentium cum acerbis	nandum. 51
comparatio. 120	Morbi per se. 9. 16
Medic. astringentiũ fe-	Morbi per consensũ. 10. 11
ries. 120. 122. 123. 124	Morbi per consensũ quoc-
Mel glandibus omnũ ge-	modusiant. 10. 11
nerũ accedit. 277	Morbi instrumentales in
Mensura Medica arido-	compositione secundũ
rum. 362	figuram vitiatam quo-
Mensura Medica liqui-	modo eueniant. 408
dorum. 263	ex his qui curari possint
Mergrei dosis & infrena-	qui no. 409. In vs cu-
tio. 209	randis quid consideran-
Mastiria quid pariat. 91	dum. 409
Morbis quomodo digno-	Morbi in compositione se-
scatur. 13. 14	cundũ cavitatem vi-
Morbis num curari va-	natũ quomodo fiat. 410
leat. 27. 28. 29	Ff 5 In

INDEX.

- in his curandis quinq; Morborum cause in uni-
spectanda. 410. 411 uersum. 21. 22. 23
- Morbi in compositione ex Morborum finis per cri-
superficie aspera vel leui sim. 36
- quomodo accidunt. 412 Morborum finis absq; crisi 36
- Morbi in compositione se- Morborum similariu cu-
cundū numerum quo- ratio. 394
- modo contingant. 414 Morborum, ex alterata
eorum causa, signa, iu- superficie curatio quo-
dicia, & curatio. 415 modo inuestigari debe-
at. 412. 413
- Morbi in compositione se-
cundum magnitudi- Morbis pluribus simul
ne quomodo fiant. 416 concurrentibus quomo-
do occurrendum. 51
- Morbi à magnitudine vi-
tariū quomodo diffe- Mordicatio quid efficiat.
runt ab alijs qui à nu- pag. 203
- mero alterato procedūt Morfili quid 310
- 417 Morfili usus 305
- Morborum istorum cause, Morfili exemplum. 310
- signa, iudicia, & curā Motus agrotantium. 82
- di ratio. 416. 417 Myrobalana Bellirica et
eorum usus. 210
- Morborū diuisio genera-
lis 15. 16 Myrobalana Emblica eo-
rumq; adhibitio; 210
- Morborum diuisio specia-
lior. 393 Myrobal. Chebula quo-
modo adhibenda. & in
Morborum signa 6. 7. 8. frenanda. 210
- Morborum signa propria.

INDEX.

<i>Myrobalana Inda.</i>	212	<i>usus octuplex.</i>	298
N		<i>Pessus quid; eorum usus</i>	
<i>Novacularum usus,</i>	371		279
O		<i>Pessorum confectio.</i>	280
<i>Ocularia medicamenta</i>		<i>Pessorum exempla.</i>	281.282
293.294		<i>Phlebotomia instrumenta</i>	
<i>Olea calefacientia.</i>	325.326		369
<i>Olea refrigerantia.</i>	327	<i>Pilula quid & quomodo</i>	
<i>Olea siccantia,</i>	328	<i>fiant</i>	262
<i>Olea humectantia.</i>	328	<i>Pilula purgantes bilem.</i>	
<i>Olea astringentia.</i>	328	<i>flavam</i>	264
<i>Olea emollientia.</i>	329	<i>Pilula purgantes pitui-</i>	
<i>Olea laxantia</i>	329	<i>ram.</i>	264
<i>Olea rarsaferentia.</i>	329	<i>Pilula purgantes Melan-</i>	
<i>Olea digerentia.</i>	329	<i>choliām.</i>	266
<i>Olea detergentia.</i>	329	<i>Pilulas sumendi qualitas,</i>	
<i>Olea glutinantia.</i>	330	<i>quantitas, tempus.</i>	263
<i>Olea somnum inducentia</i>		<i>Plenitudo quid.</i>	85
330		<i>Plenitudo quotuplex.</i>	85
<i>Olea dolorē sedantia.</i>	330	<i>Polypody usus.</i>	21
<i>Opepanax quid.</i>	210	<i>Poma odorata</i>	220.221
<i>Ostium setio.</i>	372	<i>Pondera Medica.</i>	361.362
P		<i>Portiones lenitiae</i>	254.155
<i>Pars corporis quo nobilior</i>		<i>Portiones purgantes in sub-</i>	
<i>est blandius esse debet me-</i>		<i>stantia sumpta.</i>	255
<i>dicamentum.</i>	213	<i>Portiones purgates partim</i>	
<i>Pastillus quid</i>	290	<i>ab infusis partim à sub</i>	
<i>Pencilia quid eorumq;</i>		<i>Es 3 stantia</i>	

INDEX.

faRis.	258.259	214
Pulueru confectio et vsus	315	Quantitas remedium a locorum, regi onumue
Puluerum exempla.	315	situ ex parte quoq. perē
Pulueres purgantes.	317	da 214
Pulvilli quid & eoru forma apud antiquos.	371	Quantitas sanguinis mis
Pulvillorum forma hedi		sonis unde desumēda
erna, vsus & figura va		87
ria.	381 382	Quies agrotantium. 82
Purgatio ni modi.	88	Quies immodica sanis de
Purgationis tempora.	89	trimentoſa. 83
Purgationis quantitas.	88	Radices quinq. cōmunes.
Purgationis qualitas.	88	202
Purgatio quid & quibus		Remedium qualitas un
conueniat & quo tēpore		de decernenda 97
87		Remedium quantitas
Purgatio quibus dānosa		medico necessaria. 213
& quo tempore.	88	Repletio & inantio in ge
Puris Iudiciū.	405	nere. 85
		Rhabarbari electio, corre
		ctio, dosis. 205
Qualitas Remedium		Rob quid sit & eius dosis
unde desumenda.	97	235
Quantitas remedium.		Rob quomodo differat a
213		syrupo. 235
Quantitas remedium ex		Rob exhibendi modus &
morbo, anni tēpore, agro		tempus. 235
ri acate quoq. desumēda		Regula

INDEX

Rotuli quid.	308	Sem. frigida maiora.	209
Rotularum exempla.	308	Sem. frigida minora.	209
S		Sena quid.	211
Saccularum confectio, forma, usus & exhibitio- nes.	340. 341	Senes cur frequenter se- bis laborent.	413
Saccularum exempla no- uē ad varios usus.	343	Serapinum quid.	210
344		Serra quibus adhibenda, quibus non.	372
Sagapenum quid.	210	Serra ut adhibenda	372
Sanguis putrescens in cho- leram transit.	239	Serra adhibita quid fa- ciendum.	373
Sanguis uerū recipit digestio- nem.	192	Serraria differentia.	374
Satietas quid.	85	Serum tustis quomodo su- mendum.	206
Scalpellum quid, eiusque genera.	369	Sief barbari quid.	293
Scammoneij electio, dosi & correctio.	205	Signa morborum in gene- re.	6. 7. 8
Scarificatio quid & quo- modo adhibeatur.	78	Signa crisis præterita.	37. 38
Scarificationis modus.	370	Signa crism præcedētia.	37. 38
Senta quomodo fiant, eo- rumque usus & exem- pla.	352	Signa salutaria.	31. 32
Semicupii vulgi quid.	356	Signa lethalia.	31. 32
Semina calida maiora.	201	Soliderum confectio num- formæ triplex.	305
Semina calida minora.	201	Solutio continui morbus communis est.	423
		Somnus, quomodo fiat.	84
		Soporus	

INDEX.

Somni qualitates.	84	cardi.	89
Somni moderati effectus.	84	Suffimenta quid.	323
Somni immoderati operationes.	94	Suffimentorum compositio.	323
Somni deficientis noxa.	54	Suffimentorum usus.	324
Somni tempus.	84	Suffimentorum exempla	
Somni usus.	84	Suffus. Arabidus quid.	315
Soporifera sunt ex genere anodynorum.	188	Suppositoria seu glandes	
Specillum quid.	475		277
Splenis quid.	380	Symptomata in uniuersum.	17. 18. 19. 20
Splenis unde dicta.	380	Symptomata que magnitudine superant suas	
Spleniorum forma.	381	causas curationis ordinē saepe peruertūt.	428
Spleniorum usus.	381	Symptomatibus pluribus cōcurrentibus quid agendum	5
Sternutamenta quid.	285	Syrupus digestius quid	222
Sternutamentorum compositio.	285	Syrupus unde conficiatur	pag. 222
Sternutamentorum usus.	285	Syrupi digerentes humores mixtos.	230. 231
Stupefacientia quomodo mortem adferant.	187	Syrupus purgans bilem, pituitam, & melancholia in hepate.	231
Succi rosarum operationes	205		
Succi rosarum dosis.	205		
Sudores quibus & ad quae prouocandi.	89		
Sudores quomodo prouo-			

INDEX.

S

netura.

33. 34.

- Syrupi laxantes. 231
 Syrapi concoquentes bilē
 jianam. 225
 Syrapi cōcoquentes pitui
 tarū. 227
 Syrapi concoquentes bilē
 arram. 229
 Syruporum dosi, ad di-
 versos effectus. 222
 Syruporum qualitas unde
 petenda. 223
 Syruporum exhibendorū
 tempus. 224
 Syruporū efficacia 224
 Syrupia omnibus cordia-
 lis aliqua aqua commi-
 scenda. 223

T

- Tabula quid & quomo-
 do fiant. 306
 Tabularum usus & exhi-
 bitio. 306
 Tabularum exempla. 307
 Tamarindorum electio
 & usus. 205
 Tempus quo morbus, vel
 cura vel morte termi-

- Temporis oportunitas in
 remedijs adhibēdis quo
 modo animadverten-
 da. 215
 Thymiamata quid. 322
 Tumor quomodo nocuus
 pōg. 97
 Tragea siue Tragemata.
 quid 316
 Tragematū forma, exhi-
 bitio, usus. 311
 Tragematū exēpla 312. 313
 Trochiscorū forma, usus
 & exhibēdi modi. 291
 Tumor præternaturā quid
 sit. 395
 Tumorū præternaturā
 differentia unde peten-
 da 395
 Tumorū causa speciales
 quod, 396
 Tumorū causa primiti-
 va seu progressa qua-
 nam 397
 Tumorū causa antece-
 dentes qua. 397
 Tumorū

INDEX.

Tumorum causa coniuncta seu continentes quam sint.	397	namq. modorum signa	399
Tumorum praternaturā signa & indicia.	397	Tumores curandi prima intentio secundū Galenum	401
Tumorum incrementum quando adesse iudicatur.	398	Secunda intentio quomodo fiat.	401
Tumorum principij nota que.	398	Tertia quomodo perficiatur.	402
Tumorum status quodnā sit iudicium.	398	Turbith electio, dosus & correctio.	208
Tumorū declinatio quādo cognoscitur.	398	Turundas vide.	383
Tumorū regressionis nota	399	Turundarū forma qualis	385
cuius operatio.	400	V	
Tumorū curationis initiū unde sumendū	400	Vena sectio ē directio partis laborantis sepe facienda	87
cuius tres intentiones	400	Vena sectio quibus conueniat, quo tempore.	86
ita Tumorū declinatione quid faciendum	402	Vena sectio quibus noceat & quo tempore.	86
Tumores quatuor temporibus distinguuntur	398	Vena quamnam secanda.	86
Tumores quibus modis terminari necessē sit	399	Venena deleteria.	147
Tumores terminandi modus quā optimus isto		Vigilia usus.	84
		Vigilia operationes	85
		Virtus	
		Vermium indicia.	12.


INDEX.

<i>Virtus reſſrix in corde ſem</i>	<i>Vnguent extrahentia</i> 134
<i>per cõfirmanda.</i> 223	<i>Vnguenta dolorum ſedan-</i>
<i>Vlcus eſt vñonis diuerſũ</i>	<i>ria.</i> 134
<i>vetus et incuruentũ.</i> 428	<i>Vnguẽtũ ſoporifera.</i> 134
<i>Vlcerauſa cauſa gemina.</i> 429	<i>Vnguenta purgantia.</i> 134
<i>in Vlceribus diuturnũ os</i>	<i>Volſeda quid.</i> 474
<i>abſcedit.</i> 429	<i>Vulneris vñtio.</i> 424
<i>Vlcerum iudicia.</i> 429	<i>Vulnera quid ſint.</i> 422
<i>Vlcerib. quid officiat.</i> 430	<i>Vulnera leralia & quaſi</i>
<i>Vlcera curandi quatuor</i>	<i>letalìa.</i> 423
<i>intentiones</i> 430. 431	<i>Vulnera rutiora quanam</i>
<i>Vnguentorũ cõpoſitio, uſus</i>	<i>ſint.</i> 424
<i>& exhibitio.</i> 231	<i>Vulnera quomodo deligan-</i>
<i>Vnguẽta calida.</i> 333	<i>da.</i> 377. 378
<i>Vnguẽta frigida.</i> 333	<i>Vulnerũ cauſa, ſigna & in</i>
<i>Vnguẽta aſtringentia.</i> 333	<i>dicia.</i> 423
<i>Vnguẽta emollientia.</i> 333	<i>Vulnerum curationẽ quo-</i>
<i>Vnguent. abſtergentia.</i> 333	<i>modo aſſequamur.</i> 425.
<i>Vnguenta ſarcotica.</i> 134	426. 427.
<i>Vnguent. glutinãtia.</i> 134	<i>Vulnerum ſutura quomo-</i>
<i>Vnguenta erodentia.</i> 134	<i>do ſiant.</i> 475

TRINO ET VNI GLO-
RIA, ET HONOR.



11-10





#8062

J585

W387p

